分 佈：臺灣(澎湖、臺北等地，不甚普遍冬候鳥)、沿海各省。

Larus genei 細嘴鷗 (Yan et al., 1996:156)

捕 食：小魚、水生昆蟲。

分 佈：雲南(冬候鳥)。

Larus minutus 小鷗 (Yan et al., 1996:152)

捕 食：死魚或殘物、嚙齒類、昆蟲類。

分 佈：內蒙古東部(夏候鳥)；江蘇、河北、新疆西部(冬候鳥)。

Larus ridibundus 紅嘴鷗(Yan et al., 1996:152)

捕 食：魚、蝦、昆蟲類。

分 佈：臺灣及海南度冬(冬候鳥)；冬季遷移至黃河流域、長江以南各省、新疆、東北(夏候鳥)。

Larus riddibundus sibiricus Buturlin 紅嘴鷗 (Chen et Yu, 1984, III:279)

別 名：*橙嘴鷗，赤咪鷗，百合鷗*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(普遍冬候鳥)、西北及東北各省(繁殖)。

Larus saundersi (Swinhoe) 黑嘴鷗 (Chen et Yu, 1984, III:279)

別 名：*黑頭鷗，黑咪鷗*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(冬候鳥)、長江下游、東南沿海各省(冬候鳥)、東北(繁殖)。

Sterna albifrons 白額燕鷗 (Yan et al., 1996:158)

別 名：*小燕鷗*。

捕 食：魚、蝦、水生昆蟲。

分 佈：臺灣(夏候鳥及冬候鳥)、海南、雲南向東北至黑龍江的東南廣大地區(夏候鳥)。

Sterna albifrons sinensis Gmelliin 小燕鷗 (Chen et Yu, 1984, III:277)

別 名：*黃嘴鷹子，白額燕鷗，小鳶*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(蘭嶼)。

Sterna aurantia 黃嘴河燕鷗 (Yan et al., 1996:158)

捕 食：魚類、甲殼類、水生昆蟲。

分 佈：雲南西南部。

Sterna bergii cristata Stephens 鳳頭燕鷗 (Chen et Yu, 1984, III:278)

別 名：*大鳶*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(蘭嶼繁殖)、東南沿海各省。

Sterna hirundo 普通燕鷗 (Yan et al., 1996:158)

捕 食：魚、水生昆蟲。

分 佈：臺灣(過境鳥)，西藏經四川、陝西、至山東北方、西北、東北廣大地區(夏候鳥)；南方各地。

Sterna sumatrana sumatrana Raffles 蒼燕鷗 (Chen et Yu, 1984, III:278)

別 名：*黑枕燕鷗，蒼鷺*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(僅見於蘭嶼及綠島)、東部及東南沿海各省。

Thalasseus bergii 大鳳頭燕鷗 (Yan et al., 1996:162)

別 名：*鳳頭燕鷗*。

捕 食：魚、蝦、水生昆蟲。

分 佈：臺灣(夏候鳥)、海南、東南沿海各省(留鳥)。

COLUMBIFORMES 鴿形目

Pteroclididae 沙雞科

Pterocles orientalis 黑腹沙雞 (Yan et al., 1996:166)

捕 食：植物種子、葉芽、昆蟲類。

分 佈：新疆北部(夏候鳥)。

Syrrhaptes paradoxus 毛腿沙雞 (Yan et al., 1996:166)

捕 食：植物種子、葉芽、昆蟲類。

分 佈：青海西北、陝西、新疆內蒙古西部(留鳥)；陝西、河南、山西、山東、河北、遼寧、吉林、黑龍江(冬候鳥)；寧夏、陝西、山西、河北、內蒙古、吉林、黑龍江(夏候鳥)。

Syrrhaptes tibetanus 西藏毛腿沙雞 (Yan et al., 1996:166)

捕 食：植物種子、葉芽、昆蟲類。

分 佈：西藏、四川西北、青海、陝西、新疆西部(留鳥)。

Columbidae 鳩鴿科

Columba pulchricollis Blyth 臺灣鴟鳩 (Chen et Yu, 1984, III:308)

別 名：*灰林鴿*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(群棲 1,000-2,000m 高山喬木上)、雲南、西藏等地。

Streptopelia chinensis chinensis (Scopoli) 珠頸斑鳩 (Chen et Yu, 1984, III:309; Su et al., 1986:39; Yan et al., 1996:172)

別 名：*花脖鳩，斑頸鳩*

捕 食：植物種子、昆蟲及幼蟲、小螺、穀物。

分 佈：臺灣、廣東、海南、雲南、西藏東南部經四川、青海東南部、甘肅、陝西、山西向東南沿海各省廣大地區(留鳥)。

Streptopelia chinensis formosae (Kuroda) 臺灣斑頸鳩 (Chen et Yu, 1984, III:309)

捕 食 性。

分 佈：臺灣(全島及蘭嶼、澎湖，特有亞種)。

Streptopelia orientalis 山斑鳩 (Su et al., 1986:39)

捕 食：昆蟲類。

分 佈：廣東。

Streptopelia orientalis orii Yamashina 臺灣金背鳩 (Chen et Yu, 1984, III:309)

=*Streptopelia orientalis stimpsoni* (Stejneger)

捕 食 性。

分 佈：臺灣(蘭嶼、臺東、花蓮、高雄、臺南、澎湖、臺中、臺北等地，特有亞種)。

Turdus nawnai 斑鳩 (Xiao, 1985(2):30)

捕 食：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲。

分 佈：

CUCULIFORMES 鵑形目

Cuculidae 杜鵑科

Cacomantis merulinus 八聲杜鵑 (Yan et al., 1996:186)

捕 食 性。

分 佈：海南(留鳥)；福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、西藏東南端(夏候鳥)。

Centropus bengalensis 番鵑 (Yan et al., 1996:186)

捕 食：昆蟲類、其他小動物。

分 佈：臺灣、海南、雲南、貴州、廣西、廣東、湖南、江西、福建、浙江、江蘇、安徽(留鳥)。

Centropus bengalensis lignator Swinhoe 番鵑 (Chen, 1969(2):209; Zheng, 1986:258)

Centropus bengalensis lignator Swinhoe

捕 食 性。

分 佈：臺灣、華南。

Centropus sinensis 褐翅鴉鵑 (Su et al., 1986:39; Yan et al., 1996:186)
捕 食：蝗蟲、昆蟲類、蚯蚓、軟體動物、甲殼類等動物性食物。
分 佈：海南、雲南、貴州、廣西、廣東、湖南、江西、福建、浙江(留鳥)。

Centropus toulou bengalensis (Gmelin) 番鵑 (Chen et Yu, 1984, III:313)
=*Centropus lignator* Swinhoe
=*Centropus bengalennsis takatssukasai* Momiyama
別 名：*小雉哈咕，小毛雞*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(平地普遍鳥)、東南各省。

Chalcites maculatus 翠金鵑 (Yan et al., 1996:182)
捕 食：昆蟲類、鱗翅目幼蟲、蟻。
分 佈：海南、雲南南部(留鳥)；廣西、雲南、西藏東南部、貴州、四川南部、湖南、湖北(夏候鳥)。

Chalcites xanthorhynchus 紫金鵑 (Yan et al., 1996:182)
捕 食：鱗翅目幼蟲(毛蟲)、尺蠖、蟻等。
分 佈：雲南南部、西北部與四川及西藏交界地區(留鳥)。

Clamator coromandus (Linnaeus) 冠郭公 (Chen, 1969(2):209; Chen et Yu, 1984, III:313; Yan et al., 1996:182; Zheng et al., 1981:155)
別 名：*紅翅鳳頭鵑，紅翅鳳哈咕*。
捕 食：昆蟲類、尤其是毛蟲、馬陸。
分 佈：臺灣(高雄、岡山，迷鳥)、廣東、海南、雲南經四川、甘肅轉向東經陝西、河南、山東南部、東南沿海(夏候鳥)。

Cuculus canorus Linnaeus 大杜鵑 (Su et al., 1986:44; Yan et al., 1996:184)
別 名：*布谷*。
捕 食：*Chihuo zoa* Yang 棗尺蠖(幼蟲)
鞘翅目甲蟲。
分 佈：臺灣(迷鳥)；全國(夏候鳥)。

Cuculus canorus fallax Stresemann 大杜鵑 (Tsai et al., 1979:49; Zheng et al., 1981:155)
捕 食：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲(幼蟲)。
分 佈：福建、山東。

Cuculus canorus telephonus Heine 杜鵑 (Chen, 1969(2):210; Chen et Yu, 1984, III:313; Liu et al., 1957:47)
=*Cuculus canorus canorus* Linnaeus
別 名：*布谷鳥，大杜鵑，郭公，鳲鳩、布穀，獲穀，鴶鵴，哈咕*。
捕 食：*Dendrolimus puncatatus* (Walker) 馬尾松毛蟲。

分 佈：臺灣(迷鳥)、冬季移徙大陸南部；日本(繁殖)。

Cuculus fugax hypperythrus Gould 棕腹杜鵑 (Chen et Yu, 1984, III:313; Yan et al., 1996:184; Zhang et Zhou, 1996, 18(4):184)

捕 食：*Diprion liuwanensis* 六萬松葉蜂(幼蟲)
Neodiprion dailingensis 帶嶺新松葉蜂(幼蟲)
Neodiprion guangxiicus 廣西新松葉蜂(幼蟲)
Neodiprion xianyunicus 祥雲新松葉蜂(幼蟲)。

分 佈：臺灣、廣東、福建(留鳥)；海南、雲南、西藏東南端經四川、湖北、河南、河北、遼寧、吉林、黑龍江向東南沿海各省廣大地區(夏候鳥)。

Cuculus micropterus micropterus Gould 四聲杜鵑 (Chang, 1986:162; Li et Wang, 1984:230; Liu et Yan et al., 1996:184; Liu et Zhang, 1993, 15(2):89; Zhang, 1993:89)

別 名：*豌豆八哥，關公好哭，光棍好過，快快割麥，家婆打我*。

捕 食：*Dendrolimus superans* (Butler) 落葉松毛蟲(卵、幼蟲、蛹、成蟲)
茶尺蠖
Podontia tetea Olivier 漆跳甲
茶葉象甲。

分 佈：海南(留鳥)；雲南、西藏南端經四川、甘肅、寧夏、陝西、山西：河北、遼寧、吉林、黑龍江大興安嶺北部、東南沿海各省廣大地區(夏候鳥)。

Cuculus poliocephalus poliocephelus Latham 小杜鵑 (Chen, 1969(2):210; Chen et Yu, 1984, III:313; Zheng, 1986:258; Zheng et al., 1981:155)

別 名：*杜鵑，小布穀，小咯咕*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(1,000m 以下森林中，留鳥)、海南(留鳥)；廣西經湖南、湖北、安徽至浙江北部；及雲南、西藏南部經四川、甘肅、至黑龍江南部之東南廣大地區(夏候鳥)；日本。

Cuculus saturatus saturatus 中杜鵑 (Su et al., 1986:44; Yan et al., 1996:184)

別 名：*筒鳥*。

捕 食：麗綠刺蛾
枯葉蛾科幼蟲。

分 佈：臺灣、海南、雲南經四川向東北至黑龍江及東南沿海各省廣大地區(夏候鳥)。

附 註：中國有二亞種。

Cuculus saturatus horsfieldi Moore 筒鳥 (Chen, 1969(2):210; Chen et Yu, 1984, III:314)

別 名：*中杜鵑*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(普遍過境鳥)、華北、西北、內蒙古、東北各省。

Cuculus saturatus saturatus Blyth 臺灣筒鳥 (Chen, 1969(2):210; Chen et Yu, 1984, III:314; Zheng et al.,

1981:155)
=*Cuculus kelungensis* Swinhoe
別 名：*中杜鵑，喜馬拉雅筒鳥*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(2,800m 以下森林中，普遍過境鳥)、福建、華南、東南、西南各省。

Cuculus sparverioides sparverioides Vigors 大慈悲心鳥 (Chen et Yu, 1984, III:313; Yan et al., 1996:184; Zheng et al., 1981:115)
別 名：*佛駃，鷹鵑，子規，大鷃駃*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(2,300 m 以下森林中，尚稱普遍過境鳥)、海南、雲南南部(留鳥)；西藏南部經四川、陝西、河南、河北遼寧向東南沿海各省(夏候鳥)。

Eudynamus scolopacea 噪鵑 (Yan et al., 1996:186; Zheng et al., 1981:155)
捕 食：昆蟲類、野果、種子。
分 佈：海南（留鳥）。

Eudynamys scolopaceus harterti Ingram 鬼郭公 (Chen, 1969(2):209; Chen et Yu, 1984, III:313)
=*Eudynamys orientalis honorata* (Linnaeus)
別 名：*噪鵑，哥好*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(臺南，偶見迷鳥)、華南普遍留鳥。

Hierococcyx sparverioides (Vigors) 大慈悲心鳥 (Chen, 1969(2):210)
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Oxylophus jacobinus 斑翅鳳頭鵑 (Yan et al., 1996:182)
捕 食：毛蟲、白蟻等昆蟲類、野果。
分 佈：西藏南部(夏候鳥)。

Penthoceryx sonneratii 栗斑杜鵑 (Yan et al., 1996:182)
捕 食：昆蟲類、鱗翅目幼蟲、白蟻等。
分 佈：雲南、四川南部、廣西、貴州與湖南交界地區(留鳥)。

Rhopodytes tristis 綠嘴地鵑 (Yan et al., 1996:188)
捕 食：大型昆蟲、小型脊椎動物。
分 佈：海南、廣西、雲南(留鳥)。

Sumiculus lugubris 烏鵑 (Su et al., 1986:39; Yan et al., 1996:186)
捕 食：鱗翅目幼蟲、鞘翅目甲蟲。
分 佈：海南(留鳥)、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、西藏東南端(夏

候鳥)。

STRIGIFORMES 鴞形目

Tytonidae 草鴞科

Otus spilocephalus hambroecki (Zheng, 1986:259)
捕 食：鼠類等。
分 佈：臺灣。

Tyto alba 倉鴞 (Yan et al., 1996:188)
捕 食：野鼠、小鼠。
分 佈：雲南。

Tyto capensis chinensis 草鴞(中華亞種) (Yan et al., 1996:188; Zheng et al., 1981:157)
捕 食：鼠類。
分 佈：臺灣、雲南、經貴州、湖南、江西、安徽南部至浙江、福建、廣東、廣西。

Tyto capeasis pithecops (Swinhoe) 草鴞 (Chen et Yu, 1984, III:315; Zheng, 1986:259)
=*Strix pithecops* Swinhoe
=*Tyto alba pithecops* (Swinhoe)
=*Tyto capenssis longimembris* (Jerdon)
別 名：*花面梟，草原猴子梟*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(500m 以下疏林中，不甚普遍留鳥)。

Tyto capensis longimembris (Jerdon) 草鴞 (Chen, 1969(2):216)
=*Strix pithecops* Swinhoe
捕 食：鼠類、蛇。
分 佈：臺灣。

Phodilus badius 栗鴞 (Yan et al., 1996:188)
捕 食：鼠類、小鳥、蜥蜴、蛙類。
分 佈：海南、廣西、雲南。

Strigidae 鴟鴞科

Aegolius funereus 鬼鴞 (Yan et al., 1996:198)
捕 食：鼠類、小鳥。
分 佈：甘肅、新疆天山、東北(稀有留鳥)。

Asio flammeus flammeus (Pontoppidan) 短耳虎斑鴞 (Chen, 1969(2):220; Chen et Yu, 1984, III:319; Chen et al., 1993:158; Yan et al., 1996:196)

別 名：*小耳木兔，倉鴞，梟鴞，槲鸖，短耳鴞*。
捕 食：鼠類、大型蛾類。
分 佈：臺灣(草地及農田中，不普遍冬候鳥)、海南、東南沿海、西至新疆西部、東至黑龍江南部(冬候鳥)；東北的西北部(夏候鳥)；歐亞大陸北部(繁殖)，冬季移徙至華南及西南各省。

Asio otus otus (Linnaeus) 長耳鴞 (Chen, 1969(2):220; Chen eet Yu, 1984, III:319; Yan et al., 1996:196; Zhang et al., 1993, 19(6):41-42)
別 名：*長耳虎斑鴞，虎斑木兔，虎鵂，彪木兔，長耳木兔*。
捕 食：黑線倉鼠、大倉鼠、黑線姬鼠、田鼠、大家鼠、小家鼠。
分 佈：臺灣(罕見冬候鳥)；貴州、廣西、廣東、福建、湖南、江西、浙江江南及安徽南部(冬候鳥)；河北、新疆西部(留鳥)；青海、甘肅、寧夏、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江(夏候鳥)。

Athene brama 横紋腹小鴞 (Yan et al., 1996:190)
捕 食：昆蟲類、小鳥、蝙蝠。
分 佈：雲南南端(留鳥)。

Athene noctua 縱紋腹小鴞 (Yan et al., 1996:190)
捕 食 性。
分 佈：西藏經四川、陝西、河南、安徽及江蘇北部、向北及西北廣大地區。

Athene noetua ludlowi (Lei, 1994:141)
捕 食：蜥蜴、芫菁。
分 佈：西藏高原。

Athene noetua orientalis (Lei, 1994:141)
捕 食：沙鼠、跳鼠類。
分 佈：沙漠、荒漠沙丘。

Athene noetua plumipes 小鴞 (Lei, 1994:136-142)
捕 食：黑線姬鼠(*Apodemus agrarius*)、黑線倉鼠(*Cricetulus barabensis*)、大倉鼠(*Cricetulus triton*)、沼澤田鼠(*Microtus fortis*)、田鼠 (*Microtus* spp.)、小家鼠(*Mus musculus*)、甘肅鼢鼠(*Myospalax cansus*)、褐家鼠(*Rattus naregicus*)、達吾爾黃鼠(*Spermo philus*)
雀形目小鳥(Passerine birds)
Locasta dawicus migratoria 飛蝗
Acridoidea 蝗總科
Tettigoniidae 螽蟴
Gryllotalpa unispina 華北螻蛄
Gryllotalpidae 螻蛄
Blattidae 蜚蠊

Carabidae 步甲
Silphidae 埋葬蟲 2 種
Elateridae 叩頭蟲 3 種
Anomala samouella 麗金龜
Rutelidae 麗金龜 2 種
Melolonthidae 金龜 6 種
Scarabacidae 金龜 2 種
Lucanidae 鍬甲
Cerambycidae 天牛
Ichneumonidae 姬蜂
Vespidae 胡蜂
其它昆蟲
蜥蜴 *Scorpionus* sp.
食蟲類 *Sariculus* spp.,
食蟲類 *Sorex* spp.。

分 佈：陝西、青海、甘肅。

Bubo blakistoni 毛腿漁鴞 (Yan et al., 1996:198)
捕 食 性。
分 佈：內蒙古東北部、吉林、黑龍江(稀有留鳥)。

Bubo bubo 鵰鴞 (Lei, 1994:140)
捕 食：褐家鼠(*Rattus norvegicus*)、大倉鼠(*Cricetulus barabensis*)、大鵟(*Buteo hemilasius*)、野兔(*Lepus tolai*)。
分 佈：除臺灣及海南外全國均有分布。

Bubo coromandus 烏鵰鴞 (Yan et al., 1996:196)
捕 食：鳥類、蛙、蛇、蜥蜴。
分 佈：江西、浙江。

Bubo flavipes (Hodgson) 黃魚鴞 (Chen, 1969(2):219; Yan et al., 1996:198)
捕 食：魚類、蛙類。
分 佈：雲南經四川至陝西、向東至江蘇南部、東南沿海廣大地區(留鳥)。

Bubo nipalensis 林鵰鴞 (Yan et al., 1996:196)
捕 食：鳥類、小獸、蜥蜴、魚類。
分 佈：雲南、四川。

Bubo zeylonensis 褐漁鴞 (Yan et al., 1996:198)
捕 食：魚類、蛙類。
分 佈：海南、廣東、廣西、雲南(稀有留鳥)。

Glaucidium brodiei brodiei 領鵂鶹 (Su et al., 1986:39; Yan et al., 1996:190; Zheng et al., 1981:157)

別 名：*鵂鶹*。

捕 食：鼠類、小鳥、鱗翅目幼蟲、昆蟲。

分 佈：臺灣、海南、雲南、西藏東端經四川、甘肅南部、陝西向東至江蘇、浙江、福建、廣東、廣西的東南及西南各省。

Glaucidium brodiei pardalotum (Swinhoe) 鵂鶹 (Chen, 1969(2):220; Chen et Yu, 1984, III:319)

別 名：*領鵂鶹*。

捕 食：鼠。

分 佈：臺灣(1,100-2,800m 間密林中，特產亞種，普遍留鳥)。

Glaucidium cuculoides whiteleyi 斑頭鵂鶹 (Yan et al., 1996:190; Zheng et al., 1981:157)

捕 食 性。

分 佈：海南、雲南、西藏東端經四川、甘肅南部、陝西向東至江蘇、浙江、福建、廣東、廣西的東南及西南各省。

附 註：中國有三亞種。

Glaucidium passerinum 花頭鵂鶹 (Yan et al., 1996:190)

捕 食 性。

分 佈：河北、內蒙古東北部、黑龍江。

Ketupa brodiei paradalotum 黃腳魚鴞 (Zheng, 1986:259)

捕 食 性。

分 佈：臺灣、華南。

Ketupa flavipes (Hodgson) 黃魚鴞 (Chen et Yu, 1984, III:318)

=*Ketupa ketupa flavipes* (Hodgson)

捕 食 性。

分 佈：臺灣(1,000m 以下近溪旁森林中，稀有留鳥)。

Ninox scutulata 鷹鴞 (Yan et al., 1996:194)

別 名：*褐鷹鴞*。

捕 食：昆蟲、蛙、蜥蜴、小鳥、鼠類。

分 佈：臺灣、海南、廣西、廣東、湖南(留鳥)；雲南經四川向東北及東南沿海各省廣大地區(夏候鳥)。

附 註：中國有三亞種。

Ninox scutulata burmanica 鷹鴞 (Zheng, 1986:259; Zheng et al., 1981:158)

捕 食 性。

分 佈：福建；日本。

Ninox scutulata scutulata (Raffles) 青葉鴞 (Chen, 1969(2):220)
捕 食：鼠。
分 佈：臺灣。

Ninox scutulata totogo Momiyama 青葉鴞 (Chen et Yu, 1984, III:319)
別 名：*鷹鵂鶹，綠葉梟，鷹鴞，醬色鷹梟*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(2,000m 以下森林中，普遍留鳥)。

Nyctea scandiaca 雪鴞 (Yan et al., 1996:200)
捕 食：鼠、雪兔、雉、野鴨。
分 佈：陝西、新疆西部、黑龍江(冬候鳥)。

Otus bakkamoena 領角鴞 (Su et al., 1986:39; Yan et al., 1996:192)
捕 食：蝗蟲、鼠。
分 佈：臺灣、廣東、海南、雲南經四川向東北的東南各省弁大地區(留鳥)。
附 註：中國有六亞種。

Otus bakkamoena glabrips (Swinhoe) 赤足木鴞 (Chen, 1969)2):219; Chen et Yu, 1984, III:318; Yan et al., 1996:192; Zheng, 1986:259)
別 名：*光足鵂鶹，領角鴞，花背耳鴞*。
捕 食：鼠類。
分 佈：臺灣(1,200m 以下森林中，普遍留鳥，特產亞種)。

Otus brucei 縱紋角鴞 (Yan et al., 1996:192)
捕 食 性。
分 佈：新疆西部。

Otus elegans 蘭嶼角鴞 (Yan et al., 1996:192)
捕 食：大型蚱蜢。
分 佈：臺灣(蘭嶼)。

Otus scops 紅角鴞 (Yan et al., 1996:192)
別 名：*角鴞*。
捕 食：昆蟲、無脊椎動物、偶食小鳥、果實。
分 佈：臺灣(過境鳥)；長江以南(留鳥)；長江以北、新疆西部、東北(夏候鳥)。
附 註：中國有三亞種。

Otus scops botelensis Kuroda 蘭嶼木葉鴞 (Chen, 1969(2):220; Zheng, 1986:259)
別 名：*普通角鴞*。
捕 食：鼠類。
分 佈：臺灣(蘭嶼特產亞種，濃密森林中留鳥)。

Otus scops japonicus Temminck et Schlegel 日本角鴞 (Chen et Yu, 1984, III:319; Zheng et al., 1981:157)
別 名：*紅角鴞*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(本島，稀見過境鳥)、福建。

Otus scops stictonotus Sharpe 黑龍江角鴞 (Chen et Yu, 1984, III:319)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(稀見過境鳥或迷鳥)。

Otus spilocephalus 黃嘴角鴞 (Yan et al., 1996:192)
捕 食：鼠類、蜥蜴。
分 佈：臺灣、海南、雲南、廣西、廣東、江西、福建。
附 註：中國有二亞種。

Otus spilocephalus hambroecki (Swinhoe) 臺灣木葉鴞 (Chen, 1969(2):219; Chen et Yu, 1984, III:318; Zheng, 1986:259)
別 名：*黃嘴角鴞*。
捕 食：鼠類。
分 佈：臺灣(2,000m 以下闊葉林中，普遍留鳥，特產亞種)。

Otus spilocephalus latouchei 黃嘴角鴞 (Zheng et al., 1981:157)
捕 食 性。
分 佈：福建。

Pandion haliaetus haliaetus 鶚 (Zheng, 1986:258)
捕 食 性。
分 佈：臺灣、華南、華北；日本。

Strix aluco 灰林鴞 (Yan et al., 1996:194)
捕 食：鼠類。
分 佈：臺灣、西藏南部至遼寧南部的東南廣大地區(留鳥)。

Strix aluco yamadae Yamashina 山階氏木鴞 (Chen, 1969(2):219; Chen et Yu, 1984, III:318; Zheng, 1986:259)
Strix aluco yamadae Yamashina
別 名：*灰林鴞*。
捕 食：鼠、鳥類等。
分 佈：臺灣(埔里、阿里山、玉山等地 1,000-2,500m 間森林中，山地留鳥)。

Strix leptogrammica 褐林鴞 (Yan et al., 1996:194)
捕 食 性。
分 佈：臺灣、海南、雲南、貴州、廣西、廣東、福建、江西、湖南南部、浙江、江

蘇及安徽南部(留鳥)。
附 註：中國有二亞種。

Strix leptogrammica caligate Swinhoe 大木鴞 (Chen, 1969(2):219; Chen et Yu, 1984, III:318; Zheng, 1986:259)
Strix leptogrammica caligate Swinhoe
別 名：*褐林鴞*。
捕 食：鼠類等。
分 佈：臺灣(2,000m 左右森林中，不普遍留鳥)、海南、華南。

Strix leptogrammica ticehursti Delacour 大木鴞(華南亞種) (Chen et Yu, 1984, III:318)
別 名：*大梟，林梟，褐林鴞，華南醬色木鴞*。
捕 食 性。
分 佈：東南各省。

Strix nebulosa 烏林鴞 (Yan et al., 1996:194)
捕 食：鼠類。
分 佈：內蒙古東部、黑龍江(留鳥)。

Strix uralensis 長尾林鴞 (Yan et al., 1996:194)
捕 食：鼠、兔。
分 佈：四川、河北、內蒙古東部、遼寧、吉林、黑龍江(留鳥)。

Surnia ulula 猛鴞 (Yan et al., 1996:198)
捕 食：鼠、鳥類、松雞、山雞。
分 佈：新疆西部(夏候鳥)；內蒙古東部及黑龍江西北部(冬候鳥)。

Podargidae 蟆口鴟科

Batrachostomus hodgsoni 黑頂蛙嘴夜鷹 (Yan et al., 1996:200)
捕 食：主要爲昆蟲。
分 佈：雲南西部(稀有高過境鳥)。

Caprimulgidae 夜鷹科

Batrachostomus hodgsoni 黑頂蛙嘴夜鷹 (Yan et al., 1996:200)
捕 食：昆蟲。
分 佈：雲南西部(過境鳥)。

Caprimulgus aegyptius 埃及夜鷹 (Yan et al., 1996:200)
捕 食：小甲蟲、蚊、蠅。
分 佈：新疆西部(夏候鳥)。

Caprimulgus affinis 林夜鷹 (Yan et al., 1996:202)

捕 食：飛行昆蟲。

分 佈：臺灣、福建、廣東、廣西、雲南東南部(留鳥)。

Caprimulgus affinis monticolus Franklin 臺灣夜鷹 (Chen, 1969(2):232; Chen et Yu, 1984, III:320)

捕 食：飛行昆蟲。

分 佈：臺灣。

Caprimulgus affinis stictomus Swinhoe 臺灣夜鷹 (Chen et Yu, 1984, III:320; Zheng, 1986:259)

別 名：*臺灣怪鴟，林夜鷹，山蚊母*。

捕 食：飛行昆蟲。

分 佈：臺灣(蘭嶼，棲息乾涸河床，尚稱普遍留鳥，特產亞種)。

Caprimulgus centralasicus 中亞夜鷹 (Yan et al., 1996:202)

捕 食：小甲蟲、蝗蟲。

分 佈：新疆西南部(夏候鳥)。

Caprimulgus europaeus 歐夜鷹 (Yan et al., 1996:202)

捕 食：小甲蟲、蝗蟲、蠅、虻。

分 佈：甘肅、新疆、內蒙古西北部(夏候鳥)。

Caprimulgus indicus Latham 夜鷹 (Su et al., 1986:39; Yan et al., 1996:202; Zhang et Li, 1982:228)

別 名：*普通夜鷹*。

捕 食：*Odontotermes formosanus* Shiraki 黑翅土白蟻

蠡蟴、蜚蠊、麻皮蝽、稻綠蝽、步甲、牙蟲、天牛、蚊、蠅、蟻、甲蟲。

分 佈：廣東(留鳥)；雲南經四川向東北延伸，經甘肅、寧夏、山西、河北、遼寧、吉林、黑龍江、內蒙古東部及東南沿海各省廣大地區(夏候鳥)。

Caprimulgus indicus jotaka Temminck et Schlegel 普通夜鷹 (Chen et Yu, 1984, III:321; Zheng et al., 1981:158)

捕 食：飛行昆蟲。

分 佈：臺灣(稀見迷鳥)、福建、大陸全境。

Caprimulgus macrurus 長尾夜鷹 (Yan et al., 1996:202)

捕 食：蚊、蚋、小甲蟲。

分 佈：海南、雲南南部(留鳥)。

Eurostopodus macrotis 毛腿夜鷹 (Yan et al., 1996:200)

捕 食：飛行昆蟲。

分 佈：雲南西部。

APODIFORMES 雨燕目

Apodidae 雨燕科

Aerodramus brevirostris 短嘴金絲燕 (Yan et al., 1996:206)
捕 食：空中飛蟲。
分 佈：雲南西部、西藏東南部(留鳥)；四川、貴州、湖南、湖北、陝西南部(夏候鳥)。

Aerodramus fuciphagus 爪哇金絲燕 (Yan et al., 1996:206)
捕 食：飛行昆蟲。
分 佈：海南(留鳥)。

Aerodramus maximus 大金絲燕 (Yan et al., 1996:206)
捕 食：飛行昆蟲。
分 佈：西藏南部(夏候鳥)。

Apus affinis 白腰雨燕 (Su et al., 1986:39; Yan et al., 1996:204)
別 名：*小雨燕*。
捕 食：飛行昆蟲、蚊、蠅、葉蟬。
分 佈：臺灣(留鳥)、海南、雲南、貴州、四川南部、廣西、廣東、福建、江西、浙江(夏候鳥)。

Apus affinis kuntzi Deignan 小白腰雨燕 (Zheng, 1986:259)
捕 食：飛行昆蟲。
分 佈：臺灣(北部，特產亞種)。

Apus affinis subfurcatus (Blyth) 小雨燕 (Chen et Yu, 1984, III:322)
別 名：*小白腰雨燕*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(平地普遍留鳥)、華南；菲律賓、馬來。

Apus pacificus kanoi (Yamashina) 山階氏腰雨燕 (Chen et Yu, 1984, III:322)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(夏候鳥，部分留鳥)、華南各省。

Apus pacificus pacificus Latham 大白腰雨燕 (Chen et Yu, 1984, III:322; Yan et al., 1996:204)
別 名：*白腰雨燕*，*雨燕*。
捕 食：飛行昆蟲。
分 佈：臺灣(蘭嶼，普遍過境鳥，部分留鳥)、西藏經青海、甘肅、內蒙古西部的西南、東南、東北廣大地區(夏候鳥)，大陸各地(繁殖)。

Apus pacificus kanoi 白腰雨燕 (Zheng, 1986:259)
捕 食：飛行昆蟲。

分 佈：臺灣、華南；日本。

Apus apus 樓燕 (Yan et al., 1996:204)
捕 食：飛行昆蟲。
分 佈：四川經青海至新疆西北部、經河南、山東至東北的廣大北方地區(夏候鳥)

Cypsiurus parvus 棕雨燕 (Yan et al., 1996:204)
捕 食：飛行昆蟲、蚊、蚋。
分 佈：海南、雲南西南部(留鳥)。

Hirundapus caudacuta 白喉針尾雨燕 (Yan et al., 1996:206)
別 名：*針尾雨燕*。
捕 食：飛行昆蟲、蚊、蚋。
分 佈：臺灣、雲南西北、西藏南部、四川陝西(留鳥)；河北、內蒙古東部、遼寧、吉林、黑龍江(夏候鳥)。

Hirundapus caudacutes formosanus (Yamashina) 針尾雨燕 (Chen et Yu, 1984, III:322; Zheng, 1986:259)
捕 食：飛行昆蟲。
分 佈：臺灣(600-2,800m 森林中，尚稱普遍留鳥，特有亞種)、華南；日本。

Hirundapus cochinchinensis 灰喉針尾雨燕 (Yan et al., 1996:206)
捕 食：飛行昆蟲。
分 佈：海南(夏候鳥)。

Hemiprocnidae 鳳頭雨燕科

Hemiprocne longipennis 鳳頭樹燕 (Yan et al., 1996:208)
捕 食：飛行昆蟲。
分 佈：雲南西南部(留鳥)。

Trogonidae 咬鵑科

Harpactes erythrocephalus 紅頭咬鵑 (Su et al., 1986:40; Yan et al., 1996:208)
捕 食：蝗蟲、螽蟴、螳螂、大蠶蛾幼蟲、昆蟲、漿果、樹葉。
分 佈：海南、雲南、四川、貴州、廣東、廣西、湖南、江西、福建、浙江(留鳥)。

Harpactes oreskios 橙胸咬鵑 (Yan et al., 1996:208)
捕 食：昆蟲。
分 佈：雲南南部(留鳥)。

Harpactes wardi 紅腹咬鵑 (Yan et al., 1996:208)
捕 食：昆蟲、漿果。

分 佈：雲南西藏界地區(留鳥)。

CARACIFORMES 佛法僧目

Alcedinidae 翠鳥科

Alcedo atthis 普通翠鳥 (Su et al., 1986:40; Yan et al., 1996:210)

捕 食：魚類、甲殼類、水生昆蟲。

分 佈：臺灣、海南、雲南、西藏南部經四川、甘肅、寧夏、陝西、山西至河北的東南廣大地區(留鳥)；新疆西部(冬候鳥及夏候鳥)；河北、內蒙古東部、遼寧、吉林、黑龍江(夏候鳥)。

Alcedo atthis bengalensis Gmelin 普通翠鳥 (Chen et Yu, 1984, III:326; Zheng, 1986:259)

=*Alcedo atthis japonica* Bonaparte

=*Alcedo atthis formosana* Laubmann

別 名：*魚狗，魚獅，川翡翠，柳翠，鴗，天狗，水狗，魚虎，翠雀兒，*

捕 食：魚等。

分 佈：臺灣(各地河川沿岸常見鳥)、華南、華北，全國；菲律賓、日本。

Alcedo hercules 斑頭大魚狗 (Yan et al., 1996:210)

捕 食：魚、蝦、水生昆蟲。

分 佈：海南、雲南東部(留鳥)。

Alcedo meninting 藍耳翠鳥 (Yan et al., 1996:210)

捕 食：魚、蝦、水生昆蟲。

分 佈：雲南南部(留鳥)。

Halcyon coromanda bangsi 赤翡翠 (Chen et Yu, 1984, III:326; Yan et al., 1996:212; Zheng, 1986:259)

捕 食 性。

分 佈：臺灣(本島及蘭嶼，特有亞種)；雲南(留鳥)；東北長白山(夏候鳥)；菲律賓、日本(琉球群島)。

Halcyon coromanda major Temminck et Schlegel 赤翡翠 (Chen et Yu, 1984, III:326)

別 名：*東方赤魚狗，深山翡翠，猩猩翡翠，水乞鳥，紅翠，赤鴗。*

捕 食 性。

分 佈：臺灣(不普遍過境鳥及冬候鳥)、東北諸省(繁殖)。

Halcyon pileata (Boddaert) 黑頭翡翠 (Chang, 1986:163; Chen et Yu, 1984, III:326; Zheng et al., 1981:158)

別 名：*烏頭翡翠，山翡翠，瑠璃翡翠，山鴗，秦椒嘴，鵲雀翠。*

捕 食：主食小魚、非洲螻蛄。

分 佈：臺灣(澎湖，偶見迷鳥)、福建、安徽，大陸全境。

Halcyon smymensis 白胸翡翠 (Yan et al., 1996:212)
別 名：*蒼翡翠*。
捕 食：蛙、蟹、蜥蜴、昆蟲。
分 佈：臺灣(迷鳥)；海南、長江以南、雲南以東(留鳥)。

Halcyon smyrnensis perpulchra Mdarasz 白胸翡翠 (Chen et Yu, 1984, III:326; Zheng et al., 1981:158)
別 名：*藍翡翠*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(偶見迷鳥)、福建、華南。

Meropidae 蜂虎科

Merops apiaster 黃喉蜂虎 (Yan et al., 1996:214)
捕 食：飛行昆蟲。
分 佈：新疆西北部(夏候鳥)。

Merops leschenaulti 栗頭蜂虎 (Yan et al., 1996:214)
捕 食：飛行昆蟲。
分 佈：雲南西南部(留鳥)。

Merops orientalis 綠喉蜂虎 (Yan et al., 1996:214)
捕 食：飛行昆蟲。
分 佈：雲南西南部(留鳥)。

Merops superciliosus 栗喉蜂虎 (Yan et al., 1996:214)
捕 食：飛行昆蟲。
分 佈：海南(留鳥)；雲南、廣西、廣東(夏候鳥)。

Merops viridis 藍喉蜂虎 (Su et al., 1986:40; Yan et al., 1996:214)
捕 食：飛行昆蟲、蜜蜂、蜻蜓。
分 佈：海南(留鳥)；雲南東南部、貴州、廣西、廣東、湖南、江西、福建、湖北(夏候鳥)。

Nyctyornis athertoni 藍鬚夜蜂虎 (Yan et al., 1996:214)
捕 食：飛行昆蟲。
分 佈：海南、雲南西南部(留鳥)。

Coraciidae 佛法僧科

Coracias benghalensis 棕胸佛法僧 (Yan et al., 1996:216)
捕 食：飛行昆蟲。
分 佈：雲南、西藏南部、四川南部(留鳥)。

Coracias garrulus 藍胸佛法僧 (Yan et al., 1996:216)
捕 食：飛行昆蟲。
分 佈：新疆西北部(夏候鳥)。

Coracina fimbriata melanoptera (Riippell) 黑翼鵑鵙 (Liu et al, 1957:47)
別 名：*尾龍眼燕*。
捕 食：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲。
分 佈：湖南。

Coracina novaehollandiae rexpineti 大鵑鵙 (Zheng, 1986:260)
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建。

Eurystomus orientalis 三寶鳥 (Su et al., 1986:40; Yan et al., 1996:216)
別 名：*佛法僧*。
捕 食：昆蟲、同翅目昆蟲、蝽、叩頭蟲、吉丁蟲、雙條杉天牛成蟲、天牛。
分 佈：臺灣、廣東、海南(稀有過境鳥)；雲南經四川向東北延伸至內蒙轉向至東北，其以南及東南廣大地區(夏候鳥)。

Eurystomus orientalis abundus Ripley 佛法僧 (Chen, 1969(2):213)
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Eurystomus oreintalis calonyx Sharpe 三寶鳥 (Chen et Yu, 1984, III:324; Tang, 1991:53; Xu, 1985:25; Zheng et al., 1981:158)
別 名：*佛法僧，老鴰翠*。
捕 食：天牛
葉甲
鱗翅目及膜翅目昆蟲。
分 佈：臺灣(澎湖，稀有冬候鳥過境鳥)福建、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、陝西、東北。

Upupidae 戴勝科

Upupa epops epops Linnaeus 戴勝 (Chen et al., 1993:159; Yan et al., 1996:216)
捕 食：地面上昆蟲、金針蟲、天牛幼蟲、螻蛄。
分 佈：臺灣(稀有過境鳥)；海南、雲南、西藏東南端向東至安徽、江蘇南端以南(留鳥)；西藏南端及東端向北至內蒙古向東至江蘇、向東北至蒙古東部及黑龍江、新疆西北部(夏候鳥)；非洲和歐亞大陸之中、南部。

Upupa epops saturata Lönnberg 戴勝 (Chen et Yu, 1984, III:324; Liu et Zhang, 1993, 15(2):89; Zheng et al., 1981:158)

別 名：*呼哱哱，戴鵀，鵖鴔，臭鳥，鵙，鴉，山鼓鼓，山和尚，髮傘頭鳥*。
捕 食：*Dendrolimus superans* (Butler) 落葉松毛蟲(卵、幼蟲、蛹、成蟲)
Dendrolimus tehchangensis Tsai et Liu 德昌松毛蟲。
分 佈：臺灣(蘭嶼、澎湖，稀有過境鳥)、福建、四川、大興安嶺北部，大陸全境。

Bucerotidae 犀鳥科

Anthracoceros coronatus 冠斑犀鳥 (Yan et al., 1996:218)
捕 食：雜食性，樹上果實、地上小型動物。
分 佈：雲南西南(留鳥)。

PICIFORMS 鴷形目

Capitonidae 五色鳥科(鬚鴷科)

Megalaima asiatica 藍喉擬啄木鳥 (Yan et al., 1996:222)
捕 食：棕樹果。
分 佈：廣西、雲南、貴州(留鳥)。

Megalaima australis 藍耳擬啄木鳥 (Yan et al., 1996:222)
捕 食：榕果、兼食昆蟲。
分 佈：雲南西南部(留鳥)。

Megalaima faiostricta 黃紋擬啄木鳥 (Yan et al., 1996:220)
捕 食：各種果實、兼食昆蟲。
分 佈：海南(留鳥)。

Megalaima haemacephala 赤胸擬啄木鳥 (Yan et al., 1996:222)
捕 食：榕果。
分 佈：雲南西南部(留鳥)。

Megalaima oorii 黑眉擬啄木鳥 (Yan et al., 1996:220)
捕 食：野果、兼食昆蟲。
分 佈：海南(留鳥)。

Megalaima oorti nuchalis (Gould) 五色鳥 (Chen et Yu, 1984, III:329)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(平地至 2,400m 間山林中，特有亞種)。

Megalaima virens virens 大擬啄木鳥 (Su et al., 1986:40; Yan et al., 1996:220; Zheng et al., 1981:158)
捕 食：榕果、甲殼類、昆蟲。
分 佈：雲南、四川、湖南、江西、安徽、江蘇南部、浙江、福建、廣東、廣西、貴

州(留鳥)。

Megalaima zeylanica 斑頭綠擬啄木鳥 (Yan et al., 1996:220)
捕 食：榕果等。
分 佈：雲南西南部(留鳥)。

Eurylaimidae 闊嘴鳥科

Psarisomus dalhousiae 長尾闊嘴鳥 (Yan et al., 1996:222)
捕 食 性。
分 佈：廣西、雲南、貴州(留鳥)。

Serilophus lunatus 銀胸絲冠鳥 (Yan et al., 1996:222)
捕 食：昆蟲、果實、小型動物。
分 佈：海南、廣西、雲南(留鳥)。

Picidae 啄木鳥科

Blythipicus pyrrhotis 黃嘴栗啄木鳥 (Su et al., 1986:40; Yan et al., 1996:230)
捕 食：大量蚊類、蜻蜓目昆蟲、金龜、鞘翅目昆蟲。
分 佈：雲南、貴州、四川南部、湖南、江西、浙江、福建、廣東、廣西(留鳥)。

Blythipicus pyrrhotis sinensis (Rickett) 黃嘴噪啄木 (Zheng et al., 1981:159, 165)
Blythipicus pyrrhotis sinensis (Rickett), 1897:
捕 食 性。
分 佈：福建(武夷山區挂墩)。

Celeus brchyurus 栗啄木鳥 (Yan et al., 1996:230)
捕 食：蟻類。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、西藏東南(留鳥)。

Chrysocolaptes lucidus 中金背啄木鳥 (Yan et al., 1996:234)
捕 食：蠕蟲、兼食樹果。
分 佈：雲南西部(留鳥)。

Dendrocopus canicapillas 星頭啄木鳥 (An et al., 1994:169)
捕 食：*Coraebus* sp. 山楂紋吉丁(山楂 *Crataegus pinnatifida* (Bunge))。
分 佈：山東。

Dendrocopus canicapillus kaleensis 星頭啄木鳥 (Zheng, 1986:260)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(特產亞種)。

Dendrocopus canicapillus scintilliceps Swinhoe 黑頭啄木 (Xu, 1985:25; Zheng et al., 1981:159))

別 名：*星頭啄木鳥*。

捕 食：蚜蟲
蟦
天牛
尺蠖
舟蛾
刺蛾
蟻。

分 佈：福建、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、甘肅。

Dendrocopus cathapharius cathapharius Blyth 赤胸啄木鳥 (Li et Wang, 1979:190)

捕 食 性。

分 佈：西藏(錯那)。

Dendrocopos leucotos fohkiensis (Butarlin) 白背啄木 (Zheng et al., 1981:159, 165)

Dendrocopos leucotos fohkiensis (Butarlin), 1903:

捕 食 性。

分 佈：福建(武夷山區挂墩)。

Dendrocopus leucotus insularis (Gould) 臺灣大赤啄木鳥 (Tsou et al., 1990:63; Zheng, 1986:260)

別 名：*白啄木鳥，神鴷*。

捕 食：樹幹內之幼蟲。

分 佈：臺灣(特產亞種，海拔 800-2,600m 的闊葉林中)。

Dendrocopus major 斑啄木鳥 (An et al., 1994:169; Xiao, 1985(2):29)

捕 食：*Coraebus* sp. 山楂紋吉丁(山楂 *Crataegus pinnatifida* (Bunge))。

分 佈：山東。

Dendrocopus major beicki (Stresemann) 斑啄木鳥 (Xu, 1985:25; Yuan et al., 1989:146-147)

捕 食：*Anoplophora nobilis* (Ganglbauer) 黃斑星天牛(楊樹)
葉甲。

分 佈：陝西、山東、青海、甘肅。

Dendrocopos major mandarinus 斑啄木鳥 (Chen et al., 1993:160; Zheng et al., 1981:159)

捕 食：象甲、天牛幼蟲、金龜、袋蛾、蟦、蟻。

分 佈：福建、江西、廣東、湖北、河南。

Dendrocopus major cabanisi Malherbe 花啄木鳥 (Xu, 1985:25)

捕 食：天牛
吉丁蟲。

分 佈：全國各地。

Dendrocopus sp. 啄木鳥 (He, et al., 1991:148)
捕 食：啄食冬季稻內的螟蟲。
分 佈：浙江(杭州)。

Dinopium javanense 金背三趾啄木鳥 (Yan et al., 1996:234)
捕 食：昆蟲。
分 佈：雲南南部(留鳥)。

Dryobates canicapillus kaleensis (Swinhoe) 臺灣小啄木 (Chen, 1969(2):205)
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Dryobates leucotos insularis (Gould) 臺灣大赤啄木 (Chen, 1969(2):205)
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Dryocopus javensis 白腹黑啄木鳥 (Yan et al., 1996:234)
捕 食：昆蟲。
分 佈：雲南西部(留鳥)。

Dryocopus martius 黑啄木鳥 (Yan et al., 1996:234)
捕 食：昆蟲。
分 佈：雲南、四川西部、西藏東南部經青海、甘肅、寧夏、陝西、山西、河北至內蒙古東部、遼寧、吉林、黑龍江(留鳥)。

Dryocopus javensis feddeni (Blyth) 白腹黑啄木鳥 (Chen, 1984:149)
Dryocopus javensis feddeni (Blyth), 1863:
捕 食 性。
分 佈：福建。

Gecinulus grantia 竹啄木鳥 (Yan et al., 1996:230)
捕 食：甲殼類、昆蟲、蟻。
分 佈：福建、廣東、廣西、雲南(留鳥)。

Gecinulus grantia viridanus Slater 竹啄木 (Zheng et al., 1981:159, 165)
Gecinulus grantia viridanus Slater, 1897:
捕 食 性。
分 佈：福建(武夷山區挂墩)。

Jynx torquilla 蟻鴷 (Yan et al., 1996:224)

別 名：*地啄木*。
捕 食：蟻類、昆蟲。
分 佈：臺灣(迷鳥)；海南、西藏西北端、東南部、經四川、湖北、安徽、江蘇南部以南沿海各省(冬候鳥)；四川、青海、甘肅、內蒙古至東北(夏候鳥)。

Jynx torquill chinensis Hesse 中國地啄木 (Chen, 1969(2):205; Chen et Yu, 1984, III:328; Zheng et al., 1981:158)
Jynx torquill chinensis Hesse
=*Jynx torquill intermedia* Stegmann
別 名：*蟻鴷，鶇鴗*。
捕 食：蟻。
分 佈：臺灣(稀見迷鳥)、福建、華南(過境鳥)、西北、內蒙古、東北諸省；西伯利亞。

Megalaima corti nuchalis 山擬啄木鳥 (Zheng, 1986:259)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(特產亞種)。

Micropternus brachyurus fokiensis 栗啄木 (Zheng et al., 1981:159)
捕 食 性。
分 佈：福建。

Mulleripicus pulverulentus 大灰啄木鳥 (Yan et al., 1996:234)
捕 食：蟻類。
分 佈：雲南南部(留鳥)。

Picoides atratus 紋胸啄木鳥 (Yan et al., 1996:226)
捕 食：昆蟲、漿果。
分 佈：雲南西南部(留鳥)。

Picoides canicapillus 星頭啄木鳥 (Yan et al., 1996:226)
別 名：*小啄木*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、海南、雲南、四川經甘肅、陝西、山西、河北、遼寧、吉林、黑龍江及東南沿海各省廣大地區(留鳥)。
附 註：中國有八亞種。

Picoides cathpharius 赤胸啄木鳥 (Yan et al., 1996:224)
捕 食：昆蟲。
分 佈：雲南、西藏東南部、四川、貴州、湖南、湖北、陝西(留鳥)。

Picoides darjellensis 黃頸啄木鳥 (Yan et al., 1996:228)
捕 食：蠕蟲。

分 佈：雲南、西藏東南、四川(留鳥)。

Picoides hyperythrus 棕腹啄木鳥 (Yan et al., 1996:224)
捕 食：甲蟲。
分 佈：雲南、四川、西藏南部(留鳥)；廣西、貴州(冬候鳥)；黑龍江(夏候鳥)。

Picoides kizuki 小星頭啄木鳥 (Yan et al., 1996:226)
捕 食：昆蟲、漿果、草籽。
分 佈：河北、遼寧、吉林、黑龍江(留鳥)。

Picoides leucopterus 白翅啄木鳥 (Yan et al., 1996:228)
捕 食：昆蟲。
分 佈：新疆西部(留鳥)。

Picoides leucotos 白背啄木鳥 (Yan et al., 1996:228)
別 名：*大赤啄木*。
捕 食：昆蟲。
分 佈：臺灣、福建、四川、陝西、新疆西北、河北、內蒙古東部、遼寧、吉林、黑龍江(留鳥)。

Picoides major 大斑啄木鳥 (Yan et al., 1996:228)
捕 食：各種害蟲。
分 佈：海南、雲南、西藏東端、青海、新疆西北部、甘肅向東至內蒙古東部、遼寧、吉林、黑龍江、往東南沿海廣大各省地區(留鳥)。

Picoides tridactylus tridactylus Linnaeus 三趾啄木鳥 (Xu, 1985:26; Yan et al., 1996:228)
捕 食：天牛
蛀幹害蟲。
分 佈：雲南、西藏東南部、四川、青海、甘肅、新疆西北部＊月蒙古東部 吉林、黑龍江、江西、浙江、安徽、山東(留鳥)。

Picummus innominatus chinensis 姬啄木 (Zheng et al., 1981:158)
捕 食 性。
分 佈：福建。

Picummus innominatus innominatus Burton 姬啄木鳥 (Li et Wang, 1979:190; Su et al., 1986:40; Yan et al., 1996:224)
別 名：*斑姬啄木鳥*。
捕 食：叩頭蟲科幼蟲、蟻類、昆蟲。
分 佈：西藏(墨脫)、四川、甘肅、陝西：河南、安徽、江蘇南部、浙江、福建、廣東、廣西、雲南廣大東南及西南地區(留鳥)。

Picus canus 灰頭綠啄木鳥 (Yan et al.., 1996:232)

別 名：*綠啄木*。

捕 食：春、夏專食昆蟲，秋、冬兼食植物。

分 佈：臺灣、海南、雲南、四川、西藏經青海、甘肅、寧夏延伸至內蒙古東部、遼寧、吉林、黑龍江、河北、山東、東南沿海各省廣大地區(留鳥)。

Picus canus gmelin 綠啄木鳥 (Xiao, 1985(2):29)

捕 食：小蠹蟲。

分 佈：

Picus canus gyldenstolpei Baker 黑枕綠啄木鳥 (Li et Wang, 1979:190)

捕 食 性。

分 佈：西藏(墨脫)。

Picus canus sobrinus 黑枕綠啄木 (Zheng et al., 1981:159)

捕 食 性。

分 佈：福建。

Picus canus tanoclo (Gould) 臺灣山啄木 (Chen, 1969(2):205; Chen et Yu, 1984, III:328; Tsou et al., 1990:65; Zheng, 1986:260)

別 名：*臺灣黑頸綠啄木鳥*，*山啄木*，*黑枕綠啄木鳥*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(特有亞種，1,500-2,800m 中高海拔的闊葉林、混生林或針葉林，不普遍留鳥)。

Picus chlorolophus 黃冠啄木鳥 (Yan et al., 1996:230)

捕 食：蟻類、昆蟲、漿果。

分 佈：福建、廣東、廣西、雲南、貴州、四川西南部、西藏東南部(留鳥)。

Picus chlorolophus citrinocristatus 黃冠綠啄木 (Zheng et al., 1981:159)

捕 食 性。

分 佈：福建。

Picus flavinucha 大黃冠啄木鳥 (Yan et al., 1996:230)

捕 食：昆蟲、漿果。

分 佈：海南、福建、廣東、廣西、雲南、貴州、四川西南部、西藏東南部(留鳥)。

Picus rabieri 紅頸綠啄木鳥 (Yan et al., 1996:232)

捕 食：昆蟲、漿果。

分 佈：雲南東南部(留鳥)。

Picus squamatus squamatus Vigors 鱗腹綠啄木鳥 (Jing et al., 1979:222; Yan et al., 1996:232)

捕 食：蟻類、甲蟲、昆蟲。
分 佈：西藏(吉隆)。

Picus vittatus 花腹綠啄木鳥 (Yan et al., 1996:232)
捕 食：昆蟲。
分 佈：雲南南端(留鳥)。

Picus xanthopygaeus 鱗喉綠啄木鳥 (Yan et al., 1996:232)
捕 食：昆蟲。
分 佈：雲南西部(留鳥)。

Sasia ochracea ochracea Hodson 棕啄木鳥 (Li et Wang, 1979:190; Yan et al., 1996:224)
別 名：*白眉棕啄木鳥*。
捕 食：蟻類。
分 佈：廣西、雲南、西藏(墨脫)、貴州廣西交界地區(留鳥)。

PASSERIFORMES 雀形目

Pittidae 八色鳥科

Pitta brachyura 藍翅八色鶇 (Yan et al., 1996:238)
捕 食：昆蟲。
分 佈：雲南南部(留鳥)。

Pitta brachyura nympha Temminck et Schlegel 八色鳥 (Tsou et al., 1990:67; Zheng, 1986:260)
別 名：*八色鶇，藍翅八色鶇*。
捕 食：蝸牛等動物性食物。
分 佈：臺灣(低海拔闊葉林底層)、華南；日本。

Pitta cyanea 藍八色鶇 (Yan et al., 1996:238)
捕 食：昆蟲。
分 佈：雲南西南部(留鳥)。

Pitta nipalensis 藍枕八色鶇 (Yan et al., 1996:236)
捕 食：昆蟲。
分 佈：廣西、雲南南部(留鳥)。

Pitta nympha 仙八色鶇 (Yan et al., 1996:238)
別 名：*八色鶇*。
捕 食：昆蟲。
分 佈：臺灣、海南、廣西、廣東、湖南、江西、福建、浙江、湖北、安徽、江蘇、山東、河北(夏候鳥)。

Pitta oatesi 栗頭八色鶇 (Yan et al., 1996:236)

捕 食：昆蟲。

分 佈：雲南南部(留鳥)。

Pitta phayrei 雙辮八色鶇 (Yan et al., 1996:236)

捕 食：昆蟲、無脊椎動物、小角型脊椎動物。

分 佈：雲南南部(留鳥)。

Pitta sordida 綠胸八色鶇 (Yan et al., 1996:238)

捕 食：昆蟲。

分 佈：雲南南部(夏候鳥)。

Pitta soror 藍背八色鶇 (Yan et al., 1996:236)

捕 食：昆蟲。

分 佈：海南、廣西、雲南南部(留鳥)。

Alaudidae 伯靈科(雲雀科)

Alauda arensis Linnaeus 雲雀 (Chang, 1986:162; Yan et al., 1996:244)

捕 食：茶尺蠖
茶葉象甲
銅綠金龜
步甲
螺
草籽。

分 佈：廣東、福建、江西、湖南、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、山東、陝西、青海、甘肅向東至遼寧以南(冬候鳥)；新疆向東至遼寧以北(夏候鳥)。

Alauda gulgula 小雲雀 (Yan et al., 1996:244)

捕 食：稗、蓼、地老虎^、蝗蟲。

分 佈：臺灣、海南、雲南經四川、甘肅南部、陝西向東經山西、山東及東南沿海各省廣大地區(留鳥)；四川西部、西藏、青海、甘肅、寧夏(夏候鳥)。

Alauda gulgula coelivox 小雲雀 (Zheng et al., 1981:159)

捕 食 性。

分 佈：福建。

Alauda gulgula wattersi 小雲雀 (Zheng, 1986:260)

捕 食 性。

分 佈：臺灣(特產亞種)。

Calandrella acutirostris 細嘴短趾百靈 (Yan et al., 1996:242)

捕 食：草籽、青稞、昆蟲。

分 佈：四川西北、甘肅、新疆、青海、西藏(夏候鳥)。

Calandrella cheleensis 亞洲短趾百靈 (Yan et al., 1996:242)

捕 食：草籽、昆蟲。

分 佈：西藏經四川西北、甘肅南部、陝西至山東的北方、東北、西北(留鳥)。

Calandrella cinerea 短趾百靈 (Yan et al., 1996:242)

捕 食：草籽、昆蟲。

分 佈：雲南西北經四川、陝西、山西、河北至內蒙古東部，向西及西北廣大地區(夏候鳥)。

Eremophila alpestris 角百靈 (Yan et al., 1996:244)

捕 食：草籽、青稞、昆蟲。

分 佈：雲南西北端、四川、西藏、青海、新疆、甘肅、內蒙古西部(留鳥)；甘肅、寧夏、陝西、山西、河北、內蒙古(夏候鳥)；河北、遼寧、吉林、黑龍江西南部(冬鳥)。

附 註：中國有八亞種。

Galerida cristata 鳳頭百靈 (Yan et al., 1996:244)

捕 食：雜草種子、金龜、僞步甲、象甲。

分 佈：西藏經四川、陝西、河南至山東以北廣大地區(留鳥)。

Melanocorypha bimaculata 二斑百靈 (Yan et al., 1996:240)

捕 食 性。

分 佈：新疆(冬候鳥)。

Melanocorypha leucoptera 白翅百靈 (Yan et al., 1996:240)

捕 食 性。

分 佈：新疆西部(冬候鳥)。

Melanocorypha maxima 長嘴百靈 (Yan et al., 1996:240)

捕 食 性。

分 佈：西藏、雲南西北、青海、甘肅(留鳥)。

Melanocorypha mongolica 蒙古百靈 (Yan et al., 1996:240)

捕 食 性。

分 佈：青海東北、甘肅、寧夏、陝西、山西、河北、與內蒙古接近地區、遼寧、吉林、黑龍江(留鳥)。

Melanocorypha yelteniensis 黑百靈 (Yan et al., 1996:240)

捕 食 性。
分 佈：新疆西北(迷鳥)。

Mirafra javanica 歌百靈 (Yan et al., 1996:244)
捕 食 性。
分 佈：廣東、廣西(夏候鳥)。

Hirundinidae 燕科

Delichon dasypus 煙腹毛腳燕 (Yan et al., 1996:246)
別 名：*毛腳燕*。
捕 食：飛捕昆蟲。
分 佈：臺灣、福建、廣東、廣西(留鳥)；華東經安徽、陝西、青海至西藏夏候鳥)。

Delichon nipalensis 黑喉毛腳燕 (Yan et al., 1996:246)
捕 食：飛捕昆蟲。
分 佈：雲南西部、西藏南部。

Delichon urbica 毛腳燕 (Yan et al., 1996:246)
捕 食 性。
分 佈：新疆北部、江蘇、安徽、湖北至東北(夏候鳥)。
附 註：中國有二亞種。

Delichon urbica nigrimentalis (Hartert) 福建岩燕 (Chen, 1969(2):254; Chen et Yu, 1984, III:336; Zheng, 1986:260; Zheng et al., 1981:159, 165)
Delichon urbica nigrimentalis (Hartert), 1910:
別 名：*毛腳燕*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(山區 1,500-3,000m 處)、福建(武夷山區挂墩)、華南。

Hirundo concolor 純色岩燕 (Yan et al., 1996:248)
捕 食：低飛捕食昆蟲。
分 佈：雲南南部(留鳥)。

Hirando durica Linnaeus 金腰燕 (Chang, 1986:162; Chen, 1969(2):254; Yan et al., 1996:246; Zhang et Li, 1982:228)
捕 食：*Odontotermes formosanus* Shiraki 黑翅土白蟻
蝽
茶葉象甲
金龜
蚊
蜂
蜘蛛。

分 佈：臺灣、福建、廣東(留鳥)；華南、西南、華東、西藏至內蒙古、華北東北(夏候鳥)。
附 註：中國有四亞種。

Hirando daurica japonica 金腰燕(日本亞種) (Zheng et al., 1981:159)
捕 食 性。
分 佈：福建。

Hirundo rupestris 岩燕 (Yan et al., 1996:248)
捕 食：蟻、蠅、虻等。
分 佈：雲南經四川、陝西、至遼寧南部、西藏經青海新疆、至內蒙古東部(夏候鳥。

Hirundo rustica Linnaeus 家燕 (Chang, 1986:162; Feng et al., 1994, 10(3):142; He, et al., 1991:149; Su et al., 1986:40; Tian et al., 1993, 15(4)::155; Yan et al., 1996:248)
捕 食：*Oxya chinensis* 中華稻蝗
稻飛虱
稻葉蟬
蚜蟲
Cnaphalocrocis medinalis Guenée 稻縱捲葉螟(成蟲)
Clostera anastomosis Linnaeus 分月扇舟蛾(幼蟲、成蟲)
茶尺蠖
豆娘
分 佈：臺灣、廣東、海南、雲南(留鳥)；除新疆及西藏部分地區外都有分佈(夏候鳥)。
附 註：中國有四亞種。

Hirundo rustica gutturalis Scopoli 家燕 (Chen, 1969(2):254; Chen et Yu, 1984, III:336; Zheng et al., 1981:159)
別 名：*拙燕*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(普遍春秋過境鳥，少數繁殖)、福建；南洋北至西伯利亞東部。

Hirundo rustica mandschurica Meise 赤腹燕 (Chen, 1969(2):254; Chen et Yu, 1984, III:336)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(臺中、臺南秋冬可見)、東北各省(繁殖)。

Hirundo striolata striolata Temminck et Schlegel 赤腰燕 (Chen et Yu, 1984, III:336; Yan et al., 1996:246; Zheng, 1986:260)
=*Hirundo striolata formosae* Mayr
=*Hirundo daurica striolata* Temminck et Schlegel
別 名：*斑腰燕，大赤腰燕，金腰燕*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(極普遍留鳥，南部較多)；雲南(夏候鳥)；菲律賓。

Hirundo tahitica 洋燕 (Yan et al., 1996:248)

捕 食 性。

分 佈：臺灣(留鳥)

附 註：中國有二亞種。

Hirundo tahitica abbotti Oberholser 馬來燕 (Chen, 1969(2):255; Chen et Yu, 1984, III:337; Zheng, 1986:260)

別 名：*洋燕*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(蘭嶼、綠島繁殖)；菲律賓。

Hirundo tahitica namiyei Stejneger 琉球燕 (Chen, 1969(2):255; Chen et Yu, 1984, III:336; Zheng, 1986:260)

別 名：*洋燕*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(小琉球、高雄、蘭嶼，普遍留鳥)；日本。

Riparia paludicola chinensis (J. E. Gray) 華南砂岩燕 (Chen, 1969(2):255; Chen et Yu, 1984, III:337; Yan et al., 1996:248; Zheng, 1986:260)

別 名：*褐喉沙燕*、*棕沙燕*，*朝鮮小洞燕*。

捕 食：飛捕昆蟲。

分 佈：臺灣(普遍留鳥，全島各地，南部較多)、雲南(留鳥)及西南各省；菲律賓。

Riparia riparia (Linnaeus) 灰沙燕 (Chen et Yu, 1984, III:337; Yan et al., 1996:248)

捕 食：飛捕昆蟲，以蚊、虻、蜉蝣。

分 佈：臺灣(屏東、臺中、關渡，過境鳥)；除雲南及貴州外，福建、江西、湖南、廣東、廣西(冬候鳥)；福建、江西、浙江南部、安徽、湖北、陝西、四川、青海、西藏及新疆南部(留鳥)；華北、西北及東北(夏候鳥)。

Riparia riparia fokienensis 灰沙燕 (Zheng et al., 1981:159)

捕 食 性。

分 佈：福建。

Motacillidae 鶺鴒科

Anthus cervinus (Pallas) 赤喉鷚 (Chen, 1969(2):273; Chen et Yu, 1984, III:341; Yan et al., 1996:252)

別 名：*紅喉鷚*，*赤胸鷚*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(本島、蘭嶼、澎湖，普遍冬候鳥)、海南、雲南、廣西、廣東、福建、江西、湖南、浙江、江蘇南部、安徽、湖北、貴州、四川(冬候鳥)。

Anthus compestris 平原鷚 (Yan et al., 1996:254)

捕 食：昆蟲。

分 佈：新疆北部(夏候鳥)。

Anthus godlewskii 布萊氏鷚 (Yan et al., 1996:254)

捕 食 性。

分 佈：四川西北經青海至新疆東北部、甘肅、寧夏、內蒙古(夏候鳥)。

Anthus gustavi gustavi Swinhoe 白背鷚 (Chen, 1969(2):273; Chen et Yu, 1984, III:341)

別 名：*北鷚*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(稀有過境鳥)；廣東、福建(冬候鳥)，黑龍江東北(夏候鳥)，東北各省(繁殖)；西伯利亞(繁殖)。

Anthus hodgsoni hodgsoni Richmond 樹鷚 (Chang, 1986:161; Chen, 1960(2):273; Chen et Yu, 1984, III:342; Su et al., 1986:40; Yan et al., 1996:256; Zheng et al., 1981:159)

別 名：*木鷚*，*青鷚*。

捕 食：蝗蟲
叩頭蟲幼蟲
茶葉象甲
黑絨金龜
蝗蟲
步甲
蛾
蠅
蜂
蟻
草籽。

分 佈：臺灣(冬候鳥)、海南、雲南東部、貴州、四川東南部、廣西、廣東、福建、江西、湖南、浙江、江蘇、安徽南部(冬候鳥)；雲南、西藏南部(留鳥)；西藏東部經四川、青海、甘肅、陝西、山西、河北、內蒙古至東北廣大地區(夏候鳥)。

Anthus hodgsoni yunanensis Uchida et Kuroda 雲南樹鷚 (Chen et Yu, 1984, III:342)

=*Anthus maculates yunnannensis* Uchida et Kuroda

捕 食 性。

分 佈：臺灣(澎湖，稀見冬候鳥)、華北、東北諸省；西伯利亞東部。

Anthus novaeseelandiae richardi Vieillot 大花鷚 (Chen et Yu, 1984, III:341; He, et al., 1991:149)

別 名：*白眉田鷚*，*長爪鷚*。

捕 食：(稻田)、地面昆蟲。

分 佈：臺灣(尚稱普遍過境鳥及冬候鳥)、全國(夏候鳥)；海南(冬候鳥)；雲南(留鳥)；夏季在東北至山東、江蘇沿海和濱海地區，冬季遷到我國南部或更南地區如泰國、印度等地越冬，內蒙古及東北(繁殖)；西伯利亞(繁殖)。

Anthus novaeseelaniae sinensis 田鷚 (Zheng et al., 1981:159)

捕 食 性。

分 佈：福建。

Anthus pratensis 草地鷚 (Yan et al., 1996:256)

捕 食：昆蟲、植物種子。

分 佈：新疆西北(冬候鳥)。

Anthus richardi richardi Vieillot 大花鷚 (Chen, 1969(2):273)

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Anthus roseatus 粉紅胸鷚 (Yan et al., 1996:254)

捕 食 性。

分 佈：海南、廣西、廣東(冬候鳥)；雲南、貴州、四川南部(留鳥)；湖北、河南、河北、山西、陝西、甘肅、青海、西藏、新疆西南(冬候鳥)。

Anthus spinoletta 水鷚 (Yan et al., 1996:254)

別 名：*褐色鷚*。

捕 食：昆蟲。

分 佈：臺灣、雲南、廣西、廣東、福建、江西、湖南、浙江、江蘇、安徽、湖北、四川、河北(冬候鳥)；四川西北部、青海、甘肅、新疆西北部(留鳥)。

Anthus spinoletta blakistoni Swinhoe 小水鷚 (Chen, 1969(2):273)

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Anthus spinoletta coutellii Audouin 小水鷚 (Chen et Yu, 1984, III:341)

=*Anthus spinoletta blakistoni* Swinhoe

別 名：*水鷚*，*水雞兒*，*褐色鷚*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(不普遍冬候鳥，常見於北部各地)、冬季南徙西南、華南、華北(冬候鳥)；西伯利亞東部(繁殖)。

Anthus spinoletta japonicus 水鷚 (Zheng et al., 1981:160)

捕 食 性。

分 佈：福建。

Anthus sylvanus 山鷚 (Yan et al., 1996:256)

捕 食 性。

分 佈：雲南、廣西、廣東、福建、浙江、安徽南部、江西、湖南、貴州、四川南部(留鳥)。

Anthus trivialis 林鷚 (Yan et al., 1996:256)

捕 食：昆蟲、草籽。

分 佈：新疆西北(夏候鳥)。

Dendronanthus indicus (Gmelin) 山鶺鴒 (Chang, 1986:161; Chen et Yu, 1984, III:343; Su et al., 1986:44; Yan et al., 1996:250; Zheng et al., 1981:159)

別 名：*林鶺鴒*。

捕 食：蝗蟲
油桐尺蠖
茶捲葉蛾
茶銀尺蠖
扁刺蛾
綠刺蛾
異色瓢蟲
三突花蛛
蛞蝓
蝸牛。

分 佈：臺灣(偶見迷鳥，恒春、左營)；海南、雲南、四川、貴州、湖南、江西南部、福建、廣東、廣西(冬候鳥)；浙江向西至四川轉向東北至內蒙古東部及東北三省(夏候鳥)；西伯利亞東部。

Motacilla alba Linnaeus 白臉鶺鴒 (Chang, 1986:161; Su et al., 1986:44; Yan et al., 1996:252)

別 名：*白鶺鴒*。

捕 食：沫蟬
非洲螻蛄
步甲
瓢蟲
葉甲科成蟲
鞘翅目
茶尺蠖
土蜂
蜘蛛
地面昆蟲
雜草種子。

分 佈：海南(冬候鳥)；廣東、福建經江西、湖北、陝西、甘肅、青海東南、西藏西南的南部廣大地區(留鳥)；華東、華北、西北及東北全部(夏候鳥)。

附 註：中國有七亞種。

Motacilla alba grandis Sharpe 日本大花鶺鴒 (Chen, 1969(2):273; Chen et Yu, 1984, III:342; Yan et al.., 1996:252)

別 名：*日本鶺鴒*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(偶見迷鳥)、福建(迷鳥)；日本各地(繁殖)。

Motacilla alba leucopsis Gould 白面鶺鴒 (Chen, 1969(2):273; Chen et Yu, 1984, III:342; Zheng et al., 1981:159)

別 名：*白頰鶺鴒，瀕鴒，馬蘭花，白臉鶺鴒，白顫兒*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(本島、蘭嶼、澎湖，普遍留鳥)、福建、西南、華北、西北諸省；西伯利亞東部。

Motacilla alba lugens Kittlitz 白鶺鴒 (Chen, 1969(2):273; Chen et Yu, 1984, III:342)

別 名：*白鴒*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(尚稱普遍冬候鳥，澎湖)、華北、東北各省。

Motacilla alba ocularis Swinhoe 臺灣白鶺鴒 (Chen, 1969(2):274; Chen et Yu, 1984, III:342; Zheng et al., 1981:159)

別 名：*灰背眼紋鶺鴒，馬蘭花兒，白顫，黑臉紋鶺鴒*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(不甚普遍留鳥及冬候鳥)、福建、西南、華北、西北；西伯利亞東部。

Motacilla cinerea caspica (S. G. Gmelin) 黃鶺鴒 (Chen, 1969(2):274; Su et al., 1986:40; Yan et al., 1996:250)

捕 食：蜻蜓目昆蟲、盾蝽、稻綠蝽、龍蝨、尺蠖幼蟲、大腿蜂、胡蜂、蜜蜂、蠅蛆、蜘蛛。

分 佈：臺灣(留鳥)；海南、雲南、廣西、廣東、福建、江西、湖南、安徽、浙江、江蘇、湖北、四川(冬候鳥)；西藏東南、新疆西北、四川、青海、甘肅、寧夏、山西、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江(夏候鳥)。

附 註：中國有三亞種。

Motacilla cinerea citreola 黃頭鶺鴒 (Chen et Yu, 1984, III:342; Yan et al., 1996:250; Zheng et al., 1981:159)

捕 食：昆蟲。

分 佈：臺灣(臺北，偶見迷鳥)、雲南、西藏南部(留鳥)；福建至雲南(冬候鳥)；雲南經四川、甘肅、寧夏、河北至東北及西北廣大地區(夏候鳥)，東南沿海、華南、華北各省(過境鳥及冬候鳥)、東北(繁殖)。

Motacilla cinerea robusta (Brehm) 灰鶺鴒 (Chen et Yu, 1984, III:342; Zheng, 1986:269; Zheng et al., 1981:159)

別 名：*黃領，黑喉灰鶺鴒*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(全省各地，蘭嶼及澎湖)、福建、華北、大陸全境；日本。

Motacilla flava 黃鶺鴒 (Yan et al., 1996:250)

捕 食：昆蟲。

分 佈：臺灣、海南、廣西、廣東、福建(冬候鳥)；新疆西北部；甘肅、寧夏、內蒙

古、遼寧、吉林、黑龍江(夏候鳥)。
附 註：全球有十八亞種，中國有九亞種。

Motacilla flava simillima Hartert 白眉黃鶺鴒 (Chen, 1969(2):274; Chen et Yu, 1984, III:343; Zheng et al., 1981:159)
別 名：*長爪白眉黃鶺鴒，黃馬蘭花兒，黃顫兒*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(全省各地、蘭嶼)、福建、華北、東北，冬季向華南移徙，西伯利亞東部繁殖。

Motacilla flava taivana (Swinhoe) 黃眉黃鶺鴒 (Chen, 1969(2):274; Chen et Yu, 1984, III:342
別 名：*黃眉鶺鴒，長爪鶺鴒，長爪鴒，黃馬蘭花兒，長爪黃眉黃鶺鴒*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(全省各地、蘭嶼)、華北、東北，冬季向華南移徙，西伯利亞東部繁殖。

Motacilla maderaspatensis 大鶺鴒 (Yan et al., 1996:252)
捕 食：昆蟲。
分 佈：雲南西部(迷鳥)。

Campephagidae 山椒鳥科

Coracina melaschistos 暗灰鵑鵙 (Su et al., 1986:40; Yan et al., 1996:260)
別 名：*黑翅山椒鳥*。
捕 食：尺蛾科及鱗翅目幼蟲、痲皮蝽若蟲、眼蝶幼蟲、葉甲。
分 佈：廣東、海南、雲南、四川西南、西藏南部(留鳥)；四川至河北的東南廣大地區(夏候鳥)。
附 註：中國有四亞種。

Coracina melaschistor avensis (Blyth) (Chen et Yu, 1984, III:344)
捕 食 性。
分 佈：西南各省。

Coracina melaschistos intermedia (Hume) 黑翅山椒鳥 (Chen et Yu, 1984, III:344)
=*Campephaga lugubris asakurai* Kuroda
別 名：*暗灰鵑鵙*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(可能迷鳥，亦可能稀有留鳥)、東南、西南、華西、華北各省。

Coracina novaehollandiae 大鵑鵙 (Yan et al., 1996:260)
別 名：*花翅山椒鳥*。
捕 食：昆蟲。
分 佈：臺灣、海南、雲南、西藏東南、四川南部、貴州南部、廣西、廣東、福建、

江西南部(留鳥)。
附 註：中國有三亞種。

Coracina novaeholllandiae rexpineri (Swinhoe) 花翅山椒鳥 (Chen et Yu, 1984, III:344)
=*Graucalus rexpineti* Swinhoe
=*Graucalus javensis mellianus* Stresemann
別 名：*大鵑鵙，灰龍眼燕*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(不甚普遍留鳥，各地闊葉林中)、福建、廣東、廣西等省。

Hemipus picatus 褐背鵑鵙 (Yan et al., 1996:260)
捕 食：昆蟲。
分 佈：廣西、貴州、雲南、西藏東南(留鳥)。

Pericrocotus brevirostris 短嘴山椒鳥 (Yan et al., 1996:258)
捕 食：昆蟲。
分 佈：廣東、廣西、湖南西部、雲南、四川及西藏南部(夏候鳥)。

Pericrocotus cantonensis 小灰山椒鳥 (Yan et al., 1996:260)
捕 食：昆蟲。
分 佈：海南、廣西、廣東、福建、江西、湖南、浙江、江蘇南部、安徽、湖北、河南、陝西南部、四川東部、貴州東部(夏候鳥)。

Pericrocotus divaricatus divaricatus (Raffles) 灰山椒鳥 (Chen et Yu, 1984, III:344; Yan et al., 1996:260)
別 名：*灰燕兒*。
捕 食：昆蟲。
分 佈：臺灣(不甚普遍過境鳥，澎湖)、內蒙古東北、吉林、黑龍江(夏候鳥)，秋冬南徙至華南；西伯利亞。

Pericrocotus ethologus 長尾山椒鳥 (Yan et al., 1996:258)
捕 食：昆蟲。
分 佈：雲南、廣西經湖南、湖北、河南西部至河北，向西南經山西、陝西、甘肅、四川至西藏南部(夏候鳥)。

Pericrocotus flammeus 赤紅山椒鳥 (Su et al., 1986:40; Yan et al., 1996:258)
捕 食：蝗蟲、半翅目昆蟲、金龜、燈蛾科幼蟲。
分 佈：海南、西藏東南、四川南部、貴州、廣西、廣東、福建、江西、湖南、浙江(留鳥)。

Pericrocotus roseus 粉紅山椒鳥 (Yan et al., 1996:258)
捕 食：昆蟲。
分 佈：雲南東部、貴州、廣西、廣東、福建、江西、湖南、浙江、江蘇、安徽、河

南、陝西、四川(夏候鳥)。

Pericrocotus solaris 灰喉山椒鳥 (Su et al., 1986:40; Yan et al., 1996:258)
捕 食：刺蛾、尺蛾等幼蟲、葉甲、象甲、蝽科、盾蝽、沫蟬、角蟬、螽蟴、螳螂、蟻、膜翅目成蟲、狼蛛。
分 佈：臺灣、海南、雲南、貴州、廣西、廣東、福建、江西、湖南、浙江南部(留鳥)。

Pericrocotus solaris griseigularis Gould 紅山椒鳥 (Chen et Yu, 1984, III:344; Tsou et al., 1990:79)
別 名：*小緋鳥，戲仔鳥，灰喉山椒鳥*。
捕 食：昆蟲。
分 佈：臺灣(海拔 300-2500m 闊葉林中，普遍留鳥)、海南、廣東、廣西、湖南、華南。

Tephrodornis gularis 鉤嘴林鵙 (Yan et al., 1996:260)
捕 食：昆蟲。
分 佈：雲南西南及東南、貴州南部、廣西、廣東、福建、江西東部、浙江南部(留鳥)。

Pycnonotidae 鵯科

Criniger flaveolus 黃腹冠鵯 (Yan et al., 1996:268)
捕 食：果實、昆蟲。
分 佈：雲南南部(留鳥)。

Criniger pallidus 白喉冠鵯 (Yan et al., 1996:268)
捕 食：果實、昆蟲。
分 佈：南海、廣西、貴州、雲南(留鳥)。

Hypsipetes amaurotis 栗耳短腳鵯 (Yan et al., 1996:266; Zheng, 1986:266)
別 名：*棕耳鵯*。
捕 食：果實、昆蟲。
分 佈：臺灣(留鳥)；北京、上海、寧波(過境鳥)；日本。

Hypsigetes amaurotis nagamichii Deignan 臺灣鵯 (Chen et Yu, 1984, III:346; Zheng, 1986:260)
=*Hypsipetes amaurotis harterti* Kuroda
別 名：*棕耳鵯，栗耳短腳鵯*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(本島南部、蘭嶼及綠島普遍鳥，特產亞種)。

Hypsipetes castanonotus 栗背短腳鵯 (Yan et al., 1996:266)
捕 食：果實、昆蟲。

分 佈：海南、廣西、廣東、福建、江西、湖南、貴州(留鳥)。

Hypsipetes madagascariensis nigerrimus Gould 紅嘴黑鵯 (Chen et Yu, 1984, III:346)
別 名：*黑鵯，紅嘴烏秋*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(普遍留鳥，1,500m 以下疏林中，特有亞種)。

Hypsipetes flavalus 灰短腳鵯 (Yan et al., 1996:266; Zheng, 1986:266)
捕 食：果實、昆蟲。
分 佈：雲南(留鳥)。

Hypsipetes flavalus canipennis 栗背短腳鵯 (Su et al., 1986:40; Zheng et al., 1981:160)
捕 食：魚蛉、沫蟬、紅腳綠金龜、鞘翅目成蟲、鱗翅目幼蟲、竨蜂、蚊、蠅。
分 佈：福建、廣東。

Hypsipetes madagascariensis 黑短腳鵯 (Su et al., 1986:40; Yan et al., 1996:266; Zheng, 1986:266)
別 名：*紅嘴黑鵯*。
捕 食：果實、昆蟲。
分 佈：臺灣、海南、廣東、廣西、雲南、四川西南、西藏東南(留鳥)；四川、陝西、湖北、安徽、江蘇南部、東南沿海的廣大地區(夏候鳥)。

Hypsipetes madagascariensis leucocephalus 黑(短腳)鵯 (Zheng et al., 1981:160)
捕 食 性。
分 佈：福建。

Hypsipetes madagascariensis nigerrimus 黑(短腳)鵯 (Zheng, 1986:260)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(特產亞種)。

Hypsipetes mcclellandii 綠眼短腳鵯 (Su et al., 1986:40; Yan et al., 1996:266)
捕 食：果實、蜻蜓、沫蟬、食蟲虻成蟲、竨蜂、蛛蜂、蜾蠃、蜜蜂。
分 佈：廣東、海南、長江流域以南各省及東南沿海(留鳥)。

Hypsipetes mcclellandii holtii 綠翅短腳鵯 (Zheng et al., 1981:160)
捕 食 性。
分 佈：福建。

Hypsipetes propinquus 灰眼短腳鵯 (Yan et al., 1996:266)
捕 食：果實、昆蟲。
分 佈：廣西、雲南(留鳥)。

Picnonotus atriceps 黑頭鵯 (Yan et al., 1996:264)

捕 食：果實、昆蟲。
分 佈：雲南西部(留鳥)。

Pycnonotus aurigaster chrysorrhoides 白喉紅臀鵯 (Su et al., 1986:40; Yan et al., 1996:262; Zheng et al., 1981:160)
捕 食：果實、蜻蜓、蟬、葉甲、蜂類、蟻。
分 佈：廣東、東南及西南部(留鳥)。

Pycnonotus cafer 黑喉紅臀鵯 (Yan et al., 1996:262)
捕 食：果實、昆蟲。
分 佈：雲南西南(留鳥)。

Pycnonotus flavescens 黃綠鵯 (Yan et al., 1996:264)
捕 食：果實、昆蟲。
分 佈：雲南西南(留鳥)。

Pycnonotus finlaysoni 紋喉鵯 (Yan et al., 1996:264)
捕 食：果實、昆蟲。
分 佈：雲南西南(留鳥)。

Pycnonotus hainanus taivanus Styan 烏頭翁 (Chen, 1969(2):304; Tsou et al., 1990:133)
捕 食 性。
分 佈：臺灣、海南。

Pycnonotus jocusus 紅耳鵯 (Su et al., 1986:40; Yan et al., 1996:262)
捕 食：果實、蝗蟲、蟬、象甲、益蜂科成蟲、其它昆蟲。
分 佈：雲南、西藏東南端、貴州南部、廣西、廣東(留鳥)。

Pycnonotus melanicterus 黑冠黃鵯 (Yan et al., 1996:264)
捕 食：果實、昆蟲。
分 佈：雲南、廣西南部(留鳥)。

Pycnonotus sinensis formosae Hartert 白頭翁 (Chen, 1969(2):304; Chen et Yu, 1984, III:346; Zheng, 1986:260)
別 名：*白頭鵯*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(西部平原，極普遍留鳥，特有亞種)。

Pycnonotus sinensis sinensis (Gmelin) 白頭鵯 (Chang, 1986:161; Su et al., 1986:40; Yan et al., 1996:264; Zheng et al., 1981:160)
別 名：*白頭翁*。
捕 食：茶尺蠖
非洲螻蛄

銅綠金龜
螳螂
蛾類
縊蜂
胡蜂
蜘蛛
果實。
分 佈：臺灣、海南、廣西、貴州、四川、甘肅、陝西、河南、安徽、江蘇南部、東南沿海諸省廣大地區(留鳥)。
附 註：中國有三亞種。

Pycnonotus sinensis tresemanni La Touche (Zheng et al., 1981:165)
Pycnonotus sinensis tresemanni La Touche, 1925:
捕 食 性。
分 佈：福建(武夷山區挂墩)。

Pycnonotus striatus 縱紋綠鵯 (Yan et al., 1996:262)
捕 食：果實、昆蟲。
分 佈：雲南(留鳥)。

Pycnonotus taiwanus Styan 臺灣鵯 (Chen et Yi, 1984, III:346; Yan et al., 1996:264; Zheng, 1986:260)
別 名：*烏頭翁*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(南部及東部，特有種，普遍留鳥)。

Pycnonotus xanthorrhous 黃臀鵯 (Yan et al., 1996:262; Zhang et Zhou, 1996, 18(40:184)
捕 食：果實、昆蟲
Neodiprion xianyunicus 祥雲新松葉蜂(幼蟲)。
分 佈：西南及東南沿海、西藏東南經四川至甘肅，再轉向經陝西至江蘇南部的廣大地區(留鳥)。

Spizixos canifrons 鳳頭雀嘴鵯 (Yan et al., 1996:268)
捕 食：果實、昆蟲。
分 佈：雲南(留鳥)。

Spizixos semitorques 領雀嘴鵯 (Yan et al., 1996:268)
捕 食：野果、昆蟲。
分 佈：臺灣(留鳥)；甘肅、陝西、河南、長江流域以南、偶見越南東北部。

Spizixos semitorques cinereicapillus Swinhoe 白環鸚嘴鵯 (Chen et Yu, 1984, III:346; Zheng, 1986:160)
別 名：*綠鵯，鶵嘴鵯，圓嘴鵯，綠鸚嘴鵯，藍頭公，四抹子*。
捕 食 性。

分 佈：臺灣(各地 2,300m 以下樹林中，特產亞種)。

Spizixos semitorques semitorques 綠鸚嘴鵯 (Zheng et al., 1981:160)

捕 食 性。

分 佈：福建。

Irenidae 和平鳥科

Aegithina lafresnayei 大綠雀鵯 (Yan et al., 1996:268)

捕 食：果實、草籽、昆蟲。

分 佈：雲南南部(留鳥)。

Aegithina tiphia 黑翅雀鵯 (Yan et al., 1996:268)

捕 食：果實、草籽、昆蟲。

分 佈：雲南南部(留鳥)。

Chloropsis aurifrons 金額葉鵯 (Yan et al., 1996:270)

捕 食：花、果實。

分 佈：雲南西南部(留鳥)。

Chloropsis cochinchinensis 藍翅葉鵯 (Yan et al., 1996:270)

捕 食：果實、草籽、昆蟲。

分 佈：雲南南部西南部(留鳥)。

Chloropsis hardwickei 橙腹葉鵯 (Su et al., 1986:40; Yan et al., 1996:270)

捕 食：種子、果實、蝗蟲、螽蟴、螳螂、直翅目昆蟲、蠅類。

分 佈：海南、西藏東南、雲南、貴州、廣西、廣東、湖南、江西、福建、浙江(留鳥)。

Irena puella 和平鳥 (Yan et al., 1996:270)

捕 食：果實、昆蟲。

分 佈：雲南南部(留鳥)。

Laniidae 伯勞科

Lanius bucephalus bucephalus Temminck et Schlegl 牛頭伯勞 (Chen, 1969(2):285; Chen et Yu, 1984, III:349; Yan et al., 1996:272)

別 名：*紅頭伯勞，伯勞，蠻子，麻軋軋，江湖伯勞*。

捕 食：昆蟲、小動物、小鳥、鼠類。

分 佈：臺灣(稀見冬候鳥)；廣東、福建、江西、湖南北部、貴州、雲南與四川邊界、四川、甘肅、陝西南部、山西南部、河北、遼寧、山東、江蘇向西的廣大地區(冬候鳥)；甘肅向東北狹帶延伸至黑龍江南部(夏候鳥)，西北、華北、東北

省，冬季移徙華南。
附 註：中國有二亞種。

Lanius collurio 紅背伯勞 (Yan et al., 1996:272)
捕 食 性。
分 佈：青海、甘肅西北部、新疆、內蒙古中西部(夏候鳥)；中亞、
附 註：中國有五亞種。

Lanius collurioides 栗背伯勞 (Yan et al., 1996:272)
捕 食 性。
分 佈：廣東、廣西、雲南(低海拔留鳥)。

Lanius cristatus 紅尾伯勞 (Liu et al., 1999, 21(3):99; Yan et al., 1996:272)
捕 食：棉蝗(木麻黃)
螻蛄、甲蟲等爲主食，也食蜥蜴等小動物。
分 佈：臺灣、海南、雲南北部、四川、貴州東南部、廣西、廣東、湖南、江西南部、福建(冬候鳥)；青海東部經甘肅南部、寧夏、陝西、山西、河北、內蒙古東部、遼寧、吉林、黑龍江南至冬候鳥分布的廣大地區(冬候鳥)。

Lanius cristatus lucionensis Linnaeus 灰頭紅尾伯勞 (Chang, 1986:161; Chen, 1969(2):285; Chen et Yu, 1984, III:349; Tsou et al., 1990:135; Zheng et al., 1981:160)
別 名：*烏頭，菲律賓紅尾伯勞，花尾伯勞，呂宋紅尾伯勞*。
捕 食：茶尺蠖
油桐尺蠖
大袋蛾
銅綠金龜
步甲
瓢蟲
象甲
蜘蛛
蟻
蜥蜴
蛙
小哺乳動物
漿果。
分 佈：臺灣(普遍冬候鳥及過境鳥)、福建、安徽、東南、華西、華北、東北各省；菲律賓。

Lanius cristatus superciliosus Latham 紅尾伯勞 (Chen et Yu, 1984, III:349)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(普遍過境鳥及冬候鳥)、華北各省，冬季南徙東南各省。

Lanius excubitor 灰伯勞 (Yan et al., 1996:274)

捕 食：鼠、蜥蜴、昆蟲、小鳥。

分 佈：寧夏(留鳥)；甘肅、青海東部、新疆、內蒙古、陝西、山西北部、河北、遼寧、吉林、黑龍江(冬候鳥)；新疆北部(夏候鳥)。

附 註：中國有六亞種。

Lanius excubitoroides 灰背伯勞 (Yan et al., 1996:274)

捕 食：甲蟲、鱗翅目幼蟲、蟻、鼠類。

分 佈：雲南(留鳥)；雲南北部、貴州西部、四川、西藏、青海、甘肅、內蒙古西南、陝西(夏候鳥)。

Lanius minor 黑額伯勞 (Yan et al., 1996:274)

捕 食 性。

分 佈：新疆北部(稀有夏候鳥)。

Lanius schach 棕背伯勞 (Su et al., 1986:40; Yan et al., 1996:274)

捕 食：蜻蜓、蝗蟲、稻綠蝽、蝽科、紅腳綠金龜、葉甲、鱗翅目幼蟲、土蜂、蜜蜂、蛙、小鳥。

分 佈：臺灣、海南、黃河以南的廣大地區：雲南、貴州、廣西、廣東、湖南、江西、福建、浙江、江蘇南部、安徽、湖北、河南南部、陝西南部、甘肅、四川、西藏東南部(留鳥)。

附 註：中國有四亞種。

Lanius schach formosae Swinhoe 棕背伯勞 (Chen et Yu, 1984, III:349; Zheng, 1986:260)

捕 食：昆蟲。

分 佈：臺灣(西部各地甚多，東部較少，特產亞種，普遍留鳥)。

Lanius schach schach Linnaeus 棕背伯勞 (Chang, 1986:160; Zheng et al., 1981:160)

捕 食：茶尺蠖
油桐尺蠖
大袋蛾
茶袋蛾
扁刺蛾
小地老虎
非洲螻蛄
尖頭螞蚱
銅綠金龜甲
螳螂
虎甲
步甲
蜘蛛

青蛙
魚蝦
漿果。
分 佈：福建、安徽。

Lanius schach formosae Swinhoe 棕背伯勞 (Chen, 1969(2):284)
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Lanius sphenocercus sphenocercus Cabanis 楔尾伯勞 (Chen et Yu, 1984, III:349; Yan et al., 1996:274)
別 名：*長尾灰伯勞*。
捕 食：鼠、蛙、蜥蜴。
分 佈：臺灣(宜蘭，偶見迷鳥)；廣東、福建、江西東部、浙江、安徽、江蘇、湖北、河南、山東、河北、遼寧、陝西、四川(冬候鳥)；四川經西藏東端、青海、甘肅、內蒙古向東北延伸至東北(夏候鳥)。

Lanius tigrinus Drapiez 虎紋伯勞 (Chang, 1986:161; Chen et Yu, 1984, III:349; Yan et al., 1996:272)
捕 食：蝗蟲
非洲螻蛄
茶毛蟲
茶尺蠖
大袋蛾
茶葉象甲
茶籽象甲
大黑金龜。
分 佈：臺灣(偶見迷鳥)；雲南東部、廣西、廣東、湖南南部、江西、福建、浙江(冬候鳥)；貴州、四川、甘肅、陝西、山西、河北、遼寧、吉林、黑龍江南部、山東、江蘇以西的廣大地區(夏候鳥)。

Bombycillidae 太平鳥科(連雀科)

Bombycilla garrulus centralasiae Poliakov 黃連雀 (Chen et Yu, 1984, III:347;Yan et al., 1996:276)
別 名：*太平鳥*。
捕 食：油松、忍冬、衛矛等植物種子、昆蟲。
分 佈：臺灣(陽明山，偶見迷鳥)、江蘇、安徽、湖北東北部、陝西東北、河南、山東、山西、河北內蒙古東部、遼寧、吉林、黑龍江南部、寧夏、新疆西部(冬候鳥)；西伯利亞東部。

Bombycilla japonica (Siebold) 朱連雀 (Chen et Yu, 1984, III:3347; Yan et al., 1996:276)
別 名：*緋連雀，十二紅，小太平鳥，紅尾鳥*。
捕 食：植物果實、嫩枝、種子、昆蟲。

分 佈：臺灣(臺北、淡水，偶見迷鳥)；江蘇、安徽、河南、山東、河北、遼寧、吉林(冬候鳥)；西伯利亞東部。

Cinclidae 河烏科

Cinclus cinclus 河烏 (Yan et al., 1996:276)

捕 食：水生昆蟲、植物碎片。

分 佈：雲南北部、四川西部、甘肅、青海、西藏、新疆南部及西北部(留鳥)。

Cinclus pallasi pallasi Temminck 臺灣河烏 (Chen et Yu, 1984, III:358; Yan et al., 1996:276)

=*Cinclus hyddrobata marila* Swinhoe

別 名：*河烏，褐河烏*。

捕 食：水生昆蟲、植物碎片。

分 佈：臺灣(2,000m 以下森林溪畔，普遍留鳥)、西藏南部經青海東南、甘肅、寧夏、陝西、山西、河北、遼寧、吉林、黑龍江以南、西南、東南廣大的地區、新疆西北(留鳥)。

Troglodytidae 鷦鷯科

Troglodytes troglodytes taivanus Hartert 臺灣鷦鷯 (Yan et al., 1996:278)

別 名：*鷦鷯，山蟈蟈兒*。

捕 食：昆蟲、蜘蛛、小型動物。

分 佈：臺灣(2,500m 以上矮叢中，尚稱普遍，特有亞種)、雲南經貴州、湖北、河南、河北、內蒙古與遼寧邊界、遼寧、吉林、黑龍江、西藏東南部經青海、甘肅、內蒙古南邊、新疆西北部(留鳥)；廣東、福建、浙江、江蘇、安徽東邊及北部、河南東部、山東(冬候鳥)。

Prunellidae 岩鷚科

Prunella atrogularis 黑喉岩鷚 (Yan et al., 1996:280)

捕 食 性。

分 佈：西藏西部、新疆西部及西北部(稀有夏候鳥)。

Prunella collaris 領岩鷚 (Yan et al., 1996:278)

別 名：*岩鷚*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣、四川、西藏、青海、新疆西南及西北部、甘肅、陝西、寧夏、內蒙古中西部(留鳥)；河南、山東、山西、河北、遼寧南部(冬候鳥)；四川西北部、山西、河北、內蒙古東部、遼寧、吉林、黑龍江(夏候鳥)。

附 註：中國有七亞種。

Prunella collarisfennelli Deignan 臺灣岩鷚 (Chen et Yu, 1984, III:360)

別 名：*領岩鷚*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(冬季在 2,100-2,700m，夏季在 2,900-3,600m 山林中，尚稱普遍，特有亞種。

Prunella fulvescens 褐岩鷚 (Yan et al., 1996:280)
捕 食：甲蟲、蟻、蝸牛。
分 佈：四川西北部、西藏、青海、甘肅南部、新疆西部及東北部(留鳥)；甘肅北部、寧夏、陝西、山西河北北部、內蒙古中西部(冬候鳥)；內蒙古東部(夏候鳥)。

Prunella himalayana 高原岩鷚 (Yan et al., 1996:278)
捕 食：甲蟲、蟻、蠅、種子、青稞。
分 佈：西藏西南部、新疆西部及北部(夏候鳥)。

Prunella immaculata 栗背岩鷚 (Yan et al., 1996:280)
捕 食：昆蟲、種子。
分 佈：四川、西藏東南部(留鳥)；雲南、四川南端(冬候鳥)。

Prenella koslowi 賀蘭山岩鷚 (Yan et al., 1996:280)
捕 食：嫩芽、昆蟲。
分 佈：寧夏(賀蘭山)(留鳥)。

Prenella montanella 棕眉山岩鷚 (Yan et al., 1996:280)
捕 食：草籽、昆蟲。
分 佈：山東、河南、陝西、甘肅、寧夏、山西、河北、遼寧(冬候鳥)。

Prunella rubeculoides 鴝岩鷚 (Yan et al., 1996:278)
捕 食：昆蟲、草籽、青稞、油菜籽。
分 佈：西藏西南部、四川、青海、甘肅(留鳥)。

Prunella strophiata 棕胸岩鷚 (Yan et al., 1996:278)
捕 食：植物種子、昆蟲。
分 佈：雲南西北、西藏東南部、四川、青海、甘肅、陝西(留鳥)。

Turdidae 鶇科

Brachypteryx goodgellowi Ogilvie-Grant 小翼眼鶇 (Chen et Yu, 1984, III:370; Tsou et al., 1990:117)
別 名：*頭翅鶇*。
捕 食：昆蟲。
分 佈：臺灣(1,000-2,500m 的闊葉林底層，特有種)。

Brachypteryx hyperythra 銹腹短翅鶇 (Yan et al., 1996:282)

捕 食：昆蟲。
分 佈：雲南西北端(留鳥)。

Brachypteryx leucophrys 白喉短翅鶇 (Yan et al., 1996:282)
捕 食：昆蟲。
分 佈：雲南、四川、貴州、廣西、廣東、湖南、江西、福建(留鳥)。

Brachypteryx leucophrys carolinae La Touche 白喉短翅鶇 (Zheng et al., 1981:165)
Brachypterux leucophrys carolinae La Touche, 1898:
捕 食 性。
分 佈：福建(武夷山區挂墩)。

Brachypteryx montana 藍短翅鶇 (Yan et al., 1996:282)
捕 食：昆蟲。
分 佈：臺灣、福建經江西、湖北、陝西南部、甘肅南端、四川至西藏東南部以南及東南各省的廣大地區(留鳥)。
附 註：中國有三亞種。

Brachypteryx montanus sinensis Rickett 藍短翅鶇 (Zheng et al., 1981:165)
Brachypterux montanus sinensis Rickett, 1897:
?*Enicurus maculatus omissus* Rothschild, 1921:
?*Monticola rufiventer sinensis* Meinertzhagen, 1927:
捕 食 性。
分 佈：福建(武夷山區挂墩)。

Brachypteryx stellata 栗背短翅鶇 (Yan et al., 1996:282)
捕 食：昆蟲。
分 佈：雲南西北、西藏東南端(留鳥)。

Cinclidium frontale 藍額長腳地鴝 (Yan et al., 1996:296)
捕 食 性。
分 佈：四川(留鳥)。

Cinclidium leucurum 白尾藍地鴝 (Yan et al., 1996:296)
別 名：*白尾鴝*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、海南、雲南、廣西西部、貴州、湖南及湖北西部、陝西南部、甘肅南端、四川東部(留鳥)。

Cinclidium leucurum montium (Swinhoe) 白尾鴝 (Chen et Yu, 1984, III:370; Tsou et al., 1990:119; Zheng, 1986:261)
別 名：*紺鴝*。
捕 食 性。

分 佈：臺灣(海拔 1000-2500m 間密林中，特產亞種)。

Cochoa purpurea 紫寬嘴鶇 (Yan et al., 1996:302)
捕 食 性。
分 佈：廣西西部、雲南、貴州、四川、甘肅(留鳥)。

Cochoa viridis 綠寬嘴鶇 (Yan et al., 1996:304)
捕 食 性。
分 佈：福建、雲南南部(留鳥)。

Copsychus malabaricus 白腰鵲鴝 (Yan et al., 1996:290)
捕 食：昆蟲。
分 佈：海南、雲南西南部(留鳥)。

Copsychus saularis 鵲鴝 (Su et al., 1986:41; Yan et al., 1996:290)
捕 食：蝗蟲、蜚蠊目、白蟻、盾蝽、獵蝽、紅腳綠金、金龜、瓢蟲、葉甲、天牛、小蠹科、螟蛾科、尺蛾科、枯葉蛾科、紅頭麗蠅、麻蠅蛆、蟻、蜘蛛、螃蟹。
分 佈：海南、雲南、貴州、四川、陝西南端、湖北、安徽南部、江蘇南端、浙江、福建、江西、湖南、廣東、廣西(留鳥)。

Copsychus saularis prosthopellus 鵲鴝 (Zheng et al., 1981:161)
捕 食 性。
分 佈：福建。

Enicurus leschenaulti 黑背燕尾 (Yan et al., 1996:298)
捕 食 性。
分 佈：海南、華南、雲南、貴州、四川、甘肅南部、陝西南部、河南南部、安徽江蘇南部及沿海各省的廣大地區(留鳥)。

Enicurus leschenaulti sinensis 黑背燕尾 (Zheng et al., 1981:161)
捕 食 性。
分 佈：福建。

Enicurus maculatus 斑背燕尾 (Yan et al., 1996:298)
捕 食 性。
分 佈：福建、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、西藏東南部(留鳥)。
附 註：中國有三亞種。

Enicurus schistacerus 灰背燕尾 (Su et al., 1986:41; Yan et al., 1996:298)
捕 食：豆娘、蝗蟲、蟋蟀、白蟻類、蝽科、同翅目、蜉蝣目、脈翅目、虎甲科、步甲科、叩甲科、金龜科、葉甲科、小蠹科等
分 佈：廣東、華南、雲南、貴州、四川(留鳥)。

Enicurus schistacerus sinensis 灰背燕尾 (Zheng et al., 1981:161)

捕 食 性。

分 佈：福建。

Enicurus scouleri fortis (Hartert) 小剪尾 (Chen et Yu, 1984, III:370; Yan et al., 1996:298; Zheng, 1986:261; Zheng et al., 1981:161)

別 名：*白里鶺，小燕尾，中國小剪尾*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(900-2,500m 山中溪旁，稀見留鳥)、福建、華南、華中、西南各省、西藏東南部、青海東端向東延伸至浙江(留鳥)。

Enicurus scouleri fortis Hartert 小剪尾 (Tsou et al., 1990:121)

別 名：*小燕尾，白里鶺*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(中海拔森林的小溪澗)。

Erithacus akahige 日本歌鴝 (Yan et al., 1996:284)

捕 食：昆蟲。

分 佈：臺灣、廣西、廣東、福建(冬候鳥)。

Erithacus brunneus 栗腹歌鴝 (Yan et al., 1996:288)

捕 食：昆蟲。

分 佈：雲南西北、四川、陝西西南、甘肅南部、青海東南部、西藏南部(留鳥)。

Erithacus calliope 紅喉歌鴝 (Yan et al., 1996:284)

別 名：*野鴝*。

捕 食：昆蟲。

分 佈：臺灣、海南、廣東、廣西、雲南、貴州南部(冬候鳥)；四川北部、青海東部、甘肅、寧夏內蒙古東北端、吉林、黑龍江(夏候鳥)。

Erithacus cyane 藍歌鴝 (Yan et al., 1996:286)

捕 食：昆蟲、漿果、草籽。

分 佈：臺灣(迷鳥)；福建、浙江(冬候鳥)；河北北部、內蒙古東部、遼寧、吉林、黑龍江(夏候鳥)。

Erithacus hyperythrus 棕腹林鴝 (Yan et al., 1996:288)

捕 食：鞘翅目昆蟲。

分 佈：雲南西北、四川西南、西藏南部(留鳥)。

Erithacus indicus 白眉林鴝 (Yan et al., 1996:288)

捕 食 性。
分 佈：臺灣、雲南西北部、四川、西藏東南部(留鳥)。

Erithacus johnstoniae 栗背林鴝 (Yan et al., 1996:288)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(留鳥)。

Erithacus kamadori 琉球歌鴝 (Yan et al., 1996:284)
捕 食：昆蟲。
分 佈：臺灣(迷鳥)。

Erithacus obscurus 黑喉歌鴝 (Yan et al., 1996:286)
捕 食：昆蟲。
分 佈：陝西、甘肅南端、雲南(稀有夏候鳥)。

Erithacus pectardens 金胸歌鴝 (Yan et al., 1996:286)
捕 食 性。
分 佈：雲南西北部、四川、陝西、甘肅、西藏(留鳥)；緬甸北部、阿薩姆、印度、錫金。

Erithacus pectoralis 黑胸歌鴝 (Yan et al., 1996:284)
捕 食：步行蟲等昆蟲、釘螺。
分 佈：雲南西北端經四川、陝西西緣、寧夏、甘肅、青海、西藏東南部及西南緣、新疆西邊(夏候鳥)。

Erithacus ruficeps 棕頭歌鴝 (Yan et al., 1996:286)
捕 食：昆蟲。
分 佈：陝西(秦嶺)(留鳥)；馬來西亞。

Erithacus rubecula 歐亞鴝 (Yan et al., 1996:284)
捕 食：昆蟲、漿果。
分 佈：甘肅北部、新疆北部大半地區、內蒙古西北部(過境鳥)。

Erithacus sibilans 紅尾歌鴝 (Yan et al., 1996:286)
捕 食：昆蟲。
分 佈：廣東、廣西、雲南、四川西端、西藏東端(冬候鳥)；內蒙古東北端、吉林、黑龍江(夏候鳥)。

Grandala coelicolor 藍大翅鴝 (Yan et al., 1996:298)
捕 食：昆蟲。
分 佈：雲南西北端、四川西部、陝西南部、甘肅、青海東南端、西藏東南部(留鳥)。

Hodgsonius phaenicuroides 白腹短翅鴝 (Yan et al., 1996:296)

捕 食 性。

分 佈：雲南西北部、西藏東南部經四川、青海東端、甘肅、寧夏、陝西、山西、河北、湖北(留鳥)。

Luscinia akahige akahige (Temminck) 鴝鳥 (Chen et Yu, 1984, III:371)

捕 食 性。

分 佈：臺灣(本島、澎湖，偶見迷鳥)、華北各省，冬季稀徙東南各省。

Luscinia calliope callioppe (Pallas) 野鴝 (Chen et Yu, 1984, III:371)

別 名：*紅點頦，紅脖，紅喉歌鴝*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(尙稱普遍冬候鳥)、西北各省。

Luscinia calliope camtschatkensis (Gmelin) 大野鴝 (Chen et Yu, 1984, III:371)

捕 食 性。

分 佈：臺灣(稀見冬候鳥)；西伯利亞東部。

Luscinia megarhynchos 新疆歌鴝 (Yan et al., 1996:290)

捕 食：昆蟲。

分 佈：新疆西北(夏候鳥)。

Luscinia sibilans (Swinhoe) 紅尾歌鴝 (Chen et Yu, 1984, III:371; Su et al., 1986:41)

捕 食：蝗蟲、螞蟻。

分 佈：臺灣、廣東、東南沿海各省(過境鳥及冬候鳥)、華南、華北(過境鳥)、東北各省(繁殖)。

Luscinia svecicus svecicus (Linnaeus) 藍喉歌鴝 (Chen et Yu, 1984, III:371; Yan et al., 1996:290)

別 名：*藍喉鴝，藍點頦*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(臺中，偶見迷鳥)、福建、廣東、雲南西南部(冬候鳥)；新疆西部及西北部、內蒙古東北部、黑龍江(夏候鳥)，冬季南徙華南。

附 註：中國有五亞種。

Monticola cinclorhynchus 藍頭磯鶇 (Su et al., 1986:44; Yan et al., 1996:394)

捕 食：蝗蟲、螻蛄、蝽、天牛。

分 佈：廣西、廣東、福建、江西、湖南、浙江南部(冬候鳥)；陝西、山西、河北、內蒙古東北部、吉林、黑龍江(夏候鳥)。

Monticola rufiventris 栗腹磯鶇 (Yan et al., 1996:394)

捕 食 性。

分 佈：雲南、貴州、西藏南部、四川、甘肅、陝西、湖北、江西、福建、湖南、廣

東、廣西(留鳥)。

Monticola saxatilis 白背磯鶇 (Yan et al., 1996:394)

捕 食 性。

分 佈：新疆、青海、甘肅、寧夏、河北、內蒙古(夏候鳥)。

Monticola solitarius 藍磯鶇 (Yan et al., 1996:394)

捕 食 性。

分 佈：臺灣(冬候鳥)；海南、雲南、西藏西南及東南、四川、湖南、湖北、江西、福建、浙江南部、新疆西北(留鳥)；四川至東北及華東沿海各省區(夏候鳥)。

附 註：中國有三亞種。

Monticola solitaria pandoo (Sykes) 藍磯鶇 (Chen et Yu, 1984, III:369; Zheng et al., 1981:161)

捕 食 性。

分 佈：臺灣(南投水里，稀見迷鳥)、福建、華中西北諸省。

Monticola solitarius philippensis (P.L.S. Müller) 栗腹磯鶇 (Chen et Yu, 1984, III:368; Zheng, 1986:261)

=*Monticola philippensis taivanensis* Momiyama

別 名：*藍磯鶇*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(1,700m 以下空曠處，普遍冬候鳥及過境鳥)、華北、東北諸省(繁殖)。

Myiophoneus coeruleus coeruleus 紫嘯鶇 (Su et al., 1986:42; Zheng et al., 1981:161)

捕 食：蝗蟲、蠼螋、紅腳綠金龜、虎甲、步甲、葉甲科、尺蠖、鱗翅目幼蟲、蟻、蝸牛、澤蛙。

分 佈：福建、廣東。

Myiophoneus insularis Gould 臺灣紫嘯鶇 (Chen et Yu, 1984, III:368; Tsou et al., 1990:123; Zheng, 1986:261)

別 名：*琉璃鳥*。

捕 食：蚯蚓、爬蟲、昆蟲等。

分 佈：臺灣(特有種，從海邊防風林帶至海拔 200-2000m 的溪流邊，普遍留鳥)。

Oenanthe deserti 漠鵰 (Yan et al., 1996:302)

捕 食 性。

分 佈：西藏經青海、甘肅、寧夏至內蒙中部的西北地區(留鳥)。

Oenanthe hispanica 白頂鵰 (Yan et al., 1996:302)

捕 食 性。

分 佈：新疆、青海、甘肅、寧夏、陝西、山西、河北、內蒙古(夏候鳥)。

Oenanthe isabellina 沙鵰 (Yan et al., 1996:302)

捕 食 性。

分 佈：新疆、青海、甘肅、寧夏、陝西、山西、河北、內蒙古(留鳥)。

Oenanthe oenanthe 穗鵖 (Yan et al., 1996:302)

捕 食 性。

分 佈：新疆、青海、甘肅、寧夏、陝西、山西、河北、內蒙古(留鳥)。

Phoenicurus alaschanicus 賀蘭山紅尾鴝 (Yan et al., 1996:292)

捕 食：昆蟲。

分 佈：青海、甘肅、寧夏(留鳥)；陝西、山西、河北(冬候鳥)。

Phoenicurus auroreus auroreeus (Pallas) 北紅尾鴝 (Chen et Yu, 1984, III:372; Li et al., 1992:65; Su et al., 1986:41; Yan et al., 1996:294; Zheng et al., 1981:161)

別 名：*常鷄，上鷄，朗鷄，黃尾鴝，頂紅尾鴝，花紅燕兒，灰頂紅尾鴝，溪鴝，籬知更鳥*。

捕 食：鼻白蟻科、鞘翅目、蟻類、油松種實害蟲。

分 佈：臺灣(1,599m 以下矮叢中，稀見冬候鳥)、廣東、海南、雲南、四川東南邊、湖北南邊、安徽東南、江蘇南部、浙江、福建、江西、湖南長江以南的廣大地區(冬候鳥)；雲南西北端經四川、陝西、山西、河北、內蒙古東北部、遼寧、吉林、黑龍江及青海東部、西藏東南部(夏候鳥)；西伯利亞。

Phoenicurus caeruleocephalus 藍頭紅尾鴝 (Yan et al., 1996:292)

捕 食：昆蟲。

分 佈：新疆西部(留鳥)。

Phoenicurus erythrogaster 紅腹紅尾鴝 (Yan et al., 1996:294)

捕 食 性。

分 佈：雲南西北、四川中南、西藏東端(冬候鳥)；寧夏、甘肅、青海、新疆(夏候鳥)。

Phoenicurus erythronotus 紅背紅尾鴝 (Yan et al., 1996:292)

捕 食：鞘翅目、蟻。

分 佈：新疆西北部(留鳥)。

Phoenicurus frontalis 藍額紅尾鴝 (Yan et al., 1996:294)

捕 食：昆蟲、燕麥、草籽。

分 佈：雲南經貴州、湖北、陝西、寧夏、甘肅南部、青海東部、西藏東南部(留鳥)。

Phoenicurus fuliginosus 紅尾水鴝 (Yan et al., 1996L296)

別 名：*鉛色水鶇*。

捕 食：昆蟲、種子。

分 佈：臺灣、海南、雲南、四川、西藏東南部、青海東端、甘肅、寧夏、陝西、山西、河北、遼寧西南端、山東、江蘇、東南沿海的廣大地區(留鳥)。

Phoenicurus hodgsoni 黑喉紅尾鴝 (Yan et al., 1996:294)

捕 食：昆蟲。

分 佈：雲南西北端經四川西北部、甘肅、青海東部、西藏東南部(留鳥)；雲南東北端、貴州西北部、四川東部、湖南北部、湖北西南部、陝西南部(冬候鳥)。

Phoenicurus leucocephalus 白頂溪鴝 (Yan et al., 1996L296)

捕 食 性。

分 佈：中部至西南地區(留鳥或夏候鳥)；華南(冬候鳥)。

Phoenicurus ochruros 赭紅尾鴝 (Yan et al., 1996:294)

捕 食 性。

分 佈：臺灣、海南、河北(迷鳥)；雲南西北端經四川陝西、山西、內蒙古中部向西包括甘肅、寧夏、青海、西藏、新疆(留鳥)。

附 註：中國有三亞種。

Phoenicurus phoenicurus 歐亞紅尾鴝 (Yan et al., 1996:292)

捕 食：昆蟲。

分 佈：新疆西部(夏候鳥)。

Phoenicurus schisticeps 白喉紅尾鴝 (Yan et al., 1996:292)

捕 食：蟻、蜘蛛。

分 佈：雲南西北端、四川、陝西西南端、甘肅東南部、青海東部、西藏東南部(留鳥)。

Rhyacornis fuliginosus 紅尾水鴝 (Su et al., 1986:41)

捕 食：蜻蜓目、鞘翅目。

分 佈：廣東。

Rhyacornis fuliginosus affinis (Ogilvie-Grant) 鉛色水鶇 (Chen et Yu, 1984, III:370; Tsou et al., 1990:125; Zheng, 1986:261)

別 名：*川鶲，溪鴝燕，石青兒*。

捕 食：以水上的昆蟲爲主要食物。

分 佈：臺灣(普遍見於河川下流以至 2,300m 高山溪澗，特有亞種)。

Rhyacornis fuliginosus fuliginosus 紅尾水鴝 (Zheng et al., 1981:161)

捕 食 性。

分 佈：福建。

Saxicola caprata 白斑黑石鵖 (Yan et al., 1996:300)

捕 食 性。

分 佈：雲南、四川南部(留鳥)。

Saxicola ferrea 灰林鵖 (Su et al., 1986:44; Yan et al., 1996:300)

捕 食：蚊及其它昆蟲、草籽。

分 佈：西藏南部經四川、甘肅、陝西、河南、安徽、江蘇南部以南的華南、西南廣大地區(留鳥)。

Saxicola ferrea haringtoni (Hartert) 灰叢鵖 (Chen et Yu, 1984, III:372)

別 名：*山崎鶲，灰林鵖*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(嘉義，偶見迷鳥)、華南、西南各省。

Saxicola insignis 白喉石鵖 (Yan et al., 1996:300)

捕 食 性。

分 佈：青海、內蒙古(過境鳥)。

Saxicola jerdoni 黑白林鵖 (Yan et al., 1996:300)

捕 食：昆蟲。

分 佈：雲南西南(留鳥)。

Saxicola torquata 黑喉石鵖 (Su et al., 1986:44; Yan et al., 1996:300)

別 名：*黑喉鴝*。

捕 食：大蟋蟀、稻綠蝽、步甲科、象甲科昆蟲、蟻。

分 佈：臺灣、海南、廣西、廣東、湖南南部、江西、福建、浙江南部(冬候鳥)；廣西西部、雲南、貴州及四川南部(留鳥)；貴州、四川、西藏東部、青海、甘肅、寧夏、陝西、湖北、新疆西北部、內蒙古東部、遼寧、吉林、黑龍江(夏候鳥)。

附 註：中國有三亞種。

Saxicola torquata stejnegeri (Parrot) 黑喉鵖 (Chen et Yu, 1984, III:371; Zheng et al., 1981:161)

別 名：*野鶲，黑喉石鵖，石子石棲鳥，麥尖*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(臺中，稀見迷鳥或冬候鳥)、福建、東北各省；西伯利亞東部。

Tarsiger chrysaeus 金色林鴝 (Yan et al., 1996:290)

捕 食 性。

分 佈：雲南西北部、四川、陝西南部、甘肅南端、西藏東南部(留鳥)。

Tarsiger cyanurus cyanurus (Hartert) 藍尾鵖 (Chen et Yu, 1984:372; Su et al., 1986:41; Yang et Li, 1989:121; Yan et al., 1996:288; Zheng et al., 1981:161)

別 名：*藍尾鴝，琉璃鶲，青鶲、藍尾把根子，吁拉子，輕尾兒，藍點岡兒，紅咔藍尾鴝*。

捕 食：*Coleophora dahurica* Falkovitsch 落葉松鞘蛾

小蠹科、螞蟻、其它昆蟲。

分 佈：臺灣(2,800m 以下林中，不普遍冬候鳥)、廣東、海南、雲南東部、四川東南部、福建、吉林、東北；西伯利亞。
附 註：中國有二亞種。

Tarsiger indicus formosanus Hartert 白眉林鴝 (Chen et Yu, 1984, III:372; Zheng, 1986:261)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(2,000-2,700m 間森林中，特產亞種，不甚普遍留鳥)。

Tarsiger johnstoniae (Ogilvie-Grant) 阿里山鴝 (Chen et Yu, 1984, III:372; Tsou et al., 1990:127; Zheng, 1986:261)
別 名：*栗背林鴝*。
捕 食：昆蟲、蜘蛛、野生漿果。
分 佈：臺灣(海拔 2000-3500m 森林的下層，特有種，尚稱普遍)。

Turdus albocinctus 白頸鶇 (Yan et al., 1996:310)
捕 食：昆蟲。
分 佈：四川、西藏南部(留鳥)。

Turdus boulboul 灰翅鶇 (Yan et al., 1996:310)
捕 食：昆蟲。
分 佈：廣西、雲南、貴州(夏候鳥)。

Turdus cardis 黑鶇 (Yan et al., 1996:314; Zheng et al., 1981:161)
別 名：*烏灰鶇*。
捕 食：小型動物、昆蟲、果實。
分 佈：臺灣(霧社，稀見冬候鳥)；海南、廣西、廣東、福建(冬候鳥)；四川、湖南、湖北、安徽西部、河南南部(夏候鳥)。

Turdus chrysolaus Temminck 赤腹鶇 (Chen et Yu, 1984, III:369; Yan et al., 1996:312)
別 名：*赤胸鶇*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(全省及蘭嶼、澎湖，普遍冬候鳥) 、海南、廣東、福建、浙江(冬候鳥)。

Turdus dissimilis 黑胸鶇 (Yan et al., 1996:314)
捕 食：螺類、甲殼類、昆蟲、果實。
分 佈：雲南、貴州西南、四川西南、西藏東南(留鳥)。

Turdus feae 褐頭鶇 (Yan et al., 1996:312)
捕 食 性。
分 佈：河北(夏候鳥)。

Turdus hortulorum Sclater 灰背鶇 (Chen et Yu, 1984, III:369; Su et al., 1986:42; Yan et al., 1996:312; Zheng et al.,

1981:161)
別 名：*鶥鴰*。
捕 食：蟻、其它昆蟲、蝸牛、小螺、果實。
分 佈：臺灣(平地至 1,000m 森林中，偶見冬候鳥)、雲南東邊經貴州、湖南、江西至浙江南部、福建、廣東、廣西(冬候鳥)；華北以南過境鳥；東北三省東部(夏候鳥)。

Turdus iliacus 白眉歌鶇 (Yan et al., 1996:316)
捕 食：昆蟲、漿果。
分 佈：新疆北部、內蒙古西北部(過境鳥)。

Turdus merula Linnaeus 黑鶇 (Chang, 1986:162; Li et Wang, 1984:230; Tang, 1991:53)
捕 食：*Podontia tutea* Olivier 漆跳甲
松毛蟲
蟻
地下害蟲
蜘蛛。
分 佈：浙江、安徽、湖北。

Turdus merula mandarinus 烏鶇 (Zheng et al., 1981:161)
別 名：*黑鷚*。
捕 食：金龜幼蟲、鱗翅目幼蟲。
分 佈：臺灣(過境鳥)；海南(夏候鳥)；長江口向西北至新疆天山一帶以南廣大地區(留鳥)。

Turdus mupinensis 寶興歌鶇 (Yan et al., 1996:316)
捕 食 性。
分 佈：雲南北、浙江以西、青海以東、河北以南(留鳥)。

Turdus naumanni naumanni Temminck 紅尾鶇 (Chen et Yu, 1984, iii:369; Su et al., 1986:42; Yan et al., 1996:314; Zheng et al., 1981:161)
別 名：*斑鶇*，*斑點鶇*。
捕 食：叩甲、金龜、地老虎。
分 佈：臺灣、雲南經四川、湖北、河南、山西、河北、山東、東南沿海各省的廣大地區(冬候鳥)。
附 註：中國有二亞種。

Turdus naumanni eunomus Temminck 斑點鶇 (Chen et Yu, 1984, III:369)
=*Turdus fuscatus* Fallas
捕 食 性。
分 佈：臺灣(1,200m 以下開闊森林中，稀有冬候鳥)、西北、東北各省；西伯利亞東部。

Turdus obscurus Gmelin 白眉鶇 (Chen et Yu, 1984, III:369; Yan et al., 1996:312)

別 名：*白眉鴂，眉茶鶥*

捕 食：小型動物、昆蟲、果實、種子。

分 佈：臺灣(普遍冬候鳥及過境鳥)、福建、江西南部、湖南南部、廣東、廣西、貴州南部、雲南東南部(冬候鳥)，華中、華北、內蒙古、東北。

Turdus pallidus 白腹鶇 (Su et al., 1986:42; Yan et al., 1996:312; Zheng et al., 1981:161)

捕 食：昆蟲。

分 佈：臺灣、海南、華南、西南(冬候鳥)；內蒙古東北部、遼寧、吉林、黑龍江(夏候鳥)。

附 註：中國有二亞種。

Turdus philomelos 歐歌鶇 (Yan et al., 1996:316)

捕 食：昆蟲。

分 佈：新疆西北(夏候鳥)。

Turdus pilaris 田鶇 (Yan et al., 1996:316)

捕 食 性。

分 佈：青海中北部、甘肅西部、新疆北部(冬候鳥)

Turdus poliocephalus niveiceps (Hellmayr) 白頭鶇 (Chen et Yu, 1984, III:369; Tsou et al., 1990:129)

=*Turdus albiceps* Swinhoe

別 名：*島鶇*。

捕 食：昆蟲、果實、種子。

分 佈：臺灣(特產亞種，海拔 1,000-3,000m 的闊葉林內)。

Turdus ruficollis 赤頸鶇 (Yan et al., 1996:314)

捕 食 性。

分 佈：雲南、西藏東南部經西川、至寧夏、山東、河北、遼寧南部(冬候鳥)；新疆西南及西北(夏候鳥)。

附 註：中國有二亞種。

Turdus viscivorus 槲鶇 (Yan et al., 1996:316)

捕 食 性。

分 佈：新疆中西部(天山)(留鳥)。

Zoothera dauma 虎斑地鶇 (Su et al., 1986:42; Yan et al., 1996:306)

別 名：*虎鶇*。

捕 食：地老虎、蟻等。

分 佈：臺灣、雲南至浙江沿海各省(冬候鳥)；雲南西北部、貴州、四川、西藏南部、

甘肅、山東、河北、內蒙古東北部、遼寧、吉林、黑龍江(夏候鳥)。
附 註：中國有四亞種。

Zoothera dauma aurea (Holandre) 虎斑地鶇 (Chen et Yu, 1984, III:370)
=*Turdus varius* Pallas
=*Zoothera dauma varia* (Pallas)
別 名：*鬼鶇，畫眉，虎鶇，頓雞*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(本島及澎湖，普遍冬候鳥)、西北、東北各省。

Zoothera dauma horsfieldi (Bonaparte) 小虎斑地鶇 (Chen et Yu, 1984, III:370)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(本島及澎湖，留鳥)。

Zoothera dauma toratugumi (Momiyama) 日本地鶇 (Chen et Yu, 1984, III:370)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(冬候鳥)；日本(四國)。

Zoothera dixoni 長尾地鶇 (Yan et al., 1996:306)
捕 食 性。
分 佈：雲南西北部、四川、西藏東南部(夏候鳥)。

Zoothera marginata 長嘴地鶇 (Yan et al., 1996:306)
捕 食 性。
分 佈：雲南南部(留鳥)。

Zoothera mollissima 光背地鶇 (Yan et al., 1996:306)
捕 食 性。
分 佈：雲南西北部、四川、西藏東南部(夏候鳥)。
附 註：中國有二亞種。

Zoothera sibirica 白眉地鶇 (Su et al., 1986:42; Yan et al., 1996:306)
捕 食：昆蟲、草籽。
分 佈：內蒙古東北部、遼寧、吉林、黑龍江(夏候鳥)。

Zoothera sibirica davisoni (Hume) 白眉地鶇 (Chen et Yu, 1984, III:370)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(偶見冬候鳥)；日本北部(繁殖)。

Zoothera sibirica sibirica 白眉地鶇 (Zheng et al., 1981:161)
捕 食 性。
分 佈：福建。

Timaliidae 畫眉科

Actinodura egertoni 鏽額斑翅鶥 (Yan et al., 1996:348)

捕 食：昆蟲、無花果、種籽。

分 佈：雲南西端、西藏南端(稀有留鳥)。

Actinodura morrisoniana Ogilvie-Grant 紋翼畫*鶥* (Chen, 1969(2):317; Chen et Yu, 1984, III:379; Tsou et al., 1990:101; Yan et al., 1996:350; Zheng, 1986:261)

別 名：*栗頭斑翅鶥*，*縞鳥*，*臺灣斑翅鶥*。

捕 食：昆蟲(樹皮縫中)、果實。

分 佈：臺灣(特有種，阿里山、玉山 1,200-2,800m 間原始闊葉林中，尚稱普遍)。

Actinodura nipalensis 紋頭斑翅鶥 (Yan et al., 1996:348)

捕 食：昆蟲(苔鮮下)、腹足類、漿果。

分 佈：西藏南部(稀有留鳥)。

Actinodura ramsayi 白眶斑翅鶥 (Yan et al., 1996:348)

捕 食 性。

分 佈：廣西西南部、雲南東南部(稀有留鳥)。

Actinodura souliei 灰頭斑翅鶥 (Yan et al., 1996:348)

捕 食 性。

分 佈：雲南、四川(特有種)。

Actinodura waldeni 紋胸斑翅鶥 (Yan et al., 1996:348)

捕 食：花蜜、漿果、昆蟲、軟體動物。

分 佈：雲南西北部、西藏南部(留鳥)。

Alcippe brunnea brunnea Gould 頭烏線 (Chen, 1969(2):317; Chen et Yu, 1984, III:377; Su et al., 1986:44; Zheng, 1986:261)

別 名：*褐雀眉*，*褐頂雀鶥*。

捕 食：同翅目、魚蛉、瓢蟲、鞘翅目昆蟲、蜾蠃科和其它蜂類、蚊科。

分 佈：臺灣(特產亞種，中央山脈 600-2500m. 森林中)、海南、江蘇南部經安徽、湖北、陝西、甘肅、四川、雲南東部以及東南沿海各省的廣大地區(普通留鳥)。

附 註：中國有五亞種。

Alcippe brunnea superciliaris (David) 褐雀鶥 (Zheng et al., 1981:162, 166)

Alcippe brunnea superciliaris (David), 1874:

捕 食 性。

分 佈：福建(武夷山區挂墩)。

Alcippe castaneceps 栗頭雀鶥 (Yan et al., 1996:352)

捕 食 性。

分 佈：雲南、四川東南、西藏南部(稀有留鳥)。

Alcippe chrysotis 金胸雀鶥 (Yan et al., 1996:352)

捕 食 性。

分 佈：廣西西北部、雲南、貴州、四川、甘肅南部、陝西南部(不普通留鳥)。

附 註：中國有三亞種。

Alcippe cinerea 黃喉雀鶥 (Yan et al., 1996:352)

捕 食：昆蟲、種籽

分 佈：雲南西部、西藏南部(稀有留鳥)。

Alcippe cinereiceps 褐頭雀鶥 (Yan et al., 1996:354)

捕 食 性。

分 佈：臺灣、福建向西北至甘肅中部、四川、西藏東南部、雲南以及東沿海各省除廣東外(普通留鳥)。

附 註：中國有七亞種。

Alcippe cinereiceps formosana (Ogilvie-Grant) 灰頭花翼畫鶥 (Chen, 1969(2):317; Chen et Yu, 1984, III:377; Zheng, 1986:261)

別 名：*臺灣褐頭雀鶥*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(阿里山、玉山，2,000-3,500m 間森林中，特產亞種)。

Alcippe cinereiceps guttaticollis (La Touche) 褐頭雀鶥 (Zheng et al., 1981:162, 166)

Alcippe cinereiceps guttaticollis (La Touche), 1922:

捕 食 性。

分 佈：福建(武夷山區挂墩)。

Alcippe dubia 褐脅雀鶥 (Su et al., 1986:44; Yan et al., 1996:354)

捕 食：昆蟲、草籽。

分 佈：雲南、廣西、廣東、湖南西南部、貴州、四川南部(留鳥)。

Alcippe morrisonia morrrisonia Swinhoe 繡眼畫眉 (Chen et Yu, 1984, III:378; Su et al., 1986:42; Yan et al., 1996:354)

別 名：*灰眶雀鶥，白眶雀鶥*。

捕 食：螳螂目、黃翅大白蟻、黑翅土白蟻、鼻白蟻科、半翅目、沫蟬科、蚜科、叩甲科、長蠹科、葉甲科、尺蛾科、其它鱗翅目幼蟲、蠓科、雙翅目幼蟲、益蜂科、蟻科等昆蟲。

分 佈：臺灣(2,500m 以下森林中，特有亞種，普遍，偶見於 3,000m 高山)、廣東、海南、江蘇南部經安徽、河南南端、陝西、甘肅、四川至雲南以及東南沿海

各省的廣大地區(普通留鳥)。
附 註：中國有七亞種。

Alcippe morrisonia hueti David 灰眶雀鶥 (Zheng et al., 1981:162, 166)
Alcippe morrisonia hueti David, 1874:
捕 食 性。
分 佈：福建(武夷山區挂墩)。

Alcippe nipalensis 白眶雀鶥 (Yan et al., 1996:354)
捕 食 性。
分 佈：西藏南部(稀有留鳥)。

Alcippe nipalensis morrisonia Swinhoe 繡眼畫眉 (Chen, 1969(2):317; Zheng, 1986:261)
別 名：*灰眶雀眉*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(特產亞種，600-2000m. 森林，偶見於 3000m. 高山)。

Alcippe poioicephala 褐臉雀鶥 (Yan et al., 1996:354)
捕 食 性。
分 佈：雲南西南部(不普通留鳥)。

Alcippe ruficapilla 棕頭雀鶥 (Yan et al., 1996:352)
捕 食 性。
分 佈：雲南、廣西西端、貴州西半部、四川、陝西西南、甘肅東南部(特有種)。
附 註：中國有三亞種。

Alcippe rufogularis 棕喉雀鶥 (Yan et al., 1996:354)
捕 食 性。
分 佈：雲南西南部(稀有留鳥)。

Alcippe striaticollis 高山雀鶥 (Yan et al., 1996:352)
捕 食 性。
分 佈：雲南西北部、四川、陝西西南部、甘肅南部、青海東南部、西藏東部(特有種)。

Alcippe vanipectus 白眉雀鶥 (Yan et al., 1996:352)
捕 食 性。
分 佈：雲南西北、四川西南、西藏南部(不普通留鳥)。

Alcippe variegaticeps 金額雀鶥 (Yan et al., 1996:352)
捕 食 性。
分 佈：廣西、貴州、四川(特有種)。

Babax lanceolatus　矛紋草鶥 (Yan et al., 1996:328)

捕　食：昆蟲、種子。

分　佈：浙江南部向西北經安徽、湖北、陝西南部、甘肅南部、轉向西南經四川至雲南以東至東南沿海各省廣大地區(留鳥)。

Babax koslowi　棕草鶥 (Yan et al., 1996:328)

捕　食：昆蟲、草籽。

分　佈：西藏、四川、青海(留鳥)。

Babax waddelli　大草鶥 (Yan et al., 1996:328)

捕　食：昆蟲。

分　佈：西藏南部(留鳥)。

Chrysomma sinense　金眼雀鶥 (Yan et al., 1996:328)

捕　食：昆蟲、草籽。

分　佈：廣東、廣西、雲南、貴州(留鳥)。

Cutia nipalensis　斑脅姬鶥 (Yan et al., 1996:344)

捕 食 性。

分　佈：雲南西部、四川西南、西藏東南部(留鳥)。

Gampsorhynchus rufulus　白頭鵙鶥 (Yan et al., 1996:344)

捕　食：昆蟲、漿果。

分　佈：雲南西南部(留鳥)。

Garrulax affinis　黑頂噪鶥 (Yan et al., 1996:342)

捕　食：昆蟲、野果。

分　佈：雲南、西藏南部、四川、甘肅東南端(留鳥)。

Garrulax albogularis　白喉噪鶥 (Yan et al., 1996:330)

別　名：*白喉笑鶇*。

捕 食 性。

分　佈：雲南、貴州、湖南、湖北、陝西、甘肅、四川、西藏東南部(留鳥)。

附　註：中國有三亞種。

Garrulax albogularis ruficeps Gould　白喉笑鶥 (Chen et Yu, 1984, III:379; Tsou et al., 1990:103; Zheng, 1986:261)

別　名：*大白喉眉，白喉噪鶥*。

捕 食 性。

分　佈：臺灣(900-2,100m 間中海拔的原始闊葉林中，特有亞種，普遍)。

Garrulax bieti 白點鶥 (Yan et al., 1996:334)

捕 食 性。

分 佈：雲南西北、四川西南(留鳥)。

Garrulax caerulatus 灰脅噪鶥 (Yan et al., 1996:336)

捕 食：昆蟲、果實。

分 佈：雲南西北、西藏東南(留鳥)。

Garrulax canorus canorus (Linnaeus) 畫眉 (Chang, 1986:161; Su et al., 1986:43; Tang, 1991:53; Yan et al., 1996:332; Zheng et al., 1981:162; Zhang et Zhou, 1996, 18(4):184)

捕 食：蝗蟲
黑翅土白蟻
茶尺蠖
松毛蟲
甲蟲
小蟲
Diprion liuwanensis 六萬松葉蜂(幼蟲)
Neodiprion dailingensis 帶嶺新松葉蜂(幼蟲)
Neodiprion guangxiicus 廣西新松葉蜂(幼蟲)
Neodiprion xianyuenicus 祥雲新松葉蜂(幼蟲)
小螺。

分 佈：臺灣、海南、江蘇南部經安徽、河南、陝西、甘肅、四川、雲南以及東沿海各省的廣大地區(留鳥)。

附 註：中國有三亞種。

Garrulax canorus taewanus Swinhoe 臺灣畫眉 (Chen, 1969(2):318; Chen et Yu, 1984, III:379; Tsou et al., 1990:105; Zheng, 1986:261)

別 名：*花眉*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(1,500m 以下濃密灌木林中，特有亞種；亞熱帶森林中，如在溫帶可高至 1200m.)。

Grarulax chinensis 黑喉噪鶥 (Yan et al., 1996:332)

捕 食 性。

分 佈：海南、廣東、廣西、雲南(留鳥)。

附 註：中國有三亞種。

Garrulax cineraceus 灰翅噪鶥 (Yan et al., 1996:334)

捕 食 性。

分 佈：江蘇向西經安徽、河南、山西、陝西、甘肅、四川、雲南及東南沿海各省的廣大地區(留鳥)。

Garrulax cineraceus cinereiceps 灰翅噪鶥 (Zheng et al., 1981:162)

捕 食 性。

分 佈：福建(武夷山區)。

Garrulax davidi 山噪鶥 (Yan et al., 1996:336)

捕 食 性。

分 佈：四川西北、青海東部、甘肅、寧夏、陝西、河南、山西、山東、河北、內蒙古南部及東部(留鳥)。

Garrulax elliotii 橙翅噪鶥 (Yan et al., 1996:340)

捕 食：昆蟲、種籽。

分 佈：雲南北部、貴州、四川、西藏東南部、青海東南、甘肅中南部、寧夏、陝西、河南西端、湖北西部、湖南西部(留鳥)。

Garrulax erythrocephalus 紅頭噪鶥 (Yan et al., 1996:340)

捕 食 性。

分 佈：雲南西半部、西藏東南部(留鳥)。

附 註：中國有五亞種。

Garrulax formosus 麗色噪鶥 (Yan et al., 1996:340)

捕 食 性。

分 佈：廣西西部、貴州、四川(留鳥)。

Garrulax galbanus 黃腹噪鶥 (Yan et al., 1996:332)

捕 食 性。

分 佈：雲南、江西(留鳥)。

附 註：中國有二亞種。

Garrulax henrici 灰腹噪鶥 (Yan et al., 1996:340)

捕 食 性。

分 佈：西藏東南部(留鳥)。

附 註：中國有二亞種。

Garrulax leucolophus 白冠噪鶥 (Yan et al., 1996:330)

捕 食 性。

分 佈：雲南、西藏東南(留鳥)。

Garrulax lineatus 細紋噪鶥 (Yan et al., 1996:340)

捕 食 性。

分 佈：西藏西南部(留鳥)。

Garrulax lunulatus 斑背噪鶥 (Yan et al., 1996:334)

捕 食：昆蟲、草籽、果實。
分 佈：四川、湖北、陝西、甘肅(留鳥)。

Garrilax maesi 褐胸噪鶥 (Yan et al., 1996:332)
捕 食 性。
分 佈：海南、廣西、雲南、四川、西藏東南(留鳥)。

Garrulax maximus 大噪鶥 (Yan et al., 1996:334)
捕 食 性。
分 佈：雲南西北端、四川、西藏東部、青海東南、陝西西南、青海東南(留鳥)。

Garrulax merulinus 斑胸噪鶥 (Yan et al., 1996:334)
捕 食 性。
分 佈：雲南南部(留鳥)。

Garrulax milnei milnei (David) 赤尾噪鶥 (Yan et al., 1996:342; Zheng et al., 1981:165)
Garrulax milnei milnei (David), 1874:
捕 食：昆蟲、果實。
分 佈：福建(武夷山區挂墩)、江西、湖南、廣西、雲南、貴州(留鳥)。
附 註：中國有三亞種。

Garrulax monileger 小黑領噪鶥 (Yan et al., 1996:330)
捕 食 性。
分 佈：海南、雲南、廣西、廣東、福建、江西、湖南(鳥)。

Garrulax monileger melli 小黑領噪鶥 (Zheng et al., 1981:162)
捕 食 性。
分 佈：福建(武夷山區)。

Garrulax morrisonianus (Ogilvie-Grant) 金翼畫鶥 (Chen, 1969(2):318; Chen et Yu, 1984, III:379; Tsou et al., 1990:107; Zheng, 1986:261)
別 名：*玉山噪鶥，金翼白眉*。
捕 食：昆蟲是其主食、漿果、花蜜。
分 佈：臺灣(特有種，玉山、阿里山等海拔 2,300-3,950m. 草生地、箭竹林與疏林間)。

Garrulax ocellatus 眼紋噪鶥 (Yan et al., 1996:336)
捕 食 性。
分 佈：雲南西北部、四川、西藏南部、湖北、陝西、甘肅南部(留鳥)。
附 註：中國有三亞種。

Garrulax pectoralis 黑領噪鶥 (Su et al., 1986:43; Yan et al., 1996:330)

捕 食：蝗蟲、石蠅、紅腳綠金龜、鞘翅目、鱗翅目幼蟲、蟻。
分 佈：海南、雲南經四川、甘肅南部、寧夏、陝西、河南、安徽、江蘇南部、東南沿海各省的廣大地區(留鳥)。
附 註：中國有五亞種。

Garrulax pectoralis picticollis　黑領噪鶥 (Zheng et al., 1981:162)
捕 食 性。
分 佈：福建(武夷山區)。

Garrulax perspicillatus (Gmelin)　黑臉噪鶥 (Chang, 1986:161; Su et al., 1986:43; Yan et al., 1996:336; Zheng et al., 1981:162)
捕 食：蝗蟲、瓢蟲、天牛、甲蟲、大黑蟻、昆蟲、果實。
分 佈：臺灣、福建、浙江、江蘇南部、安徽、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川(留鳥)。

Garrulax poecilorhynchus poecilorhynchus Gould　棕噪鶥 (Chen et Yu, 1984, III:379; Tan et al., 1996:336; Yan et al., 1996:336; Zheng, 1986:261)
別 名：*竹鳥，竹雞，笑鶇，棕噪鶥，眼鏡鶇*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(1,200-2,500m 間森林中，特產亞種，普遍)。

Garrulax poecilorhynchus berthemyi (David et Oustalet)　棕噪鶥 (Zheng et al., 1981:162, 165)
Garrulax poecilorhynchus berthemyi (David et Oustalet), 1877:
捕 食 性。
分 佈：福建(武夷山區挂墩)。

Garrulax ruficollis　栗頸噪鶥 (Yan et al., 1996:338)
捕 食 性。
分 佈：雲南西部、四川西端、西藏東南(留鳥)。

Garrulax sannio sannio　白頰噪鶥 (Su et al., 1986:43; Yan et al., 1996:338; Zheng et al., 1981:162)
捕 食：金龜、象甲、蜂類等昆蟲、馬陸、植物。
分 佈：海南、福建經江西、湖北、河南南端、陝西南部、甘肅東部、四川、西藏東端、雲南以及東南沿海各省的廣大地區(留鳥)。

Garrulax squamatus　藍翅噪鶥 (Yan et al., 1996:340)
捕 食 性。
分 佈：雲南南部(留鳥)。

Garrulax strepitans　白頸噪鶥 (Yan et al., 1996:332)
捕 食 性。
分 佈：雲南西南(留鳥)。

Garrulax striatus 條紋噪鶥 (Yan et al., 1996:332)

捕 食 性。

分 佈：雲南西北部、四川西南、西藏南部(留鳥)。

附 註：中國有二亞種。

Garrulax subunicolor 純色噪鶥 (Yan et al., 1996:340)

捕 食：甲蟲、種籽。

分 佈：雲南、西藏南部(留鳥)。

Garrulax sukatschewi 黑額山噪鶥 (Yan et al., 1996:334)

捕 食 性。

分 佈：甘肅(留鳥)。

Garrulax variegatus 雜色噪鶥 (Yan et al., 1996:334)

捕 食 性。

分 佈：西藏南邊(留鳥)。

Heterophasia auricularis (Swinhoe) 白耳畫眉 (Chen, 1969(2):317; Chen et Yu, 1984, III:378; Tsou et al., 1990:111; Yan et al., 1996:358; Zheng, 1986:261)

別 名：*白耳奇鶥*。

捕 食：花蜜、漿果及昆蟲。

分 佈：臺灣(特有種，阿里山、玉山、鳳凰山 1,200-2,400m 間闊葉林中)。

Heterophasia capistrata 黑頂奇鶥 (Yan et al., 1996:358)

捕 食：昆蟲、種籽。

分 佈：西藏南部(稀有留鳥)。

Heterophasia gracilis 灰奇鶥 (Yan et al., 1996:358)

捕 食：昆蟲、種籽。

分 佈：雲南西北(稀有留鳥)。

Heterophasia melanoleuca 黑頭奇鶥 (Yan et al., 1996:358)

捕 食 性。

分 佈：雲南、廣西西部、貴州、四川(不普通留鳥)。

Heterophasia picaoides 長尾奇鶥 (Yan et al., 1996:358)

捕 食：昆蟲、植物果實。

分 佈：雲南東南部(稀有留鳥)。

Heterophasia pulchella 麗色奇鶥 (Yan et al., 1996:358)

捕 食：昆蟲、果實、種子。

分 佈：雲南西北部、四川西部、西藏東南部(稀有留鳥)。

Leiothrix argentauris 銀耳相思鳥 (Yan et al., 1996:360)

捕 食 性。

分 佈：雲南、廣西西部、貴州、四川西南部、西藏東南端(留鳥)。

附 註：中國有四亞種。

Leiothrix lutea lutea 紅嘴相思鳥 (Su et al., 1986:44; Yan et al., 1996:360; Zheng et al., 1981:162)

捕 食：蝗蟲、小蜂科、蟻、其它昆蟲。

分 佈：江蘇南部經安徽、河南、陝西、甘肅、四川、西藏南部、雲南以及東南沿海各省的廣大地區(普通留鳥)。

附 註：我國有 4 亞種。

Liocichla omeiensis 灰胸藪鶥 (Yan et al., 1996:344)

捕 食 性。

分 佈：四川中部(留鳥)。

Liocichla phoenicea 紅翅藪鶥 (Yan et al., 1996:344)

捕 食：昆蟲、種籽、果實。

分 佈：雲南、四川西南、西藏東南端(留鳥)。

Liocichla steerii Swinhoe 藪鳥 (Chen, 1969(2):317; Chen et Yu, 1984, III:378; Tsou et al., 1990:113; Yan et al., 1996:344; Zheng, 1986:261)

別 名：*黃胸藪鶥，黃痣藪鳥*。

捕 食：雜食性，動物性、植物性皆取食，昆蟲、種籽。

分 佈：臺灣(特有種，阿里山、玉山、鳳凰山 1,200-2,500m 間森林中)。

Macronous gularis 紋胸鶥 (Yan et al., 1996:318)

捕 食：昆蟲。

分 佈：雲南(留鳥)。

Minla annectens 栗背奇鶥 (Yan et al., 1996:350)

捕 食：昆蟲、苔蘚植物。

分 佈：雲南南部(稀有留鳥)。

Minla cyanouroptera 藍翅希鶥 (Yan et al., 1996:350)

捕 食 性。

分 佈：海南、廣西、雲南、四川、貴州、湖南中南部(不普通留鳥)。

Minla ignotincta 火尾希鶥 (Yan et al., 1996:350)

捕 食 性。

分 佈：廣西西北部、雲南、貴州、湖南西南部、四川、西藏東南部(留鳥)。

Minla strigula 斑喉希鶥 (Yan et al., 1996:350)

捕 食 性。

分 佈：雲南、四川、西藏南部(留鳥)。

附 註：中國有二亞種。

Moupinia poecilotis 寶興雀鶥 (Yan et al., 1996:328)

捕 食：昆蟲、種子、果實。

分 佈：雲南、四川、甘肅南部(留鳥)。

Myzornis pyrrhoura 火尾綠鶥 (Yan et al., 1996:360)

捕 食：昆蟲、花蜜、漿果。

分 佈：雲南西北、西藏東南(稀有留鳥)。

Napothera brevicaudata 短尾鷦鶥 (Yan et al., 1996:322)

捕 食：昆蟲、種子。

分 佈：廣西、雲南南部(留鳥)。

Napothera crispifrons 灰岩鷦鶥 (Yan et al., 1996:322)

捕 食：昆蟲、陸棲螺類、植物種子。

分 佈：雲南南部(留鳥)。

Napothera epilepidota 紋胸鷦鶥 (Yan et al., 1996:322)

捕 食 性。

分 佈：海南、廣東、廣西、雲南南部(留鳥)。

Paradoxornis davidianus davidianus (Slater) 挂墩鴉雀 (Zheng et al., 1981:162)

Paradoxornis davidianus davidianus (Slater), 1897:

捕 食 性。

分 佈：福建(武夷山區挂墩)。

Paradoxornis gularis fokiensis (David) 灰頭鴉雀 (Zheng et al., 1981:166)

Paradoxornis gularis fokiensis David), 1874:

Paradoxornis webbianus fohkienensis La Touche, 1923:

捕 食 性。

分 佈：福建(武夷山區挂墩)。

Paradoxornis nipalensis morrisonianus (Ogilvie-Grant) 黃羽鸚嘴 (Chen et Yu, 1984, III:377)

別 名：*橙背鴉雀*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(2,000-3,000m 間林下灌木及箭竹叢中，特有亞種)。

Paradoxornis nipalensis pallidus (La Touche) 橙背鴉雀 (Zheng et al., 1981:162, 166)

Paradoxornis nipalensis pallidus (La Touche), 1922:

捕 食 性。

分 佈：福建(武夷山區挂墩)。

Paradoxornis webbianus bulmachus (Swinhoe) 粉紅鸚嘴 (Zheng, 1986:261)

別 名：*棕頭鴉雀*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(2,500m 以下灌木叢雜草中，特產亞種)。

Paradoxornis webbianus suffusus 棕頭鴉雀 (Zheng et al., 1981:162)

捕 食 性。

分 佈：福建(武夷山區)。

Pellorneum albiventre 白腹幽鶥 (Yan et al., 1996:318)

捕 食 性。

分 佈：雲南西南(留鳥)。

Pellorneum ruficeps 棕頭幽鶥 (Yan et al., 1996:318)

捕 食：昆蟲。

分 佈：雲南南部(留鳥)。

Pellorneum tickelli 棕胸雅鶥 (Yan et al., 1996:318)

捕 食 性。

分 佈：雲南西南(留鳥)。

Pnoepyga albiventer 大鱗胸鷦鶥 (Yan et al., 1996:322)

捕 食 性。

分 佈：雲南北部、西藏南部、四川中部、甘肅南部(留鳥)。

Pnoepyga pusilla formosana Ingram 鱗胸鷦鶥 (Chen et Yu, 1984, III:377; Yan et al., 1996:322)

別 名：*鷦鶉，小鱗胸鷦鶥*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(1,000-3,000m 間林,下矮叢中，特有亞種，尚稱普遍)、江蘇南部向西經安徽、湖北、陝西、甘肅、四川、西藏東南部以南的廣大地區(留鳥)。

Pnoepyga pusilla formosana 小鱗鷦鶥 (Zheng, 1986:261)

捕 食 性。

分 佈：臺灣(特產亞種)。

Pomatorhinus erythrogenys erythrocnemis 銹臉鉤嘴鶥 (Yan et al., 1996:320; Zheng, 1986:261)

捕 食 性。

分 佈：臺灣(特產亞種)。

Pomatorhinus erythrogenys erythrogenys Gould 彎嘴畫鶥 (Chen, 1969(2):317; Chen et Yu, 1984, III:378; Su et al., 1986:43; Yan e t al., 1996:320)

別 名：*銹臉鉤嘴鶥，大彎嘴*。

捕 食：昆蟲、蟻、野果。

分 佈：臺灣(玉山、鳳凰山 600-2,500m 間灌叢中)、華南、西南、華北、華東廣大地區(留鳥)。

附 註：中國有八亞種。

Pomatorhinus erythrogenys swinhoei 銹臉鉤嘴鶥 (Zheng et al., 1981:162, 165)

Pomatorhinus erythrogenys swinhoei David, 1874:

捕 食 性。

分 佈：福建(武夷山區挂墩)。

Pomatorhinus ferruginosus 紅嘴鉤嘴鶥 (Yan et al., 1996:320)

捕 食：甲蟲、果實。

分 佈：雲南西部、四川西南、西藏東南(留鳥)。

Pomatorhinus hypoleucos 長嘴鉤嘴鶥 (Yan et al., 1996:320)

捕 食：昆蟲、小型軟體動物。

分 佈：海南、廣西、雲南東南、貴州南部(留鳥)。

Pomatorhinus montanus musicus Swinhoe 小彎嘴畫眉 (Chen, 1969(2):317; Zheng, 1986:261)

別 名：*棕頸鈎嘴眉*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(特產亞種，600-1800m. 森林中)。

Pomatorhinus ochraceiceps 棕頸鉤嘴鶥 (Yan et al., 1996:320)

捕 食 性。

分 佈：雲南西南(留鳥)。

Pomatorhinus ruficollis 棕頭鉤嘴鶥 (Su et al., 1986:43; Yan et al., 1996:320)

別 名：*棕頸鉤嘴唓，小彎嘴*。

捕 食：鼻白蟻科、步甲、葉甲、天牛、小蠹科和其它鞘翅目昆蟲碎片、燈蛾科、刺蛾科幼蟲、蟻。

分 佈：臺灣、海南、華南、西南、華中華東(留鳥)。

附 註：中國有十亞種。

Pomatorhinus ruficollis musicus Swinhoe 小彎嘴畫眉 (Chen et Yu, 11984, III:378)

捕 食 性。

分 佈：臺灣(2,500m 以下叢藪中，特有亞種，普遍)。

Pomatorhinus ruficollis stridulus 棕頸鈎嘴鶥 (Zheng et al., 1981:162)
捕 食 性。
分 佈：福建(武夷山區)。

Pteruthius aenobarbus 栗額鵙鶥 (Yan et al., 1996:346)
捕 食 性。
分 佈：海南、廣西、雲南、貴州(留鳥)。

Pteruthius flaviscapis ricketti Ogivie-Grant 紅翅鵙鶥 (Yan et al., 1996:346; Zheng et al., 1981:162, 166)
Pteruthius flaviscapis ricketti Ogivie-Grant, 1904:
捕 食：昆蟲、漿果。
分 佈：海南、福建(武夷山區挂墩)經江西、湖南、貴州、四川、甘肅南端、西藏東南部、雲南、廣西、廣東(留鳥)。

Pteruthius melanotis 栗喉鵙鶥 (Yan et al., 1996:346)
捕 食 性。
分 佈：雲南南部(稀有留鳥)。

Pteruthius rufiventer 棕腹鵙鶥 (Yan et al., 1996:346)
捕 食：蝶類、蟑螂。
分 佈：雲南西南部(留鳥)。

Pteruthius xanthochlorus 淡綠鵙鶥 (Yan et al., 1996:346)
捕 食 性。
分 佈：福建、雲南、四川、陝西西南部、甘肅東南部、西藏東南部(留鳥)。
附 註：中國有三亞種。

Pteruthius xanthochlorus obscurus Stresemann 淡綠鵙鶥 (Zheng et al., 1981:162, 166)
Pteruthius xanthochlorus obscurus Stresemann, 1925:
捕 食 性。
分 佈：福建(武夷山區挂墩)。

Spelaeornis chocolatinus 長尾鷦鶥 (Yan et al., 1996:324)
捕 食：昆蟲。
分 佈：雲南、四川西南、中部(留鳥)。

Spelaeornis formosus 麗星鷦鶥 (Yan et al., 1996:324)
捕 食 性。
分 佈：雲南東南、福建西北、浙江(留鳥)。

Spelaeornis troglodytoides 斑翅鷦鶥 (Yan et al., 1996:324)

捕 食：昆蟲、植物種子。
分 佈：雲南西北、西藏東南、四川、陝西、甘肅(留鳥)。
附 註：中國有四亞種。

Sphenocichla humei 楔嘴鶴鶥 (Yan et al., 1996:324)
捕 食：昆蟲。
分 佈：雲南西南(留鳥)。

Stachyris ambigua 黃喉穗鶥 (Yan et al., 1996:326)
捕 食：昆蟲、植物種子。
分 佈：雲南西北部(留鳥)。

Stachyris chrysaea 金頭穗鶥 (Yan et al., 1996:326)
捕 食：昆蟲。
分 佈：雲南、西藏東南(留鳥)。

Stachyris nigriceps 黑頭穗鶥 (Yan et al., 1996:326)
捕 食：昆蟲。
分 佈：雲南、西藏南部(留鳥)。

Stachyris ruficeps praecognitus Swinhoe 山紅頭 (Chen et Yu, 1984, III:377; Su et al., 1986:43; Yan et al., 1996:326)
別 名：*紅頭穗鶥*。
捕 食：半翅目昆蟲、蜘蛛、果實。
分 佈：臺灣(2,500m 以下灌叢中，特有亞種，尚稱普遍)、海南、浙江笳西北延伸經安徽、湖北、陝西、甘肅、轉向西南四川至西藏東南端以南的廣大地區(留鳥)。
附 註：中國有四亞種。

Stachyris ruficeps davidi 紅頭穗鶥 (Zheng et al., 1981:162)
捕 食 性。
分 佈：福建(武夷山區)。

Stachyris ruficeps praecognitus Swinhoe 山紅頭 (Chen, 1969(2):316; Zheng, 1986:261)
別 名：*紅頭穗鶥*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(特產亞種，玉山、阿里山 1000-2500m. 森林中)。

Stachyris striolata 斑頸穗鶥 (Yan et al., 1996:326)
捕 食 性。
分 佈：海南、廣西、雲南南部(留鳥)。

Stachyris zantholeuca 白腹鳳鶥 (Yan et al., 1996:324)

別 名：*綠畫眉*。
捕 食：昆蟲、蜘蛛、植物種子。
分 佈：臺灣、海南、浙江南端向西延伸經江西、湖南、貴州、雲南、四川(留鳥)。

Timalia pileata 紅頂鶥 (Yan et al., 1996:326)

捕 食 性。
分 佈：廣東、廣西、雲南、貴州(留鳥)。

Xiphirhychus superciliaris 劍嘴鶥 (Yan et al., 1996:318)

捕 食：昆蟲、漿果、花蜜。
分 佈：雲南(留鳥)。

Yuhina bakeri 白項鳳鶥 (Yan et al., 1996:358; Yan et al., 1996:358)

捕 食：昆蟲、果實。
分 佈：雲南西南部、西藏南部(稀有留鳥)。

Yuhina brunneiceps Ogilvie-Grant 冠羽畫鶥 (Chen, 1969(2):317; Chen et Yu, 1984, III:378; Tsou et al,. 1990:115; Yan et al., 1996:358; Zheng, 1986:261)

別 名：*褐頭鳳鶥*。
捕 食：昆蟲、果實、吸食花蜜。
分 佈：臺灣(阿里山、玉山，1,000-3,000m. 間闊葉林中，特有種)。

Yuhina castaniceps 栗頭鳳鶥 (Su et al., 1986:42; Yan et al., 1996:358)

捕 食：果實、種子、蝗蟲、半翅目和鱗翅目昆蟲。
分 佈：浙江經安徽、湖北、四川、至雲南以及東南沿海各省的廣大地區(留鳥)。
附 註：中國有二亞種。

Yuhina castaniceps torqueola 栗頭鳳鶥 (Zheng et al., 1981:162)

捕 食 性。
分 佈：福建(武夷山區)。

Yuhina diademata 白領鳳鶥 (Yan et al., 1996:358)

捕 食：昆蟲、果實、種子、花蕊。
分 佈：雲南、貴州西部、湖北西部、陝西西南部、寧夏、甘肅南部、四川(特有種)。

Yuhina flavicollis 黃頸鳳鶥 (Yan et al., 1996:358)

捕 食：昆蟲、果實。
分 佈：雲南、四川西南邊、西藏南部(不普通留鳥)。

Yuhina gularis 紋喉鳳鶥 (Yan et al., 1996:360)

捕 食：果實、種子、花蜜、昆蟲。

分 佈：雲南、廣西西端、貴州西部、四川、西藏南邊(留鳥)。

Yuhina nigrimenta 黑頦鳳鶥 (Yan et al., 1996:360)
捕 食：種子、花蜜、昆蟲。
分 佈：福建、江西、湖南、湖北西南端、四川、雲南、廣西、廣東(留鳥)。

Yuhina nigrimenta pallida La Touche 黑頦鳳鶥 (Zheng et al., 1981:162, 166)
Yuhina nigrimenta pallida La Touche, 1897:
捕 食 性。
分 佈：福建(武夷山區挂墩)。

Yuhina occipitalis 棕肛鳳鶥 (Yan et al., 1996:358)
捕 食：昆蟲、果實。
分 佈：雲南、四川西南邊、西藏南部(不普通留鳥)。

Yuhina zantholeuca 白腹鳳鶥 (Su et al., 1986:42)
捕 食：直翅目、瓢蟲、其它鞘翅目昆蟲、鱗翅目幼蟲、錐蜂科、小蜂科及其它蜂類。
分 佈：廣東。

Yuhina zantholeuca griseiloris (Stresemann) 綠畫鶥 (Chen, 1969(2):317; Chen et Yu, 1984, III:378; Zheng, 1986:261; Zheng et al., 1981:162)
別 名：*白腹鳳鶥*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(嘉義鳳凰山，見於 1,000m. 以下森林中，尙稱普遍留鳥)、福建(武夷山區)、廣東、廣西、雲南。

Panuridae 鴉雀科

Conostoma oemodium 紅嘴鴉雀 (Yan et al., 1996:362)
捕 食：植物果實、竹筍、昆蟲。
分 佈：雲南西北部經貴州西北、湖南、湖北、陝西、甘肅、至西藏東南部(留鳥)。

Panurus biarmicus 文鬚雀 (Yan et al., 1996:362)
捕 食 性。
分 佈：河北、遼寧(冬候鳥)；新疆經青海、甘肅、內蒙古、吉林、黑龍江(夏候鳥)。

Paradoxornis brunneus 褐翅鴉雀 (Yan et al., 1996:364)
捕 食：昆蟲、種子。
分 佈：雲南西北部(留鳥)。
附 註：中國有三亞種。

Paradoxornis conspicillatus 白眶鴉雀 (Yan et al., 1996:364)

捕 食：昆蟲、植物種子。
分 佈：湖南西北經湖北、河南、陝西、甘肅、青海、至四川東北部(特有種留鳥)。

Paradoxornis flavirostris 斑胸鴉雀 (Yan et al., 1996:362)
捕 食：昆蟲、雜草種籽。
分 佈：西藏東南(稀有留鳥)。

Paradoxornis fulvifrons 黃額鴉雀 (Yan et al., 1996:364)
捕 食：植物性。
分 佈：雲南西北部經四川、陝西西南部、甘肅南端、西藏東南(不普通留鳥)。

Paradoxornis gularis 灰頭鴉雀 (Yan et al., 1996:366)
捕 食：植物果實、種子、昆蟲。
分 佈：海南、雲南、四川東南半部、湖南、江西、安徽東南部、江蘇南部、浙江、福建、廣東、廣西、貴州(留鳥)。

Paradoxornis guttaticollis 點胸鴉雀 (Yan et al., 1996:362)
捕 食：昆蟲、雜草種籽。
分 佈：浙江南部經江西、湖南南部、貴州、四川、陝西、甘肅、雲南、廣西、廣東(普通留鳥)。

Paradoxornis heudei 震旦鴉雀 (Yan et al., 1996:366)
捕 食 性。
分 佈：江西北部、浙江西部、湖北東部、安徽南部、江蘇南部、又吉林北部、黑龍江西南部(特有種留鳥)。

Paradoxornis ruficeps 紅頭鴉雀 (Yan et al., 1996:366)
捕 食 性。
分 佈：雲南西北部、四川西南部、西藏東南部(稀有留鳥)。

Paradoxornis paradoxus 三趾鴉雀 (Yan et al., 1996:362)
捕 食：昆蟲、果實。
分 佈：四川、甘肅、陝西(特有種)。

Paradoxornis przewalskii 灰冠鴉雀 (Yan et al., 1996:364)
捕 食 性。
分 佈：甘肅南部(特有種)。

Paradoxornis unicolor 褐鴉雀 (Yan et al., 1996:362)
捕 食 性。
分 佈：雲南西北部、四川西南部、西藏東南部(不普通留鳥)。

Paradoxornis webbianus 棕頭鴉雀 (Yan et al., 1996:364)

別 名：*粉紅鸚嘴*。

捕 食：昆蟲、植物種子。

分 佈：臺灣、雲南東南部經四川、甘肅、陝西、山西、河北、內蒙古東南部、遼寧、吉林、黑龍,江南部以及東南沿海各省的廣大地區(留鳥)。

附 註：中國有九亞種。

Paradoxornis zappeyi 暗色鴉雀 (Yan et al., 1996:364)

捕 食 性。

分 佈：雲南、貴州、四川、甘肅(特有種)。

Sylviidae 鶯科

Abroscopus albogularis 棕臉鶲鶯 (Yan et al., 1996:398)

捕 食 性。

分 佈：臺灣、海南、浙江經安徽、湖北南邊陝西南部、甘肅南部、四川、貴州、雲南、廣西、廣東、湖南、江西、福建(留鳥)。

Abroscopus schisticeps 黑臉鶲鶯 (Yan et al., 1996:396)

捕 食 性。

分 佈：雲南西北部、四川西南部、西藏南部(留鳥)。

附 註：中國有二亞種。

Abroscopus superciliaris 黃腹鶲鶯 (Yan et al., 1996:396)

捕 食 性。

分 佈：雲南、西藏東南部(留鳥)。

Acrocephalus aedon 厚嘴葦鶯 (Yan et al., 1996:380)

捕 食：甲蟲、金龜、象甲、蝗蟲、蟋蟀、蟻等昆蟲及幼蟲、蜘蛛、蚯蚓、小型無脊椎動物。

分 佈：河北、內蒙古中東部(夏候鳥)。

Acrocephalus agricola 稻田葦鶯 (Yan et al., 1996:378)

捕 食 性。

分 佈：新疆、東北(夏候鳥)。

附 註：中國有二亞種。

Acrocephalus arundinaceus 大葦鶯 (Shen et al., 1995, 21(3):15-17; Yan et al., 1996:378)

捕 食：*Nipponaeclerda biwakoensis* 宮蒼仁蚧(蘆葦)

鱗翅目、甲蟲、葉甲等及其幼蟲。

分 佈：江蘇、新疆西部(夏候鳥)。

Acrocephalus arundinaceus orientalis 大葦鶯 (Chen et Yu, 1984, III:389; Zheng et al., 1981:163)

別 名：*東葦雀，大葦切，行行子，剖葦，葦鶯，葦串兒，葦充兒，蘆罟*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(普遍冬候鳥及過境鳥)、福建(武夷山區)、東南部、西北、東北。

Acrocephalus bistrigiceps Swinhoe 雙眉葦鶯 (Chen et Yu, 1984, III:389; Feng et al., 1991:18; Feng et al., 1994, 10(3):142; Yan et al., 1996:378; Zheng et al., 1981:163)

別 名：*黑眉葦鶯，小葦切，小剖葦，吼喇子*。

捕 食：*Oxya chinensis* 中華稻蝗。

分 佈：臺灣(稀見過境鳥)、福建(武夷山區)(冬候鳥)；福建東北部經江西、湖北、陝西、江蘇、山東、山西、河北、東北諸省(夏候鳥)；西伯利亞東部，冬季南徙。

Acrocephalus concinens 鈍翅稻田葦鶯 (Yan et al., 1996:378)

捕 食 性。

分 佈：雲南東北經貴州、江西、浙江、江蘇、山東、河北、內蒙古中部、甘肅南部、四川的廣大地區(夏候鳥)；東南沿海(過境鳥)。

Acrocephalus dumetorum 布氏葦鶯 (Yan et al., 1996:380)

捕 食 性。

分 佈：香港、新疆西北(迷鳥)。

Acrocephalus orientalis 東方大葦鶯 (Yan et al., 1996:380)

捕 食：鱗翅目、鞘翅目、蚊類等昆蟲及幼蟲、水生昆蟲、蜘蛛、蛞蝓。

分 佈：臺灣(冬候鳥)；海南(過境鳥)；華南、華西、華中、華北、內蒙古、東北(夏候鳥)。

Acrocephalus schoenobaenus 水蒲葦鶯 (Yan et al., 1996:378)

捕 食 性。

分 佈：新疆西部(夏候鳥)。

Acrocephalus scirpaceus 蘆葦鶯 (Yan et al., 1996:378)

捕 食：昆蟲、軟體動物、漿果。

分 佈：江蘇(鎮江)(迷鳥)。

Acrocephalus sorghophilus 細紋葦鶯 (Yan et al., 1996:378)

捕 食：昆蟲及其幼蟲。

分 佈：河北、遼寧(夏候鳥)。

Acrocephalus stentoreus 噪大葦鶯 (Yan et al., 1996:380)

捕 食：昆蟲及其幼蟲。

分 佈：雲南、貴州、四川(夏候鳥)。

Brachypteryx montana goodfellowi 藍短翅鶇 (Zheng, 1986:261)

捕 食 性。

分 佈：臺灣(特產亞種)。

Brachypteryx seebohmi melanorhyncha Rickett 高山短翅鶯 (Zheng et al., 1981:166; Zheng, 1986:262)

捕 食 性。

分 佈：臺灣、福建(武夷山區挂墩)。

Bradypterus leteoventris (Hodgson) 褐短翅鶯 (Chen et Yu, 1984, III:388; Yan et al., 1996:368)

別 名：*棕褐短翅鶯*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(阿里山)、江蘇南部經安徽、河南、陝西、甘肅南端、四川、西藏東南部、雲南以及東沿海各省的廣大地區(留鳥)。

附 註：中國有二亞種。

Bradypterus major 巨嘴短翅鶯 (Yan et al., 1996:368)

捕 食 性。

分 佈：西藏西北端、新疆西南部(夏候鳥)。

附 註：中國有二亞種。

Bradypterus seebohmi melanorhycha (Rickett) 褐叢樹鶯 (Chen et Yu, 1984, III:388; Yan et al., 1996:368)

別 名：*褐色叢樹鶯，高山短翅鶯*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(1,200-3,000m 間茂密草叢中，普遍留鳥)、福建、江西、廣東(留鳥)。

Bradypterus tacsanowskius 中華短翅鶯 (Yan et al., 1996:368)

捕 食：甲蟲、蛾、蟬

分 佈：廣西、雲南、貴州、四川、青海東北部、甘肅、寧夏、陝西、山西、河北、內蒙古、吉林、黑龍江(夏候鳥，可能部份冬候鳥)。

Bradypterus thoracicus 斑胸短翅鶯 (Yan et al., 1996:368)

捕 食：昆蟲。

分 佈：廣西、雲南、貴州、四川、西藏東南部、青海東部、甘肅、寧夏、陝西西南、湖北西部、湖南西部；內蒙古東部、遼寧、吉林、黑龍江(夏候鳥)。

附 註：中國有三亞種。

Cettia acanthizoides concolor (Ogilvie-Grant) 深山鶯 (Chen et Yu, 1984, III:387; Zheng, 1986:262)

別 名：*黃腹樹鶯*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(遍在 2,200-3,500m 間林下或箭竹叢中，特產亞種)。

Cettia brunnifrons 棕頂樹鶯 (Yan et al., 1996:370)
捕 食 性。
分 佈：雲南西北部、四川、西藏南部、甘肅南部(夏候鳥)。

Cettia cetti 寬尾樹鶯 (Yan et al., 1996:370)
捕 食 性。
分 佈：新疆西北部(留鳥)。

Cettia diphone borealis Campbell 滿洲鶯 (Chen et Yu, 1984, III:387)
=*Cettia canturians borrealis* Campbell
=*Cettia minuta borealis* Campbell
=*Horrornis canturians taivanorum* Hachisuka
別 名：*鶯，告春鶯，朝鮮鶯，臺灣鶯*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(普遍冬候鳥)、東北諸省；朝鮮。

Cettia diphone cantans (Temminck et Schlegel) 日本鶯 (Chen et Yu, 1984, III:387; Su et al., 1986:42; Yan et al., 1996:370)
別 名：*短翅樹鶯，日本樹鶯*。
捕 食：半翅目和鱗翅目昆蟲
分 佈：臺灣(冬候鳥)、海南、廣西、廣東、江西、福建、浙江及雲南、貴州、四川、湖北南部(冬候鳥)；浙江西北、江蘇、安徽、湖北、四川、甘肅南部、寧夏、陝西、山西、河北、遼寧、吉林、黑龍江(夏候鳥)；日本(北部繁殖)。

Cettia diphone canturians (Swinhoe) 中國鶯 (Chang, 1986:162; Chen et Yu, 1984, III:387)
別 名：*短翅樹鶯*。
捕 食：蜡、蜘蛛。
分 佈：臺灣(普遍冬候鳥及過境鳥)、安徽、華南、華西、華北各省。

Cettia diphone sakhalinensis (Yamashima) 庫頁島鶯 (Chen et Yu, 1984, III:387)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(稀見冬候鳥)；千島群島(繁殖)。

Cettia flavolivacea 異色樹鶯 (Yan et al., 1996:370)
捕 食 性。
分 佈：雲南西北部、西藏東南部、四川(留鳥)；四川東北部、湖北西北部、河南、山西南部、陝西南部、甘肅南部(夏候鳥)。
附 註：中國有三亞種。

Cettia fortipes 強腳樹鶯 (Yan et al., 1996:370)
別 名：*小鶯*。
捕 食 性。

分 佈：臺灣、江蘇南部經安徽、湖北、陝西、甘肅南部、青海東南、四川、西藏南部、雲南、貴州以及東南沿海各省的廣大地區(留鳥)。
附 註：中國有三亞種。

Cettia fortipes davidiana 強腳樹鶯 (Zheng et al., 1981:163)
捕 食 性。
分 佈：福建(武夷山區)。

Cettia fortipes robustipes (Swinhoe) 臺灣小鶯 (Chen et Yu, 1984, III:386:Zheng, 1986:262)
=*Horeites robustipes* Swinhoe
別 名：*強腳樹鶯，山樹鶯*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(500-2,500m 間灌中，特產亞種，普遍)。

Cettia fortipes sinensis La Touche (Zheng et al., 1981:166)
Cettia fortipes sinensis La Touche, 1898:
捕 食 性。
分 佈：福建(武夷山區挂墩)。

Cettia major 大樹鶯 (Yan et al., 1996:370)
捕 食：昆蟲、小型無脊椎動物。
分 佈：雲南西北部、四川西、西藏東南部(夏候鳥)。

Cettia pallidipes 淡腳樹鶯 (Yan et al., 1996:370)
捕 食 性。
分 佈：雲南西南部(留鳥)。

Cettia robustipes 黃腹樹鶯 (Yan et al., 1996:372)
別 名：*深山鶯*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、浙江經安徽、河南、陝西、甘肅、四川、西藏東部、雲南、貴州以及東南沿海各省的廣大地區(留鳥)；西藏東南部(夏候鳥)。
附 註：中國有三亞種。

Cettia squameiceps squameiceps Swinhoe 短尾鶯 (Chen et Yu, 1984, III:386)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(水邊灌叢中)、華南、華北、東北各省。

Cisticola exilis volitans (Swinhoe) 白碩錦鴝 (Chen et Yu, 1984, III:388; Yan et al., 1996:382)
別 名：*黃頭扇尾鶯*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(普遍在平地草叢及灌木林中，特有亞種)、浙江經安徽、湖北、湖南、

貴州、雲南、廣西、廣東、福建(留鳥)。

Cisticola exilis volitans 黃頭扇尾鶯 (Zheng, 1986:262)

捕 食 性。

分 佈：臺灣(特產亞種)。

Cisticola juncidis 棕扇尾鶯 (Feng et al., 1994, 10(3):142; Su et al., 1986:42; Yan et al., 1996:382)

捕 食：*Oxya chinensis* 中華稻蝗

葉蟬科、金龜子、鱗翅目幼蟲、蠅類。

分 佈：臺灣、海南、雲南東南、廣西、廣東、福建(留鳥)；雲南、四川、甘肅、陝西、河南、安徽、江蘇南部、浙江的廣大地區(夏候鳥)。

Cisticola juncidis tinnabulans (Swinhoe) 錦鴝 (Chen et Yu, 1984:388; Chen et Yu, 1984, III:388; Feng et al., 1991:18; Zheng, 1986:262)

別 名：*棕扇尾鶯*。

捕 食：*Oxya chinensis* 中華稻蝗。

分 佈：臺灣(普遍留鳥)、華南、東南、西南各省、山西。

Graminicola bengalensis 大草鶯 (Yan et al., 1996:374)

捕 食：昆蟲。

分 佈：海南、廣西、廣東、湖南南部(留鳥)。

Hippolais caligata 靴籬鶯 (Yan et al., 1996:382)

捕 食 性。

分 佈：新疆西部及北部(夏候鳥)。

附 註：中國有二亞種。

Hippolais pallida 草綠籬鶯 (Yan et al., 1996:382)

捕 食 性。

分 佈：新疆西北(夏候鳥)。

Leiothrix lutes lutes 紅嘴相思鳥 (Tang, 1991:53)

捕 食：松毛蟲

雜食性，微小昆蟲及卵。

分 佈：浙江。

Leptopoecile elegans 鳳頭雀鶯 (Yan et al., 1996:398)

捕 食 性。

分 佈：雲南西北部、貴州西部、四川、甘肅、青海東部、西藏東部(特有種留鳥)。

Leptopoecile sophiae 花彩雀鶯 (Yan et al., 1996:398)

捕 食 性。

分 佈：青海中部、新疆西部(留鳥)；雲南西北部、四川、西藏、新疆西南、青海、甘肅、寧夏、陝西西南部(夏候鳥)。

附 註：中國有四亞種。

Locustella certhiola 小蝗鶯 (Yan et al., 1996:376)

捕 食 性。

分 佈：臺灣(迷鳥)；新疆經青海、甘肅、寧夏、陝西、山西、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江(夏候鳥)。

附 註：中國有四亞種。

Locustella fasciolata (Gray) 蒼眉蝗鶯 (Chen et Yu, 1984, III:389; Yan et al., 1996:374)

別 名：*花眉蝗鶯，黃眉鷚*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(偶見過境鳥或迷鳥)；內蒙古東北部、吉林、黑龍江(夏候鳥)；西伯利亞東部。

Locustella lanceolata (Temminck) 矛斑鷚 (Yan et al., 1996:376)

別 名：*矛斑蝗鶯*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(屏東，偶見過境鳥)、海南、廣東、東南沿海各省、湖北可見(過境鳥)、新疆、東北各省(夏候鳥，繁殖)。

Locustella luscinicoides 鴝蝗鶯 (Yan et al., 1996:374)

捕 食 性。

分 佈：新疆西北部(迷鳥)。

Locustella naevia 黑斑蝗鶯 (Yan et al., 1996:376)

捕 食：昆蟲、小型無脊椎動物。

分 佈：新疆西部(夏候鳥)。

Locustella ochotensis ochotensis (Middendorff) 花尾鷚 (Chen et Yu, 1984, III:389; Yan et al., 1996:376)

別 名：*花尾鶲，北蝗鶯*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(偶見過境鳥或迷鳥)、廣東至山東半島及沿海各省(過境鳥)、華北、吉林(夏候鳥)。

Locustella pleskei 史氏蝗鶯 (Yan et al., 1996:376)

捕 食 性。

分 佈：廣東、福建、浙江、江蘇(過境鳥)。

Megalurus palustria 沼澤大尾鶯 (Yan et al., 1996:374)

捕 食：昆蟲。

分 佈：廣西、雲南、貴州(留鳥)。

Megalurus pryeri 斑背大尾鶯 (Yan et al., 1996:374)

捕 食：昆蟲。

分 佈：江西、湖南、安徽、湖北(冬候鳥)；遼寧(夏候鳥)。

Oligura castanecoronata 栗頭地鶯 (Yan et al., 1996:372)

捕 食：昆蟲、草籽。

分 佈：雲南、貴州西部、四川南部、西藏東南(留鳥)。

Orthotomus atrogularis 黑喉縫葉鶯 (Yan et al., 1996:386)

捕 食 性。

分 佈：雲南西南部(留鳥)。

Orthotomus cucullatus 金頭縫葉鶯 (Su et al., 1986:42; Yan et al., 1996:386)

捕 食：鱗翅目幼蟲、鞘翅目成蟲。

分 佈：廣東、雲南、廣西西部、貴州南部(留鳥)。

Orthotomus sutorius 長尾縫葉鶯 (Yan et al., 1996:386)

捕 食 性。

分 佈：海南、浙江經安徽南部、湖北、湖南、貴州、雲南、西藏東南部以及廣西、廣東、福建、江西(留鳥)。

Phragamaticola aedon 蘆鶯 (Su et al., 1986:42)

捕 食：稻綠蝽。

分 佈：廣東。

Phylloscopus affinis 黃腹柳鶯 (Yan et al., 1996:388)

捕 食：甲蟲、大蚊、鱗翅目幼蟲。

分 佈：雲南西南、廣西西部、貴州南部(冬候鳥)；雲南西北經四川、陝西、甘肅、至西藏(夏候鳥)。

Phylloscopus armandi 棕眉柳鶯 (Yan et al., 1996:388)

捕 食：刺蛾、毒蛾、甲蟲等昆蟲和幼蟲。

分 佈：雲南、廣西(冬候鳥)；雲南經四川、湖北、河南、河北、遼寧、內蒙古、甘肅、青海至西藏(夏候鳥)。

Phylloscopus borealis borealis (Blasius) 小鴗 (Chang, 1986:162; Chen et Yu, 1984, III:388; Su et al., 1986:42; Yan et al., 1996:392; Yang et Li, 1989:121; Zheng et al., 1981:163)

別 名：*鴗，子鴗，極北柳鶯，北寒帶柳鶯，柳串，情思*。

捕 食：盾蝽

沫蟬

Coleophora dahurica Falkovitsch 落葉松鞘蛾
茶尺蠖
步甲
蜘蛛。
分 佈：臺灣(普遍冬候鳥)、福建(武夷山區)、廣東、安徽(冬候鳥)；吉林、東北(夏候鳥)；西伯利亞東部，冬季南徙經華北至東南各省。
附 註：中國有三亞種。

Phylloscopus borealis xanthodryas (Swinhoe) 黃眉鵐 (Chen et Yu, 1984, III:388)
別 名：*大極北柳鶯*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(高雄、臺南、臺中、臺北，不普遍冬候鳥)、東南、華中、華北各省。

Phylloscopus cantator ricketti (Slater) 黃胸柳鶯 (Zheng et al., 1981:163; 166)
Phylloscopus cantator ricketti (Slater), 1897:
捕 食 性。
分 佈：福建(武夷山區挂墩)。

Phylloscopus collybias 嘰咋柳鶯 (Yan et al., 1996:386)
捕 食：昆蟲和幼蟲。
分 佈：新疆北部(過境鳥)。

Phylloscopus coronatus coronatus (Temminck et Schlegel) 冠羽柳鶯 (Yan et al., 1996:394)
別 名：*冕柳鶯*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(臺北，偶見迷鳥)；四川、河北、遼寧、吉林、黑龍江(夏候鳥)，冬季南徙經華北、華南。

Phylloscopus davisoni 白尾柳鶯 (Yan et al., 1996:394)
捕 食 性。
分 佈：雲南西南(留鳥)；雲南東北部、貴州、四川東南部、廣西、廣東、福建、江西、湖南(夏候鳥)。

Phylloscopus davisoni ogilviegranti (La Touche) 白斑尾柳鶯 (Zheng et al., 1981:166)
Phylloscopus davisoni ogilviegranti (La Touche), 1921:
捕 食 性。
分 佈：福建(武夷山區挂墩)。

Phylloscopus emeiensis 峨嵋柳鶯 (Yan et al., 1996:394)
捕 食 性。
分 佈：四川(特有留鳥)。

Phylloscopus fulgiventer 煙柳鶯 (Yan et al., 1996:388)
捕 食 性。
分 佈：西藏南部(夏候鳥)。
附 註：中國有二亞種。

Phylloscopus fuscatus fuscatus (Blyth) 褐色柳鶯 (Yan et al., 1996:388)
別 名：*褐柳鶯，塵鶯，黑點燕兒*。
捕 食：尺蠖、甲蟲、毛蟲等。
分 佈：臺灣(罕見冬候鳥)；海南、雲南、廣西、湖南、湖北南部、廣東、福建(冬候鳥)；雲南西北經四川、陝西、河北、內蒙古、東北、以西廣大地區(夏候鳥)；西伯利亞東部，冬季移徙華南。
附 註：中國有二亞種。

Phylloscopus fuscatus fuscatus 褐柳鶯 (Zheng et al., 1981:163)
捕 食 性。
分 佈：福建(武夷山區)。

Phylloscopus griseolus 灰柳鶯 (Yan et al., 1996:390)
捕 食 性。
分 佈：青海、新疆(夏候鳥)。

Phylloscopus hainanus 海南柳鶯 (Yan et al., 1996:394)
捕 食 性。
分 佈：海南(特有留鳥)。

Phylloscopus inornatus 黃眉柳鶯 (Liu et Chen, 1985, 2(33/4):183-188; Su et al., 1986:42; Yan et al., 1996:392)
捕 食：鱗翅目幼蟲(螟蛾、尺蛾、卷葉蛾)、葉蟬、象甲、小蠹、其它小甲蟲、益蜂科成蟲、蟻、蚊、蠅。
分 佈：臺灣、海南、福建、廣東、廣西、貴州南部、雲南南部、西藏南部(冬候鳥)；雲南、四川、陝西、寧夏、甘肅、青海、新疆西北部、內蒙古東北部、遼寧、吉林、黑龍江(夏候鳥)。
附 註：中國有三亞種。

Phylloscopus inornatus inornatus (Blyth) 黃眉柳鶯 (Chen et Yu, 1984, III:387; Zheng et al., 1981:163)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(稀見冬候鳥)、福建(武夷山區)；西伯利亞東部(繁殖)，冬季南徙。

Phylloscopus maculipennis 灰喉柳鶯 (Yan et al., 1996:390)
捕 食 性。
分 佈：雲南中南部(冬候鳥)；雲南、四川、西藏(夏候鳥)。

Phylloscopus magnirostris 烏嘴柳鶯 (Yan et al., 1996:392)

捕 食 性。

分 佈：雲南西北部、四川、陝西西南部、寧夏、甘肅、青海東北部、西藏東南部(夏候鳥)。

Phylloscopus plumbeitarsus 雙斑綠柳鶯 (Yan et al., 1996:392)

捕 食 性。

分 佈：海南(冬候鳥)；東北(夏候鳥)。

Phylloscopus proregulus proregulus 黃腰柳鶯 (Liu et Chen, 1988, 9(Suppl.);1-6; Su et al., 1986:42; Yan et al., 1996:390; Yang et Li, 1989:121; Zheng et al., 1981:163)

捕 食：*Coleophora dahurica* Falkovitsch 落葉松鞘蛾
昆蟲和幼蟲。

分 佈：雲南東南部、廣西、廣東、福建、浙江、江蘇延長江流域至四川、貴州(冬候鳥)；雲南西北經四川向東北至遼寧、吉林、黑龍江、內蒙古西部向西南經甘肅、青海、至西藏中部(夏候鳥)。

附 註：中國有二亞種。

Phylloscopus pulcher 橙斑翅柳鶯 (Yan et al., 1996:390)

捕 食：昆蟲和幼蟲。

分 佈：雲南西北部經四川、陝西、甘肅、青海東北部及南部、西藏東南部(夏候鳥)。

Phylloscopus reguloides 冠紋柳鶯 (Yan et al., 1996:394)

捕 食 性。

分 佈：雲南南部(冬候鳥)；浙江經安徽、河南、山西、陝西、甘肅南部、青海東部、四川、西藏南部、雲南北部、以及東南沿海各省的廣大區(夏候鳥)。

Phylloscopus reguloides fokiensis Harterty 冠紋柳鶯 (Zheng et al., 1981:163, 166)

Phylloscopus reguloides fokiensis Harterty, 1917:

捕 食 性。

分 佈：福建(武夷山區挂墩)。

Phylloscopus ricketti 黃胸柳鶯 (Yan et al., 1996:394)

捕 食 性。

分 佈：福建經江西、湖北、陝西南部、甘肅南部、四川、貴州、雲南、廣西、廣東(夏候鳥)。

Phylloscopus schwarzi 巨嘴柳鶯 (Yan et al., 1996:388)

捕 食：鱗翅目、鞘翅目、雙翅目。

分 佈：廣東(冬候鳥)；內蒙古東北部、遼寧、吉林、黑龍江(夏候鳥)。

Phylloscopus sibilatrix 林柳鶯 (Yan et al., 1996:390)

捕 食：昆蟲。

分 佈：西藏(迷鳥)。

Phylloscopus sichuanensis 四川柳鶯 (Yan et al., 1996:390)
捕 食 性。
分 佈：四川、河南、山東、甘肅、陝西、山西、河北、遼寧(夏候鳥)。

Phylloscopus sindianus 東方嘰咋柳鶯 (Yan et al., 1996:386)
捕 食 性。
分 佈：新疆西部(夏候鳥)。

Phylloscopus subaffinis 棕腹柳鶯 (Yan et al., 1996:388)
捕 食 性。
分 佈：雲南南部、廣西、廣東、福建(冬候鳥)；浙江經安徽、河南、陝西、甘肅、青海、西藏南部至雲南、廣西(夏候鳥)。

Phylloscopus tenellipes 淡腳柳鶯 (Gao et Li, 1981, 2(4):307-316; Yan et al., 1996:392)
別 名：*灰腳柳鶯*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(迷鳥)；東北(夏候鳥)。

Phylloscopus trochiloides 暗綠柳鶯 (Su et al., 1986:42; Yan et al., 1996:392)
捕 食：同翅目成蟲、鱗翅目幼蟲、其它昆蟲。
分 佈：雲南東南部(冬候鳥)；雲南經四川、山西、陝西、寧夏、甘肅、內蒙古西部、新疆、西藏東南部、廣東(夏候鳥)。
附 註：中國三亞種。

Prinia atrogularis 黑喉山鷦鶯 (Su et al., 1986:44; Yan et al., 1996:386)
捕 食：蝗蟲、步甲、葉甲和其它昆蟲。
分 佈：福建經江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、西藏東南(留鳥)。
附 註：中國有二亞種。

Prinia criniger 山鷦鶯 (Yan et al., 1996:384)
別 名：*斑紋鷦鶯*。
捕 食：昆蟲、植物種子。
分 佈：臺灣、江蘇南部經安徽、河南、陝西、甘肅、四川、西藏東南部、雲南及東南沿海各省廣大地區(留鳥)。

Prinia flaviventris 黃腹鷦鶯 (Su et al., 1986:44; Yan et al., 1996:384)
別 名：*灰頭鷦鶯*。
捕 食：蝗蟲、同翅目和膜翅目昆蟲、植物種子。
分 佈：臺灣、海南、雲南、貴州、廣西、廣東、湖南、江西、福建(留鳥)。

Prinia flaviventris sonitans Swinhoe 灰頭鷦鶯 (Chen et Yu, 1984, III:387; Zheng, 1986:262; Zheng et al., 1981:163)

別 名：*青羽團扇鳥，灰頭鷦鷯鶯，中國黃腹鷦鷯鶯，黃腹鷦鶯*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(開闊地草叢中，普遍留鳥)、福建(武夷山區)、東南各省。
附 註：中國有二亞種。

Prinia hodgsoni 灰胸鷦鶯 (Yan et al., 1996:384)

捕 食：昆蟲。
分 佈：雲南、廣西西部、貴州、四川東南部(留鳥)。

Prinia polychroa striata Swinhoe 斑紋鷦鶯 (Chen et Yu, 1984, III:387; Zheng, 1986:262)

別 名：*褐山鷦鶯，羽團扇鳥，紋背山鷦鶯，堅紋山鶯*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(2,500m 以下開闊草地及灌叢中，特產亞種)。

Prinia rufescens 鷦鶯 (Yan et al., 1996:384)

捕 食：昆蟲和幼蟲。
分 佈：雲南、廣西西部、貴州(留鳥)。

Prinia subflava 褐頭鷦鶯 (Su et al., 1986:42; Yan et al., 1996:384)

捕 食：蝽科、其它半翅目昆蟲、同翅目、金龜、尺蛾科和其它鱗翅目幼蟲、蟻、蜘蛛、多足綱動物。
分 佈：臺灣、海南、雲南經四川、甘肅、陝西、湖北、安徽及東南沿海各省(留鳥)。
附 註：中國有二亞種。

Prinia subflava extensicauda 褐頭鷦鶯 (Zheng et al., 1981:163)

捕 食 性。
分 佈：福建(武夷山區)。

Prinia subflava formosa Harington 臺灣鷦鶯 (Chen et Yu, 1984, III:387; Zheng, 1986:262)

別 名：*眉羽團扇鳥，褐頭鷦鶯*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(1,500m 以下草叢及灌木林中，特產亞種)。

Regulus goodfellowi Ogilvie-Grant 臺灣戴菊鳥 (Chen et Yu, 1984, III:386; Tsou et al., 1990:131; Yan et al., 1996:398; Zheng, 1986:262)

別 名：*新高戴菊，臺灣火冠戴菊，火冠戴菊鳥*。
捕 食：樹皮及枝芽之昆蟲、卵及蛹。
分 佈：臺灣(2000-3700m 針葉林中，特有種，普遍)。

Regulus ignicapillus goodfellowi Ogilvie-Grant 臺灣戴菊鳥 (Chen, 1969(2):282)

捕 食 性。
分 佈：臺灣(阿里山、玉山)。

Regulus regulus 戴菊 (Yan et al., 1996:398)
捕 食 性。
分 佈：臺灣、雲南、貴州、四川、陝西、寧夏、甘肅、青海、西藏(留鳥)；浙江、江蘇、安徽、新疆西部(冬候鳥)；新疆西北、東北(夏候鳥)。
附 註：中國有四亞種。

Regulus regulus japonensis Blakiston 戴菊鳥 (Chen, 1969(2):282; Chen et Yu, 1984, III:386)
=*Regulus cristatus orientalis* Seebohn
捕 食 性。
分 佈：臺灣(阿里山，稀見冬候鳥，可能留鳥)、華北、西北；西伯利亞東部。

Rhopophilus pekinensis 山鶥 (Yan et al., 1996:382)
捕 食 性。
分 佈：新疆經青海、甘肅、寧夏、陝西、山西、內蒙古、遼寧(特有種留鳥)。
附 註：中國有三亞種。

Seicercus affinis 白眶鶲鶯 (Tan et al., 1996:396)
捕 食 性。
分 佈：廣東、福建(冬候鳥)；福建、雲南東南部(夏候鳥)。

Seicercus albogularis fulvifacies (Swinhoe) 棕面鶯 (Chen et Yu, 1984, III:388; Zheng, 1986:262; Zheng et al., 1981:163)
別 名：*棕臉鶲鶯，暗黃臉鶲鶯，棕面捕蠅鶯*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(500-2,300m 間闊葉林中，普遍留鳥)、福建(武夷山區)、東南、華南。

Seicercus burkii 金眶鶲鶯 (Tan et al., 1996:396)
捕 食 性。
分 佈：廣西西部、雲南、貴州、四川、西藏東南部、甘肅南部、陝西南部(留鳥)；廣西、廣東、福建、江西、湖北、河南、陝西東南部(夏候鳥)。

Seicercus castaneiceps 栗頭鶲鶯 (Tan et al., 1996:394)
捕 食 性。
分 佈：廣西、廣東、福建(冬候鳥)；雲南西北及西藏東南部(留鳥)；雲南、貴州、四川、湖北、湖南、江西(夏候鳥)。
附 註：中國市三亞種。

Seicercus castaneiceps sinensis (Rickett) 栗頭鶲鶯 (Zheng et al., 1981:163, 166)
Seicercus castaniceps sinensis (Rickett), 1989:

? *Seicerceus burkii latouchei* Bangs, 1929:
捕 食 性。
分 佈：福建(武夷山區挂墩)。

Seicercus intermedius (La Touche) 短嘴鶲鶯 (Zheng et al., 1981:165)
Seicercus intermedius (La Touche)
捕 食 性。
分 佈：福建(武夷山區挂墩)。

Seicercus poliogenys 灰臉鶲鶯 (Tan et al., 1996:396)
捕 食：昆蟲。
分 佈：雲南(留鳥)。

Seicercus xanthoschista 灰頭鶲鶯 (Tan et al., 1996:396)
捕 食 性。
分 佈：西藏南部(留鳥)。

Sylvia communis 灰白喉林鶯 (Tan et al., 1996:400)
捕 食 性。
分 佈：新疆西北部(夏候鳥)。

Sylvia curraca 白喉林鶯 (Tan et al., 1996:400)
捕 食 性。
分 佈：內蒙古東北部(夏候鳥)。

Sylvia minula 沙白喉林鶯 (Tan et al., 1996:400)
捕 食：葉甲和昆蟲幼蟲。
分 佈：青海、甘肅、新疆內蒙古西部(夏候鳥)。

Sylvia nana 漠地林鶯 (Tan et al., 1996:400)
捕 食 性。
分 佈：新疆北部、內蒙古西部(夏候鳥)。

Sylvia nisoria 橫斑鶯 (Tan et al., 1996:400)
捕 食：昆蟲和幼蟲。
分 佈：新疆西部(夏候鳥)。

Tesia cyaniventer 灰腹地鶯 (Yan et al., 1996:372)
捕 食 性。
分 佈：廣西、雲南、西藏東南(留鳥)。

Tesia olivea 金冠地鶯 (Yan et al., 1996:372)

捕 食：昆蟲、小角型無脊椎動物。
分 佈：雲南、廣西西部、貴州、四川南部(留鳥)。

Tickellia hodgsoni 寬嘴鶲鶯 (Yan et al., 1996:398)
捕 食 性。
分 佈：雲南東南部(夏候鳥)。

Urophene squameiceps 鱗頭樹鶯 (Yan et al., 1996:372)
別 名：*短尾鶯*。
捕 食：各類昆蟲。
分 佈：臺灣、海南、廣東(冬候鳥)；吉林、黑龍江(夏候鳥)。

Muscicapidae 鶲科

Copsychus saularis (Linnaeus) 鵲鴝 (Chang, 1986:162)
捕 食：茶毛蟲
黑絨金龜
黑翅大白蟻
黃斑蝽
瓢蟲
蜻蜓
蜘蛛
螺
主食蠅蛆。
分 佈：安徽。

Culicicapa ceylonensis 方尾鶲 (Yan et al., 1996:412)
捕 食 性。
分 佈：雲南南部(留鳥)；廣西、雲南、貴州、湖南西北部、四川、西藏南部(夏候鳥)。

Cyanoptila cyanomelaena cyanomelaena (Temminck) 白腹瑠璃鳥 (Chen et Yu, 1984, III:393; Yan et al., 1996:410)
別 名：*白腹琉璃鳥*，*白腹姬鶲*，*大瑠璃*，*瑠璃鳥*，*竹林鳥*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(2,100m 以下森林中，不普遍冬候鳥)；海南(冬候鳥)；貴州、華北、東北(夏候鳥)，冬季移徙至華南。

Ficedula cyanomelana cyanomelana 白腹鶲 (Su et al., 1986:43; Zheng et al., 1981:163)
捕 食：鱗翅目、雙翅目。
分 佈：福建(武夷山區)、廣東。

Ficedula hodgsonii 鏽胸藍姬鶲 (Yan et al., 1996:410)

捕 食 性。
分 佈：雲南西部、四川西部、西藏東部(夏候鳥)。

Ficedula hyperythra 棕胸藍姬鶲 (Yan et al., 1996:410)
別 名：*黃胸青鶲*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、海南(留鳥)；廣西、雲南、貴州西部、四川中部、西藏南部(夏候鳥)。

Ficedula hyperythra innexa (Swinhoe) 黃胸青鶲 (Chen et Yu, 1984, III:393; Tsou et al., 1990:85; Zheng, 1986:262)
=*Denddrobiastes hyperythruss taivanicus* Hachisuka
別 名：*棕胸藍姬鶲*。
捕 食：小蟲。
分 佈：臺灣(700-2300m 間茂密闊葉林中，特有亞種)。

Ficedula monileger 白喉姬鶲 (Yan et al., 1996:408)
捕 食：昆蟲、嫩葉、種子。
分 佈：雲南西南(南康河)(迷鳥)。

Ficedula mugimaki (Temminck) 白眉黃鶲 (Chen et Yu, 1984, III:393; Su et al., 1986:43; Yan et al., 1996:412; Zheng et al., 1981:163)
別 名：*鴝姬鶲，鴝鶲，郊鶲，麥鶲，小燕*。
捕 食：鞘翅目昆蟲。
分 佈：臺灣(稀有迷鳥、過境鳥與冬候鳥)、海南、廣西、廣東、福建(武夷山區)、華南(冬候鳥)；東北(夏候鳥)；西伯利亞(繁殖)。

Ficedula narcissina narcissina (Temminck) 黃眉鶲 (Chen et Yu, 1984, III:393; Yan et al., 1996:412; Zheng et al., 1981:163)
別 名：*黃鶲，黃眉彩鶲，黃眉姬鶲，黃眉黃鶲，水仙花鶲，鴨蛋黃*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(過境鳥)；海南(冬候鳥)；福建(武夷山區)；河南西北、山西南部、河北(夏候鳥)、華北各省，冬季移徙華南及東南各省。
附 註：中國有二亞種。

Ficedula parva 紅喉姬鶲 (Yan et al., 1996:408)
別 名：*紅喉鶲*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(迷鳥)；海南、廣東、福建南部(冬候鳥)；東北(夏候鳥)。

Ficedula parva albicilla 紅喉鶲 (Zheng et al., 1981:163)
捕 食 性。
分 佈：福建(武夷山區)。

Ficedula sapphira 玉頭姬鶲 (Yan et al., 1996:410)

捕 食 性。

分 佈：四川東北、陝西南部(留鳥)；雲南、四川中南部(夏候鳥)。

Ficedula strophiata 橙胸姬鶲 (Yan et al., 1996:408)

捕 食 性。

分 佈：廣西西南部、雲南東南(冬候鳥)；雲南、貴州、湖南西北、湖北西南、陝西及甘肅南部、四川、西藏南部(夏候鳥)。

Ficedula tricolor 灰藍姬鶲 (Yan et al., 1996:410)

捕 食 性。

分 佈：雲南、貴州、陝西及甘肅南部、四川、西藏東南(夏候鳥)。

Ficedula superciliaris 白眉藍姬鶲 (Yan et al., 1996:410)

捕 食 性。

分 佈：雲南南部(冬候鳥)；雲南西北、四川西南、西藏南部(夏候鳥)。

Ficedula westermanni 小斑姬鶲 (Yan et al., 1996:408)

捕 食 性。

分 佈：廣西西部、雲南、西藏東南(夏候鳥)。

Ficedula zanthopygia Hay 白眉鶲 (Xu, 1985:26; Yang et Li, 1989:121; Yan et al., 1996:412; Zheng et al., 1981:163)

別 名：*白眉姬鶲*。

捕 食：天牛

銅綠金龜

Coleophora dahurica Falkovitsch 落葉松鞘蛾

鱗翅目昆蟲

蟻。

分 佈：福建(武夷山區)、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、江蘇、安徽、河南、陝西、山東、山西、河北、內蒙古東部、吉林、東北(夏候鳥)。

Garrulax cineraceus cinereiceps Styan 灰翅噪眉鳥 (Xu, 1985:26)

捕 食：天牛

毒蛾

蟻

蜂。

分 佈：福建、湖南、廣東、雲南、四川、浙江、安徽、湖北、陝西、甘肅。

Garrulax sannio oblectanus Deignan 白頰噪眉鳥 (Xu, 1985:26)

捕 食：天牛

鞘翅目昆蟲

蟻。

分 佈：貴州、四川、陝西、甘肅。

Hypothymis azurea oberholseri Stresemann 黑頸鶲 (Chen et Yu, 1984, III:393; Zheng, 1986:262)

別 名：*黑枕王鶲，黑枕藍鶲*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(1,500m 以下闊葉樹林中，特產亞種)。

Muscicapa dauurice 北灰鶲 (Yan et al., 1996:402)

別 名：*寬嘴鶲*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(過境鳥)；海南、廣西、廣東(冬候鳥)；雲南、貴州、內蒙古東部、吉林、黑龍江(夏候鳥)。

Muscicapa ferruginea (Hodgson) 紅尾鶲 (Chen et Yu, 1984, III:394; Yan et al., 1996:408; Zheng, 1986:262)

Hemichelidon ferruginea Hodgson

=*Hemichelidon rufilata* Swinhoe

別 名：*深山鶲，棕尾褐鶲，紅褐鶲*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(1,200-2,800m 間闊葉林中，普遍留鳥)、海南、雲南南部(冬候鳥)；四川、西藏東南部、陝西西南、甘肅南部(夏候鳥)。

Muscicapa griseisticta (Swinhoe) 中國灰斑鶲 (Chen et Yu, 1984, III:394; Yan et al., 1996:402)

別 名：*斑胸鶲，灰斑鶲*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(稀見冬候鳥)、冬季南徙東南、西南、華南；華北、東北(夏候鳥)；西伯利亞東部。

Muscicapa latirostris Raffles 寬嘴鶲 (Chen et Yu, 1984, III:394; Su et al., 1986:43; Yang et Li, 1989:121; Zheng et al., 1981:163)

別 名：*北灰鶲，小鮫鶲，小斑鶲，褐鶲*。

捕 食：直翅目

Coleophora dahurica Falkovitsch 落葉松鞘蛾

尺蛾科和其它鱗翅目、鞘翅目昆蟲、虻科、食蟲虻、家蠅、小蜂、蟻。

分 佈：臺灣(稀有過境鳥)、福建(武夷山區)、廣東、吉林、東北各省；西伯利亞東部，冬季南徙華南及西南諸省。

Muscicapa muttui 褐胸鶲 (Yan et al., 1996:402)

捕 食 性。

分 佈：雲南東部、廣西、貴州、湖南西部、四川(夏候鳥)。

Muscicapa sibirica sibirica Gmelin 西伯利亞灰斑鶲 (Chen et Yu, 1984, III:3394; Su et al., 1986:43; Yan et al.,

1996:402; Zheng et al., 1981:163)
別 名：*鮫鶲，斑鶲，烏鶲，塞鶲*。
捕 食：鞘翅目和膜翅目成蟲、蟻、癭蚊。
分 佈：臺灣(稀見冬候鳥及過境鳥)；海南、廣西、廣東、福建(武夷山區)、江西、湖南南端(冬候鳥)；雲南、貴州、四川、西藏東南部、甘肅、寧夏、內蒙古東部、吉林、黑龍江(夏候鳥)；西伯利亞東部，冬季南徙至東南及西南各省。

Muscicapa striata 斑鶲 (Yan et al., 1996:402)
捕 食 性。
分 佈：新疆西北邊(夏候鳥)。

Muscicapa thalassina 銅藍鶲 (Yan et al., 1996:404)
捕 食：昆蟲。
分 佈：福建、浙江南部(夏候鳥)；雲南、貴州、廣西、廣東、江西西南經湖北陝西、甘肅、青海至西藏南部(夏候鳥)。

Niltava banyumas 山藍仙鶲 (Yan et al., 1996:406)
捕 食 性。
分 佈：雲南、貴州、四川(夏候鳥)。

Niltava concreta 白尾藍仙鶲 (Yan et al., 1996:404)
捕 食 性。
分 佈：雲南南部(夏候鳥)。

Niltava davidi (La Touche) 棕腹大仙鶲 (Yan et al., 1996:408; Zheng et al., 1981:165)
Niltava davidi (La Touche)
捕 食 性。
分 佈：海南、雲南、四川、福建(武夷山區挂墩) (留鳥)；廣西、貴州(冬候鳥)。

Niltava grandis 大仙鶲 (Yan et al., 1996:404)
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Niltava hainana 南藍仙鶲 (Yan et al., 1996:404)
捕 食 性。
分 佈：海南(留鳥)；雲南東南、廣西、廣東、湖南南部(夏候鳥)。

Niltava hodgsonii 侏藍仙鶲 (Yan et al., 1996:406)
捕 食 性。
分 佈：雲南(騰衝)。

Niltava macgregoriae 小仙鶲 (Yan et al., 1996:404)

捕 食 性。
分 佈：廣東西南、廣西東南(留鳥)；廣西、貴州東南、雲南、西藏南部(夏候鳥)。

Niltava poliogenys 灰頰仙鶲 (Yan et al., 1996:408)
捕 食 性。
分 佈：雲南西南及東南部(留鳥)。

Niltava rubeculoides 藍喉仙鶲 (Yan et al., 1996:406)
捕 食 性。
分 佈：雲南、貴州、四川、湖北西南部、陝西南部(夏候鳥)。

Niltava sundara 棕腹仙鶲 (Yan et al., 1996:406)
捕 食 性。
分 佈：雲南、貴州、湖北、陝西、四川、西藏南部(夏候鳥)。

Niltava unicolor 純藍仙鶲 (Yan et al., 1996:404)
捕 食 性。
分 佈：海南(留鳥)；廣西西南、雲南、西藏東南(夏候鳥)。
附 註：中國有二亞種。

Niltava vivida vivida (Swinhoe) 黃腹琉璃鳥 (Chen etYu, 1984, III:393; Tsou et al., 1990:87; Yan et al., 1996:406; Zheng, 1986:262)
別 名：*棕腹藍仙鶲*。
捕 食：昆蟲及漿果。
分 佈：臺灣(1,000-2,600m 闊葉林到較高的混生林，留鳥)；雲南、四川、西藏東南部(夏候鳥)。

Rhinomyias brunneata brunneata (Slater) 白喉林鶲 (Yan et al., 1996:402; Zheng et al., 1981:163, 166)
捕 食 性。
分 佈：廣東、福建(武夷山區挂墩)、江西、浙江、安徽、江蘇(夏候鳥)。

Saxicola ferrea haringtoni Hartert 灰林䳭鳥 (Xu, 1985:26)
捕 食：金龜
天牛
葉甲
象甲。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、湖北、上海、陝西。

Monarchidae 王鶲科

Hypothymis azurea 黑枕王鶲 (Yan et al., 1996:412)

別 名：*黑枕藍鶲*。
捕 食：昆蟲。
分 佈：臺灣、海南、廣東、廣西東部(留鳥)；廣西西部、雲南、貴州、四川(夏候鳥)。

Rhipidura albicollis　白喉扇尾鶲 (Yan et al., 1996:414)
捕 食 性。
分 佈：海南、雲南、廣西、廣東西部、貴州、湖南西部、湖北西南、四川南部、西藏南部(留鳥)。

Rhipidura aureola　白眉扇尾鶲 (Yan et al., 1996:414)
捕 食 性。
分 佈：雲南(騰衝)(留鳥)。

Rhipidura hypoxantha　黃腹扇尾鶲 (Yan et al., 1996:414)
捕 食 性。
分 佈：雲南、四川西南、西藏南部(留鳥)。

Terpsiphone atrocaudate　紫壽帶鳥 (Yan et al., 1996:414)
別 名：*綬帶鳥*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(留鳥)；海南、雲南東部、貴州、廣西、廣東、福建、江西、湖南、湖北東南部、浙江、安徽、江蘇、山東、河北、遼寧(過境鳥)。
附 註：中國有二亞種。

Terpsiphone atrocaudata atrocaudata (Eyton) 綬帶鳥 (Chen et Yu, 1984, III:393; Tsou et al., 1990:89)
別 名：*紫壽帶鳥，三光鳥，日本練鵲，練鵲，紃鵲*。
捕 食：林中的飛蟲。
分 佈：臺灣(1,200m 以下原始闊葉林中，蘭嶼)、華北及東北各省、冬季南徙至東南各省。

Terpsiphone atrocaudata periophthalmica (Ogilvie-Grant) 黑綬帶鳥 (Chen et Yu, 1984, III:393; Zheng, 1986:262)
=*Terpsiphone atrocaudata tadai* Flycatcher
別 名：*黑三光鳥*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(蘭嶼、綠島)；菲律賓。

Terpsiphone paradisi　壽帶鳥 (Su et al., 1986:43; Yan et al., 1996:414)
捕 食：尺蛾、松毛蟲、天蠶蛾幼蟲、食蚜蠅。
分 佈：雲南、四川、甘肅及陜西南部、河南、河北、遼寧、吉林以及東南沿海各省的廣大地區(夏候鳥)。
附 註：中國有三亞種。

Terpsiphone paradisi incei 壽帶 (Zheng et al., 1981:163)

捕 食 性。

分 佈：福建(武夷山區)。

Remizidae 攀雀科

Cephalopyrus flammiceps 火冠雀 (Yan et al., 1996:416)

捕 食：植物種子、昆蟲。

分 佈：雲南、四川、陝西及甘肅南部、西藏東南及西南部(留鳥)。

Remiz pendulinus 攀雀 (Yan et al., 1996:414)

捕 食：植物種子、昆蟲。

分 佈：臺灣(稀有過境鳥)；雲南西部、湖北東長江流域(冬候鳥)；新疆、青海、甘肅、寧夏、陝西、山西、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江(夏候鳥)。

附 註：中國有三亞種。

Aegithalidae 長尾山雀科

Aegithalos caudatus 銀喉長尾山雀 (Yan et al., 1996:416)

棲 息：山地針葉林或針、闊葉混交林中。

捕 食：昆蟲。

分 佈：西南、華東、華北、東北(留鳥)。

附 註：中國有三亞種。

Aegithalos concinnus 紅頭長尾山雀 (Yan et al., 1996:416)

棲 息：成群在低山開闊的荊棘或山坡灌木叢間。

捕 食：昆蟲。

分 佈：臺灣、華南、西南、華中(留鳥)。

附 註：中國有三亞種。

Aegithalos fuliginosus 銀臉長尾山雀 (Yan et al., 1996:416)

棲 息：1,000m 以上高山森林中。

捕 食：昆蟲。

分 佈：四川，陝西、甘肅(留鳥)。

Aegithalos louschistos 黑頭長尾山雀 (Yan et al., 1996:416)

棲 息：2,000-3,000m 針葉、針闊葉昆交林或竹林等。

捕 食：昆蟲。

分 佈：西南。

附 註：中國有三亞種。

Paridae 山雀科

Aegithalos caudatus 銀喉[長尾山雀 (Yang et Li, 1989:121)

捕 食：*Coleophora dahurica* Falkovitsch 落葉松鞘蛾。
分 佈：吉林、東北。

Aegithalos concinnus concinnus (Gould) 紅頭山雀 (Chen et Yu, 1984, III:396; Liu et al., 1957:48; Su et al., 1986:43; Tsou et al., 1990:91; Zheng, 1986:262; Zheng et al., 1981:164)

別 名：*黑喉山雀，紅頭長尾山雀*。
捕 食：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲
鞘翅目。
分 佈：臺灣(1,000-2,500m 溫帶林中，普通的留鳥)、福建(武夷山區)、廣東、華南、湖南、華北；越南、印度、巴基斯坦。

Aegithalos concinnus taiwanensis Yamashina 紅頭山雀 (Chen, 1969(2):282)

捕 食 性。
分 佈：臺灣(太平山)。

Paradoxornis webbiana (Gray) 棕頭鴉雀 (Chang, 1986:161)

捕 食：茶尺蠖
茶捲葉蛾
茶蚜
螳螂
步甲
瓢蟲
蜻蜓
草蛉
益蜂
食蚜蠅
蜘蛛。
分 佈：安徽。

Parus ater kuatunensis La Touche 煤山雀 (Zheng et al., 1981:164, 166)

捕 食 性。
分 佈：福建(武夷山區挂墩)。

Parus ater ptilosus Ogilvie-Grant 煤山雀 (Chen, 1969(2):281; Chen et Yu, 11984, III:396; Tsou et al., 1990:93; Zheng, 1986:262)

別 名：*臺灣日雀*。
捕 食：昆蟲。
分 佈：臺灣(2,400-3,600m 間針葉林中，特有亞種)。

Parus holsti Seebohm 黃山雀 (Chen, 1969(2):281;Chen et Yu, 1984, III:396; Tsou et al., 1990:95; Zheng, 1986:262)

別 名：*臺灣四十雀，臺灣黃山雀*。
捕 食：葉片上的小蟲。
分 佈：臺灣(海拔 1,000-3,000m 間原始闊葉林，特有種)。

Parus major Linnaeus 白臉山雀 (Chang, 1986:160; Sun, 1986:102; Wang, 1989:93; Wu et al., 1989:181-185; Xiao, 1985(2) 30; Yang et Li, 1989:121)

別 名：*大山雀*。
捕 食：直翅目
蝽
蹺蝽科
沫蟬
茶蚜
Metaceronema japonica Mask. 油茶刺綿蚧
Coleophora dahurica Falkovitsch 落葉松鞘蛾
茶尺蠖
茶白毒蛾
茶斑蛾
茶袋蛾
白囊袋蛾
扁刺蛾
Dendrolimus punctatus (Walker) 馬尾松毛蟲(幼蟲)
Hyphantia cunea (Drury) 美國白蛾(幼蟲)
小地老虎
步甲
黑絨金龜
象甲
蜘蛛。
分 佈：廣東、浙江、安徽、遼寧、吉林、東北。

Parus major artatis Thayer et Bang 大山雀 (Li et al., 1992:65; Tsai et al., 1979:49; Xu, 1985:26)

捕 食：天牛
金龜
象甲
舟蛾
Dendrolimus punctatus (Walker) 馬尾松毛蟲
油松種實害蟲。
分 佈：陝西、山東、山西、全國各地。

Parus major commixtus Swinheo 白頰山雀 (Chen et Yu, 1984, III:396; Xu, 1985:26; Zheng et al., 1981:163; Zhang et Zhou, 1996, 18(40:184)

Parus major commixtus Swinheo

=*Parus major fohkiensis* La Touche
=*Parus major makii* Momiyama
別 名：*大山雀*。
捕 食：天牛
松毛蟲
Diprion liuwanensis 六萬松葉蜂(幼蟲)
Gilpinia massoniana 馬尾松吉松葉蜂(幼蟲)
Neodiprion dailingensis 帶嶺新松葉蜂(幼蟲)
Neodiprion guangxiicus 廣西新松葉蜂(幼蟲)
Neodiprion xianyunicus 祥雲新松葉蜂(幼蟲)。
分 佈：臺灣、福建(武夷山區)、江西、雲南、浙江、長江以南各省、山東。

Parus major fohkienensis La Touche 白臉山雀 (Chen, 1969(2):281; Liu et al., 1957)
捕 食：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲。
分 佈：臺灣、福建、湖南。

Parus montanus baicalalensis Swinheo 褐頭山雀 (Xu, 1985:26; Yang et Li, 1989:121)
捕 食：半翅目昆蟲
天牛
葉甲
小蠹蟲
Coleophora dahurica Falkovitsch 落葉松鞘蛾
鱗翅目昆蟲。
分 佈：新疆、吉林、東北。

Parus monticolus insperatus Swinhoe 綠背山雀 (Chen, 1969(2):282; Chen et Yu, 1984, III:396; Tsou et al., 1990:97; Zheng, 1986:262)
別 名：*青背山雀*。
捕 食：昆蟲。
分 佈：臺灣(全省山地 1,000-2,500m 間闊葉林中，特有亞種)。

Parus palustris brevicostris (Taczanovski) 沼澤山雀 (Liu et Zhang, 1993, 15(2)::89; Yang et Li, 1989:121)
捕 食：*Coleophora dahurica* Falkovitsch 落葉松鞘蛾
Dendrolimus superans (Butler) 落葉松毛蟲(卵、幼蟲、蛹、成蟲)。
分 佈：大興安嶺北部、吉林、東北。

Parus varius castaneoventris Gould 赤腹山雀 (Chen, 1969(2):282; Chen et Yu, 1984, III:396; Tsou et al., 1990:99; Zheng, 1986:262)
別 名：*臺灣山雀*，*雜色山雀*。
捕 食：鱗翅目昆蟲。
分 佈：臺灣(1,000m 以下闊葉林中，特有亞種，不甚普遍留鳥)。

Parus venustulus 黃腹山雀 (Su et al., 1986:43; Zheng et al., 1981:164)
捕 食：昆蟲。
分 佈：福建(武夷山區)、廣東。

Parus xanthogenys rex David 黃頰山雀 (Su et al., 1986:43; Zheng et al., 1981:164; 166)
捕 食：檀香粉蝶幼蟲、其它昆蟲。
分 佈：福建(武夷山區挂墩)、廣東。

Parus sp. 紅頂山雀 (Dai, 1992:41)
捕 食：*Adoxophyes orana* Fischer von Röslerstamm 茶小捲蛾(幼蟲)
Ceroplastes ceriferus Anderson 角蠟蚧
Myoxus sp. 小山鼠。
分 佈：貴州。

Remiz pendulinus consobrinus (Swinhoe) 攀雀 (Chen et Yu, 1984, III:397)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(可能偶見迷鳥)、長江中下游一帶(冬候鳥)、西北及東北各省。

Suthora gularis morrisoniana Ogilvie-Grant 黃羽鸚嘴 (Chen, 1969(2):282)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(玉山、阿里山等 2000-3000m. 處)。

Suthora webbiana bulomachus Swinhoe 粉紅鸚嘴 (Chen, 1969(2):282)
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Sylviparus modestus ricketti La Touche (Zheng et al., 1981:166)
捕 食 性。
分 佈：福建(武夷山區挂墩)。

Sittidae 鳾科

Sitta europaea montium La Touche 普通鳾 (Zheng et al., 1981:164; 166)
捕 食 性。
分 佈：福建(武夷山區挂墩)。

Sitte europaea sinensis Verreaux 茶腹鳾 (Yang et Li, 1989:121; Zheng, 1986:262; Zheng et al., 1981:164)
別 名：*普通綉*。
捕 食：*Coleophora dahurica* Falkovitsch 落葉松鞘蛾。
分 佈：臺灣、福建(武夷山區)、我國東南、西南、西北、華北、吉林、東北。

Zosteropidae 繡眼科

Zosterops japonica Temminck et Schlegel 暗綠繡眼 (Chang, 1986:162; Su et al., 1986:43)

捕 食：茶捲葉蛾
小綠葉蟬
主食蚜蟲
步甲
螳螂
草蛉
繭蜂科成蟲
蜘蛛。

分 佈：廣東、安徽。

Zosterops japonica batanis McGregor 巴丹繡眼 (Chen, 1969(2):274; Zheng, 1986:263)

別 名：*巴丹綠繡眼*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(蘭嶼、綠島，特有亞種)、菲律賓。

Zossterops japonica simplex Swinhoe 臺灣綠繡眼 (Chen et Yu, 1984, III399; Zheng, 1986:263; Zheng et al., 1981:164)

=*Zosterops palpebrosa tavaniana* Momiyama

別 名：*暗綠繡眼鳥*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(低海拔地區普遍留鳥)、福建(武夷山區)、東南、西南、華南、華北各省。

Zosterops palpebrosa taivaniana Momiyama 臺灣繡眼 (Chen, 1969(2):274)

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Fringillidae 雀科

Carduelis sinica sinica 金翅雀 (Zheng et al., 1981:164)

捕 食 性。

分 佈：福建(武夷山區)。

Carduelis sinica kawarahiba (Temminck) 金翅雀 (Chang, 1986:161; Chen et Yu, 1984:411; Chen et Yu, 11984, III:411; Yang et Yu, 1989:121)

別 名：*大黃雀*。

捕 食：茶葉象甲
Coleophora dahurica Falkovitsch 落葉松鞘蛾。

分 佈：臺灣(普遍冬候鳥)、安徽、吉林、東北；日本(繁殖)，冬季南徙。

Carduelis spinus (Linnaeus) 黃雀 (Chen et Yu, 1984, III:411)
別 名：*真鶸，蘆花黃雀*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(普遍冬候鳥)、內蒙古、東北等地；西伯利亞。冬季南徙華南。

Carpodacus erythrinus roseatus 普通朱雀 (Zheng et al., 1981:164)
捕 食 性。
分 佈：福建(武夷山區)。

Carpodacus vinaceus formosanus Ogilvie-Grant 臺灣朱雀 (Chen et Yu, 1984, III:411; Zheng, 1986:263)
別 名：*酒紅朱雀*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(2,000-3,000m 間寒帶林中，特產亞種)。

Coccothraustes coccothraustes coccothraustes (Linnaeus) 錫嘴雀 (Chen et Yu, 1984, III:409)
別 名：*臘嘴雀，老西兒*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(高處，稀見冬候鳥)、東北各省；西伯利亞。冬季移徙華南。

Emberiza aureola aureola 黃胸雀 (Zheng et al., 1981:164)
捕 食 性。
分 佈：福建(武夷山區)。

Emberiza aureeola ornate Shulpin 金鵐 (Chen et Yu, 1984, III:409)
別 名：*黃胸鵐，黃鷗，黃胸雀，寒雀*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(平地農作物中，不普遍冬候鳥及過境鳥)、東北各省；西伯利亞東部。冬季移徙至華南。

Emberiza chrysophrys 黃眉雀 (Zheng et al., 1981:164)
捕 食 性。
分 佈：福建(武夷山區)。

Emberiza cioides Brandt 三道眉草雀 (Chang, 1986:161; Yang et Li, 1989:121)
捕 食：黑絨金龜
步甲
Coleophora dahurica Falkovitsch 落葉松鞘蛾
茶尺蠖。
分 佈：安徽、吉林、東北。

Emberiza cioides castaneiceps Moore 草鵐 (Chen et Yu, 1984, III:410)
捕 食 性。

分 佈：臺灣(偶見，可能迷鳥)、華中、華北、西北各省。

Emberiza elegans elegans Temminck 深色黃眉鵐 (Chen et Yu, 11984, III:410)

別 名：*黃喉鵐，黑月子，黃眉子，深山頰白，峋鵐，黃眉*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(不普遍冬候鳥及過境鳥)、東北；蒙古一帶。冬季移徙西南各省，或韓國、日本各地。

Emberiza elegans ticehursti Sushkin 素色黃眉鵐 (Chen et Yu, 1984, III:410; Yang et Li, 1989:121; Zheng et al., 1981:164)

別 名：*黃喉雀，黃喉鵐*。

捕 食：*Coleophora dahurica* Falkovitsch 落葉松鞘蛾。

分 佈：臺灣(稀見冬候鳥)、福建(武夷山區)、吉林、東北各省，冬季南徙經華北至東南各省。

Emberiza fucata fucata Pallas 赤鵐 (Chen et Yu, 1984, III:410)

別 名：*赤胸鵐，灰頭雀，灰首鵐*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(稀見冬候鳥及過境鳥)、華南、華中、華北、東北各省；西伯利亞東部。冬季南徙華北以南各省。

Emberiza fucata kuatunensis La Touche 赤胸雀 (Zheng et al., 1981:164)

Emberiza fucata kuatunensis La Touche, 1925:

捕 食 性。

分 佈：福建(武夷山區挂墩)。

Emberiza pusilla Pallas 小鵐 (Chen et Yu, 1984, III:410; Su et al., 1986:43; Zheng et al., 1981:164)

別 名：*小雀*。

捕 食：昆蟲。

分 佈：臺灣(稀見冬候鳥，部分過境鳥)、福建(武夷山區)、廣東；歐亞大陸北部，冬季南徙我國全境。

Emberiza rustica Pallas 田雀 (Chang, 1986:161; Zheng et al., 1981:164)

捕 食：茶白毒蛾

主食稻米。

分 佈：福建(武夷山區)、安徽。

Emberiza rutila rutila Pallas 赤鵐 (Chen et Yu, 1984, III:410; Liu et Zhang, 1993, 15(2):89; Zheng et al., 1981:164)

別 名：*栗雀，栗鵐，田鵐，銹鵐，桂色雀，島野路子，鄉鵐，朝鮮野路子*。

捕 食：*Dendrolimus superans* (Butler) 落葉松毛蟲(卵、幼蟲、蛹、成蟲)。

分 佈：臺灣(偶見迷鳥)、福建(武夷山區)、大興安嶺北部；西伯利亞。冬季移徙至華南。

Emberiza schoeniclus Linnaeus 蘆鵐 (Chen et Yu, 11984, III:411)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(桃園)、西北及東北各省；西伯利亞。

Emberiza siemsseni (Martens) 藍雀 (Zheng et al., 1981:165)
Emberiza siemsseni (Martens)
捕 食 性。
分 佈：福建(武夷山區挂墩)。

Emberiza spodocephala spodocephala Pallas 黑臉鵐 (Su et al., 1986:43; Yang et Li, 1989:121; Zheng et al., 1981:164)
別 名：*黑臉灰頭雀，蓬鵐，灰頭鵐，蓬雀，青頭雀*。
捕 食：*Coleophora dahurica* Falkovitsch 落葉松鞘蛾。
分 佈：臺灣(2,600m 以下空曠地區，冬候鳥)、福建(武夷山區)、廣東、長江以南(冬候鳥)、吉林、東北；西伯利亞東部。

Emberiza spodocephala sordida Blyth 灰頭黑臉鵐 (Chen et Yu, 1984, III:410)
別 名：*蓬雀，青頭雀*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(普遍冬候鳥)、西南、華西、西北各省。

Emberiza sulphurata Temminck et Schlegel 野鵐 (Chen et Yu, 1984, III:410)
別 名：*野路子，硫黃鵐*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(平地普遍冬候鳥)、冬季移徙福建、黃東、江蘇各省；日本各地(繁殖)。

Emberiza tristrami 白眉鵐 (Su et al., 1986:44; Zheng et al., 1981:165)
捕 食：昆蟲。
分 佈：福建(武夷山區)、廣東。

Eophona migratoria migratoria 黑尾蠟嘴雀 (Zheng et al., 1981:164)
捕 食 性。
分 佈：福建(武夷山區)。

Eophona personata personata (Temminck et Schlegel) 桑鳲 (Chen et Yu, 1984, III:409; Zheng et al., 1981:164)
別 名：*黑頭蠟嘴雀，錫嘴，老西，三光鳥*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(偶見迷鳥)、冬季南徙福建(武夷山區)；日本(繁殖)。

Eophona migratoria migratoria Hartert 小桑鳲 (Chen et Yu, 11984, III:409)

別 名：*黑尾蠟嘴雀，皂兒。*
捕 食 性。
分 佈：臺灣(800m 以下山區，稀見冬候鳥)、東北；西伯利亞東部。冬季南徙華南。

Fringilla montifringilla Linnaeus 花雀 (Chen et Yu, 1984, III:411; Yang et Li, 1989:121; Zheng et al., 1981:164)
別 名：*花雞，鵉，燕雀，花鵲，虎皮雀。*
捕 食：*Coleophora dahurica* Falkovitsch 落葉松鞘蛾。
分 佈：臺灣(不普遍冬候鳥)、福建(武夷山區)、冬季南徙大陸各地；歐亞大陸北部。

Metophus lathami lathami (Gray) 冠鵐 (Chen et Yu, 1984, III:409; Zheng et al., 1981:165)
別 名：*鳳頭雀，鳳頭鵐，黑頭鵐，連雀夜路子。*
捕 食 性。
分 佈：臺灣(偶見迷鳥)、福建(武夷山區)、東南、西南、華南各省。

Pyrrhula erythaca owstoni Rothschild et Hartert 灰鷽 (Chen et Yu, 1984, III:411; Zheng, 1986:263)
=*Pyrrhula arizanica* Ogilvie-Grant
別 名：*阿里山鷽，赤胸灰雀。*
捕 食 性。
分 佈：臺灣(2,200-3,500m 間針林中，特產亞種)。

Pyrrhula nipalensis ricketti La Touche 褐灰雀 (Zheng et al., 1981:166)
Pyrruhula nipalensis ricketti La Touche, 1905:
捕 食 性。
分 佈：福建(武夷山區挂墩)。

Pyrrhula nipalensis uchidai Kuroda 褐鷽 (Chen et Yu, 1984, III:411; Zheng, 1986:263)
別 名：*褐灰雀，黑田氏鷽。*
捕 食 性。
分 佈：臺灣(1,200-2,300m 間闊葉林中，特產亞種)。

Uragus sibiricus 長尾雀 (Yang et Li, 1989:121)
捕 食：*Coleophora dahurica* Falkovitsch 落葉松鞘蛾。
分 佈：吉林、東北。

Ploceidae 文鳥科

Lonchura atricapilla atricapilla (Vieillot) 黑頸文鳥 (Chen et Yu, 1984, III:401)
捕 食 性。
分 佈：華南。

Lonchura malacca formosana (Swinhoe) 黑頭文鳥 (Chen et Yu, 1984, III:401; Zheng, 1986:263)
別 名：*栗腹文鳥。*

捕食性。
分佈：臺灣(500m 以下草原，特產亞種，普遍留鳥)。

Lonchura punctulata topela (Swinhoe) 斑文鳥 (Chen et Yu, 1984, III:401; Zheng, 1986:263; Zheng et al., 1981:164)
別名：*斑腰文鳥*。
捕食性。
分佈：臺灣、福建(武夷山區)、華南。

Lonchura striata swinhoei (Cabanis) 尖尾文鳥 (Chen et Yu, 1984, III:401; Zheng, 1986:263; Zheng et al., 1981:164)
=*Uroloncha acuticauda* (Hodgson)
=*Uroloncha acuticuda phaethontoptila* Oberholser
別名：*白腰文鳥*，*斑腹文鳥*。
捕食性。
分佈：臺灣(平地極普遍留鳥，尤以西部最多)、福建(武夷山區)、華南。

Passer montanus (Linnaeus) 麻雀 (Chang, 1986:161; Su et al., 1986:43; Xiao et al., 1991:121, 130; Yang et Li, 1989:121)
捕食：蚜蟲
麻皮蝽成蟲和若蟲
步甲
黑絨金龜
Podontia tutea Olivier 漆跳甲
Coleophora dahurica Falkovitsch 落葉松鞘蛾
茶尺蠖
Hyphantia cunea (Drury) 美國白蛾(幼蟲)
Trichiocampus cannabis Xiao et Huang 大麻毛怪葉蜂
Nematus hequensis Xiao 河曲絲葉蜂
蟻
食稻米。
分佈：廣東、安徽、湖北、遼寧、吉林、東北。

Passer montanus bokotoensis Yamashina 澎湖麻雀 (Chen, 1969(2):265)
捕食性。
分佈：臺灣(澎湖)。

Passer montanus saturatus Stejneger 麻雀 (Chen et al., 1993:162; Chen et Yu, 1984, III:400; He, et al., 1991:149; Liu et Zhang, 1993, 15(2):89; Tian et al., 1993, 15(4):155; Zheng, 1986:263; Zheng et al., 1981:164)
=*Passer montanus taivanensis* Harter
=*Passer montanus bokottoensis* Yamashina
別名：*樹麻雀*。
捕食：*Dendrolimus superans* (Butler) 落葉松毛蟲(卵、幼蟲、蛹、成蟲)
Clostera anastomoisis Linnaeus 分月扇舟蛾(幼蟲、成蟲)

Mythimna separata (Walker) 粘蟲
Hyphantia cunea (Drury) 美國白蛾(幼蟲)
Oxya chinensis 中華稻蝗
螻蛄
蜚蠊
植物種子。
分 佈：臺灣(平地普遍留鳥)，幾遍佈全國平原、大興安嶺北部、黑龍江(哈爾濱、海林)，本亞種爲東亞種，分佈于東亞東部；日本。

Passer montanus taivanensis Hartert 臺灣麻雀 (Chen, 1969(2):265)
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Passer monticolus yunnanensis 綠背山雀 (Wang et Liao, 1990:26)
捕 食：*Dendrolimus tehchangensis* Tsai et Liu 德昌松毛蟲。
分 佈：四川。

Passer rutilans rutilans (Temminck) 山麻雀 (Chang, 1986:162; Chen, 1969(2):265; Chen et Yu, 1984, III:400; Xiao, 1985(2):30; Zheng, 1986:263; Zheng et al., 1981:164)
=*Passer rutilans kikuchii* Kuroda
捕 食：象甲
步甲
Dendrolimus tehchangensis Tsai et Liu 德昌松毛蟲(卵期)
稻米。
分 佈：臺灣(500-1,100m 山區，普遍留鳥)、福建(武夷山區)、四川、安徽，華南、西南、華北、西北。

Dicruridae 捲尾科

Dicrurus aeneus braunicanus (Swinhoe) 小捲尾 (Chen, 1969(2):267; Chen et Yu, 1984, III:351; Zheng, 1986:260)
別 名：*古銅色卷尾*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(特產亞種，留鳥)。

Dicrurus hottentottus 發冠捲尾 (Su et al., 1986:41)
捕 食：竹蝗、蟋蟀、蝽科、紅腳綠金龜、花金龜、天牛科幼蟲、鱗翅目幼蟲、膜翅目幼蟲。
分 佈：廣東。

Dicrurus leucophaeus Vieillot 灰捲尾 (Chang, 1986:162; Su et al., 1986:44)
捕 食：蜻蜓
蜉蝣

螟蛾科、尺蛾科、毒蛾科
黃尾毒蛾
大黑金龜
草蛉
銛蜂。
分 佈：廣東、安徽。

Dicrurus leucophaeus leucogenis (Walden) 灰卷尾 (Chen et Yu, 1984, III:351; Liu et al., 1957:47; Zheng et al., 1981:160)
別 名：*白額捲尾鵙*。
捕 食：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲。
分 佈：臺灣(恒春偶見迷鳥)、福建、湖南、東南、西南、華西、華北各省。

Dicrurus macrocercus albiricctus Hodgson 黑捲尾 (Li et Wang, 1979:190-191)
捕 食 性。
分 佈：西藏(錯那)。

Dicrurus macrocercus cathoecus 黑捲尾 (Li et Wang, 1979:191; Su et al., 1986:44; Zheng et al., 1981:160)
捕 食：蜻蜓、螻蛄等。
分 佈：福建、廣東、我國南部及東南部各省。

Dicrurus macrocercus harterti (Stuart Baker) 黑捲尾 (Chen, 1969(2):267; Tsai et al., 1979:49; Zheng, 1986:260)
=*Buchanga atra* (Harmann)
別 名：*釋卷尾，大卷尾*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(常見於農田中、電線上或牛背上，特有亞種)。

Sturnidae 椋鳥科(八哥科)

Acridotheres cristatellus cristatellus (Linnaeus) 八哥 (Chang, 1986:162; Chen et al., 1993:161; Su et al., 1986:41; Zheng et al., 1981:160)
捕 食：土蝗
非洲螻蛄
葉蟬
蝽
步甲
茶葉象甲
小蠹蟲
茶刺蛾
蜘蛛
蛙

稻米。
分 佈：臺灣、福建、廣東、安徽。

Acridotheres cristatellus formosanus (Hartert) 八哥 (Chen et Yu, 1984, III:354; Zheng, 1986:260)
別 名：*加令，鸚鴿，秦古了，了哥、華化、八八鳥*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(全省，特有亞種，留鳥，東部較少，飼養能習人語)。

Acridotheres tristis tristis (Linnaeus) 家八哥(指名亞種) (Chen et Yu, 1984, III:353; Tang, 1987:235)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(臺北，宜蘭)、福建(閩南、閩東地區)；東南半島、泰國以東各地，曾被引入世界各地。

Sturnus cineraceus Temminck 灰椋鳥 (Chen et Yu, 1984, III:354; Tang, 1991:53; Zheng et al., 1981:160)
別 名：*椋鳥，管蓮子，大椋鳥，白頭翁，竹雀*。
捕 食：松毛蟲
地下害蟲。
分 佈：臺灣(尚稱普遍冬候鳥，東部較多)、福建、華北、西北、東北各省；西伯利亞東部，冬季徙華南。

Sturnus nigricollis (Paykull) 黑領椋鳥 (Chen et Yu, 1984, III:354)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(臺北五股一帶)、東南各省(留鳥)；中南半島、馬來亞、泰國。

Sturnus philipppensis (Forster) 小椋鳥 (Chen et Yu, 1984, III:354)
=*Motacilla sturnia violacea* Boddaert
別 名：*紫背椋鳥*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(不普遍過境鳥，東部及蘭嶼較多)、福建、浙江、江蘇。

Sturnus roseus (Linnaeus) 粉紅椋鳥 (Li et al., 1975:71-77; Yu, 1988:68-70; 1988:155-159)
捕 食：*Calliptamus italicus italicus* 意大利蝗
Dociostaurus kraussi kraussi 紅脛戟紋蝗
Gomphocerus sibiricus 西伯利亞蝗
Oedaleus decorus 黑條小車蝗
Ramburiella turcomana 十庫曼蝗
Stauroderus scalaris scalaris 腫脈蝗。
分 佈：新疆。

Sturnus sericeus (Gmelin) 絲光掠鳥 (Chang, 1986:162)
捕 食：茶捲葉蛾
栗舟蛾

青翅羽衣
蟻
蜘蛛。
分 佈：安徽。

Sturnus sinensis (Gmelin) 噪林鳥 (Chen et Yu, 1984, III:354)
別 名：*灰背椋鳥*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(不甚普遍冬候鳥，南部較多)、東南、西南各省。

Sturnus sturninus (Pallas) 北椋鳥 (Chen et Yu, 1984, III:354)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(臺中、基隆，可能迷鳥)、海南、廣東(過境鳥)。

Sturnus vulgaris porphyronotus Sharpe 紫翅椋鳥 (Yu, 1988:68)
捕 食：*Calliptamus italicus italicus* 意大利蝗
Dociostaurus kraussi kraussi 紅脛戟紋蝗
Gomphocerus sibiricus 西伯利亞蝗
Oedaleus decorus 黑條小車蝗
Ramburiella turcomana 土庫曼蝗
Stauroderus scalaris scalaris 腫脈蝗。
分 佈：新疆。

Oriolidae 黃鸝科

Oriolus chinensis diffusus Sharp 黃鸝 (Chen et Yu, 1984, III:350; Liu et al.,1957:48; Su et al., 1986:40; Tsai et al., 1979:49; Tsou et al., 1990:81; Zhang et Zhou, 1996, 18(4):184; Zheng, 1986:260; Zheng et al., 1981:160)
=*Oriolus indicus* Jerdon
別 名：*黑枕黃鸝，高麗黃鳥，鵹黃，黃伯勞，鶬鶊，青鳥，金鶯，黃鶯，黃鸝*。
捕 食：蝗蟲
金龜
天蛾幼蟲
Dendrolimus punctatus (Walker) 馬尾松毛蟲
Diprion liuwanensis 六萬松葉蜂(幼蟲)。
分 佈：臺灣(較稀見留鳥，東南部較多)、福建、湖南、廣東、安徽、山東、西南、西北、內蒙古、東北各省；日本、西伯利亞東部。

Oriolus mellianus 鵲色黃鸝 (Su et al., 1986:41)
捕 食：燈蛾科及其它鱗翅目幼蟲。
分 佈：廣東。

Oriolus traillii ardens (Swinhoe) 朱鸝 (Chen et Yu, 1984, III:351; Tsou et al., 1990:83; Zheng, 1986:260)

別 名：*大緋鳥，緋衣，紅鶯*。
捕 食：以昆蟲爲主食。
分 佈：臺灣(不普遍留鳥，1,000m 闊葉林地區較易發現，特有亞種)。

Oriolus xanthornus xanthornus (Linnaeus) 黑頭黃鸝 (Chen et Yu, 1984, III:350)
捕 食 性。
分 佈：雲南；印度。

Corvidae 鴉科

Cissa caerulea (Gould) 臺灣藍鵲 (Chen et Yu, 1984, III:357; Tsou et al., 1990:73; Zheng, 1986:260)
=*Urocissa caeerulea* (Gould)
別 名：*長尾山娘，山娘，山姬，紅嘴山鵲，長尾陣*。
捕 食：雜食性，種子、昆蟲、其他小鳥。
分 佈：臺灣(1,000m 低海拔的闊葉林中，特有種)。

Cissa erythrorhyncha erythrorhyncha 紅嘴藍鵲 (Su et al., 1986:41; Tang, 1991:53;Tang et al., 1990:180-186; Zheng et al., 1981:161)
別 名：*山喜鵲，長尾藍鵲*。
捕 食：蜻蜓、蜚蠊、蝗蟲、螻蛄、螽蟴、螳螂、獵蝽科、袋蛾、天蛾、松毛蟲、松毒蛾、刺蛾、燈蛾、金龜、葉甲、天牛、叩頭蟲等 30 多種害蟲、雙翅目、蜂類。
分 佈：臺灣、我國東半部，自海南至華北，福建、廣東、雲南、四川、浙江。

Corvus frugilegus pastinator Gould 禿鼻鴉 (Chen et Yu, 1984, III:357)
別 名：*深山鴉，山烏，山老公，老鴰，風鴉*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(西部各地，稀見冬候鳥)、華西、華北、東北各省；西伯利亞東部。

Corvus macrorhynchus colonorum Swinhoe 巨嘴鴉 (Chen et Yu, 1984, III:357; Su et al., 1986:41; Yan et al., 1996:500)
別 名：*大嘴烏鴉，土老鴉，巨嘴烏鴉*。
捕 食：鱗翅目幼蟲、鼠屬的下頷骨。
分 佈：臺灣(普遍留鳥，1,000m 以上山區較多)、西藏西南部、南部經青海、甘肅至東北的東南大部分地區及海南的(留鳥)。
附 註：我國有 4 亞種。

Corvus monedula dauuricus Pallas 寒鴉 (Chen et Yu, 1984, III:356)
別 名：*燕烏，慈烏，小寒鴉兒，鴰鴨，鸒，小山鴰，侉老鴰，麥鴉，小白頸鴉*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(偶見迷鳥)、西北、東北各省；西伯利亞，冬季移徙華南。

Corvus torquatus Lesson 玉頸鴉 (Chen et Yu, 1984, III:357; Su et al., 1986:41; Yan et al., 1996:502)

別 名：*白頸鴉，頸輪鴉，帶領鴉，白脖鴉，白脖老鴰*。

捕 食：鼠的殘體。

分 佈：臺灣(迷鳥)、海南、廣東至貴州、經甘肅南部至遼寧南部及東南廣大地區(留鳥)。

Crypsirina formosae formosae (Swinhoe) 臺灣樹鵲 (Chen et Yu, 1984, III:357; Su et al., 1986:41)

別 名：*灰樹鵲*。

捕 食：蝽、葉甲、小蠹科、夜蛾科和其它鱗翅目幼蟲、樹籽。

分 佈：臺灣(自平地至 1,200m 森林中)、廣東。

Cyanopica cyarra interposita Hartert 灰喜鵲 (Chang, 1986:162; Chen et al., 1993:160; Dai, 1992:41; Hu, 1991:185; Shu et Yu, 1985:93; Tian et al., 1993, 15(4):155; Tsai et al., 1979:49; Xiao, 1985(2):29; Zhang et Zhou, 1996, 18(4):184)

捕 食：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲

Clostera anastomosis Linnaeus 分月扇舟蛾(幼蟲)

茶尺蠖

油桐尺蠖

茶刺蛾

綠刺蛾

茶袋蛾

Eumeta variegata (Snellen) 大袋蛾

Hyphantia cunea (Drury) 美國白蛾(幼蟲)

大黑金龜

非洲螻蛄

步甲

瓢蟲

螳螂

虎甲

松毛蟲(幼蟲期)

Gilpinia massoniana 馬尾松吉松葉蜂(幼蟲)

Neodiprion dailingensis 帶嶺新松葉蜂(幼蟲)

Neodiprion xianyunicus 祥雲新松葉蜂(幼蟲)

蜘蛛

植物種子。

分 佈：江蘇、安徽、山東、遼寧、黑龍江(海林)。

Garrulus glandarius brandtii 松鴉 (Su et al., 1986:41; Tian et al., 1993, 15(4)::155; Yan et al., 1996:492)

別 名：*橿鳥*。

捕 食：*Clostera anastomosis* Linnaeus 分月扇舟蛾(幼蟲、成蟲)

鱗翅目昆蟲。

分 佈：臺灣往西至雲南西部、經四川至甘肅中部、沿內蒙南部至東北的古黑龍江(海

林)的東南大部分地區。留鳥。
附 註：我國有 8 亞種。

Garrulus glandarius formosanus 松鴉 (Yan et al., 1996:492; Zheng, 1986:260)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(特產亞種)。

Garrulus glandarius taivanus Gould 臺灣橿鳥 (Chen et Yu, 1984, III:357)
別 名：*松鴉*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(2,000m 上下森林中，尚稱普遍，特有亞種)。

Nucifraga caaryocatactes owstoni Ingram 臺灣星鴉 (Chen et Yu, 1984, III:357)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(2,000m 上下森林中，尚稱普遍留鳥，特有亞種)。

Oenanthe deserti (Temminek) 漠即鳥 (Yu, 1988:68)
捕 食：*Calliptamus italicus italicus* 意大利蝗
Dociostaurus kraussi kraussi 紅脛戟紋蝗
Gomphocerus sibiricus 西伯利亞蝗
Oedaleus decorus 黑條小車蝗
Ramburiella turcomana 土庫曼蝗
Stauroderus scalaris scalaris 腫脈蝗。
分 佈：新疆。

Paradoxornis webbianus 棕頭鴉雀 (Dai, 1992:41)
別 名：*紅嘴鸚嘴*。
捕 食：*Toxoptera aurantii* Boyer et Fonscolombe 茶二叉蚜
昆蟲、植物、種子。
分 佈：臺灣、雲南東南、貴州、四川、甘肅南部、陝西、山西、河北、內蒙古東南、遼寧、吉林、黑龍江南部以及東南沿海各省的廣大地區(留鳥)。

Pica pica sericea (Linnaeus) 喜鵲 (Chang, 1986:162; Liu et Zhang, 1993, 15(2):89; Shu et Yu, 1985:93; Su et al., 1986:41; Tsou et al., 1990:71; Xiao et al., 1991:130; Zheng et al., 1981:161)
別 名：*飛駁鳥，乾鵲，神女，四喜鵲*。
捕 食：蝗蟲
非洲螻蛄
蟬
銅綠金龜
步甲
Dendrolimus superans (Butler) 落葉松毛蟲(卵、幼蟲、蛹、成蟲)
Hyphantia cunea (Drury) 美國白蛾(幼蟲)

Diprion liuwanensis 六萬松葉蜂(幼蟲)
Neodiprion dailingensis 帶嶺新松葉蜂(幼蟲)
Neodiprion guangxiicus 廣西新松葉蜂 (幼蟲)
Neodiprion xianyunicus 祥雲新松葉蜂(幼蟲)
Nematus hequensis Xiao 河曲絲葉蜂
蜘蛛
蛙
稻米。

分 佈：臺灣(不普遍留鳥)、福建、廣東、安徽、華南、西南、華北、西北諸省、遼寧、大興安嶺北部。

Pyrrhocorax pyrrhocorax 紅嘴山鴉 (Yu, 1988:68)

捕 食：*Calliptamus italicus italicus* 意大利蝗
Dociostaurus kraussi kraussi 紅脛戟紋蝗
Gomphocerus sibiricus 西伯利亞蝗
Oedaleus decorus 黑條小車蝗
Ramburiella turcomana 土庫曼蝗
Stauroderus scalaris scalaris 腫脈蝗

分 佈：新疆。

MAMMALIA 哺乳綱

INSECTIVORA 食蟲目

(Chen et Yu, 1984, III:451-456)

Erubaceidae 刺猬科

Erindceus hdnensis Matschie 刺猬 (Chen et al., 1993:162)

捕 食：地下昆蟲、小動物
捕 食 性。

Talpidae 鼴鼠科

Mogera insularis (Swinhoe) 臺灣鼴鼠 (Chen et Yu, 1984:455)

Mogera insularis (Swinhoe)
別 名：*穿地鼠*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(平地至 500 公尺)。

Mogera insularis latouchei Thomas 華南缺齒鼴(華南亞種) (Zhan, 1994:143; Zhou, 1997:257)

捕 食 性。
分 佈：福建。

Talpa micrura longirostris Milne-Edwards 長吻鼴 (Hong, 1981:113; Hong, 1981:174)

Talpa micrura longirostris Milne-Edwards

捕 食 性。

分 佈：福建。

Soricidae 鼩鼱科(尖鼠科)

Chimmarogale himalayica Gray 喜馬拉雅水麝鼩 (Zhou, 1997:257)

捕 食 性。

分 佈：福建。

Chimmarogale platycephala leander Thomas 喜馬拉雅水麝鼱(福建亞種)(Hong, 1981:113; Hong, 1981:174)

Chimmarogale platycephala leander Thomas, 1902:

別 名：*福建水麝鼩(福建亞種)*。

捕 食 性。

分 佈：福建。

Crocidura attenuata attenuata Milne-Edwards 灰麝鼩(指名亞種) (Hong, 1981:113; Hong, 1981:174; Zhan, 1995:143; Zhou, 1997:257 Zong et al., 1999, 26(4):371-375)

Crocidura attenuata Milne-Edwards, 1872:

棲 息：農田。

捕 食 性。

分 佈：福建、四川。

Crocidura dracula grisescens A. B. Howell 長尾大麝鼱(福建亞種)(Hong, 1981:113; Hong, 1981:174; Zhan, 1995:143; Zhou, 1997:257)

Crocidura dracula grisescens A. B. Howell, 1928:

別 名：*白尾梢麝鼩*。

捕 食 性。

分 佈：福建。

Suncus marinus Linnaeus 臭鼩 (He, et al., 1991:149; Hong, 1981:113; Hong, 1981:174; Zhang et Li, 1982:228; Zhou, 1997:257)

別 名：*臭鼩鼱*。

捕 食：稻蟲

Odontotermes formosanus Shiraki 黑翅土白蟻。

分 佈：福建、廣東、雲南、浙江等地。

Suncus marinus marinus Swinhoe 臭鼱(指名亞種) (Zhan, 1995:143)

捕 食 性。

分 佈：福建。

四川短尾鼩 (Zong et al., 1999, 26(4):371-375)
棲 息：農田。
捕 食 性。
分 佈：四川。

CHIROPTERA 翼手目

(Chen et Yu, 1984, iii:457-469; Cheng, 1981, 8(1):26)

Megadermatidae 假吸血蝠科

Megaderma lyra sinensis Anderson 假吸血蝠(華南亞種) (Zhan, 1995:144; Zhou, 1997:257)
捕 食 性。
分 佈：福建。

Hipposideridae 蹄蝠科(葉鼻蝠科)

Coelops frithi formosanus Horikawa 無尾蹄蝠 (Chen et Yu, 1984, III:466)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(全省各地)。

Caelops frithi inflatus Miller 無尾蹄蝠(福建亞種) (Chen, 1969(2):359; Zhan, 1995:144; Zhou, 1997:257)
Caelops frithi inflatus Mille
別 名：*無尾岩鼻蝠*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(高雄)、福建。

Coelops inflata Miller 褐毛臉蹄蝠 (Zheng, 1987:238)
捕 食 性。
分 佈：福建。

Eptesicus horikawai Kishida 堀川氏蝙蝠 (Chen et Yu, 1984, III:468)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(臺中、花蓮、臺北)。

Eptesicus serotinus (Buechner) 棕蝙蝠 (Chen et Yu, 1984, III:468)
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Hipposideros armiger (Hodgson) 大蹄蝠 (He, et al., 1991:150)
捕 食：*Nephotettix virescnes* (Distant) 黑尾葉蟬
Cnaphalocrocis medinalis Guenée 稻縱捲葉螟
Sesamia inferens (Walker) 大螟

Naranga aenescens Moore　稻螟蛉
稻癭蚊。
分 佈：雲南。

Hipposideros armiger fujianensis Zheng　普通蹄蝠(福建亞種) (Zheng, 1987:238)
Hipposideros armiger fujianensis Zheng, 1987:239-241.
捕 食 性。
分 佈：福建。

Hipposideros armiger swinhoei (Peters)　普通蹄蝠(瑞氏亞種) (Zhan, 1995:144; Zheng, 1987:238; Zhou, 1997:257)
別 名：*大蹄蝠(福建亞種)*。
捕 食 性。
分 佈：福建。

Hipposideros armiger terasensis Kishida　臺灣蹄鼻蝠 (Chen, 1969(2):359; Chen et Yu, 1984, III:466)
Hipposideros armiger terasensis Kishida
別 名：*臺灣葉鼻蝠*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(屏東、南投、臺北)。

Hipposideros bicolor Temminck　雙色蹄蝠 (Zhan, 1995:144; Zhou, 1997:257)
別 名：*小馬蹄蝠*。
捕 食 性。
分 佈：福建。

Hipposideros bicolor fulvus **Gray**　二色鼻蝠 (Chen, 1969(2):359; Chen et Yu, 1984, III:466)
Hipposideros bicolor fulvus Gray
別 名：*二色葉鼻蝠*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(基隆岩洞內)。

Hipposideros gentilis sinensis Andersen　小蹄蝠 (Zheng, 1987:238)
捕 食 性。
分 佈：福建。

Hipposideros praffi praffi Thomas　普氏蹄蝠(指名亞種) (Zhan, 1995:144; Zheng, 1987:238; Zhou, 1997:257)
別 名：*雙葉啼蝠*。
捕 食 性。
分 佈：福建。

Vespertilionidae 蝙蝠科

Eptesicus andersoni (Dobson) 安氏棕蝠 (Zhan, 1995:144; Zheng, 1987:239)
別 名：*大棕蝠(雲南亞種)*。
捕 食 性。
分 佈：福建。

Eptesicus horikawai Kishida 堀川氏蝙蝠 (Chen, 1969(2):361)
Eptesicus horikawai Kishida
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Eptesicus serotinus andersoni (Dobson) 棕蝠(雲南亞種) (Zhou, 1997:258)
捕 食 性。
分 佈：福建。

Harpiocephalus harpia harpia (Temminck) 大管鼻蝠 (Chen, 1969(2):361; Chen et Yu, 1984, III:469)
Harpiocephalus harpia harpia (Temminck)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(臺中)。

Kerivoula hardwickii depressa (Miller) 管耳蝠 (Zhan, 1995:145; Zheng, 1987:239; Zhou, 1997:258)
別 名：*哈氏彩蝠(華南亞種)*。
捕 食 性。
分 佈：福建。

La longimana Pen 長翅南蝠 (He, et al., 1991:150)
捕 食：*Nephotettix virescens* (Distant) 黑尾葉蟬
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟
Sesamia inferens (Walker) 大螟
Naranga aenescens Moore 稻螟蛉
稻癭蚊。
分 佈：雲南。

Miniopterus schreibersii Kuhl 長翅蝠 (He, et al., 1991:150)
別 名：*折翼蝠*。
捕 食：*Nephotettix virescens* (Distant) 黑尾葉蟬
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟
Sesamia inferens (Walker) 大螟
Naranga aenescens Moore 稻螟蛉
稻癭蚊。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽。

Miniopterus schreibersii blepotis (Temminck) 爪哇褶翅蝠 (Chen, 1969(2):361; Chen et Yu, 1984, III:468)

Miniopterus schreibersii blepotis (Temminck)
=*Miniopterus fuscus* Bonhote
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Miniopterus schreibersii fuliginosus (Hodgson) 褶翅蝠 (Chen, 1969(2):361; Chen et Yu, 1984, III:468; Zhan, 1995:145; Zhou, 1997:258)
Miniopterus schreibersii fuliginosus (Hodgson)
=*Miniopterus schreibeersii* Thomas
別 名：*長翼蝠(華南亞種)*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(全省各地)、福建。

Miniopterus schreibersii prvipes G. M. Allen 折翼蝠 (Zheng, 1987:239)
捕 食 性。
分 佈：福建。

Murina futa Kishida 管鼻蝠 (Chen, 1969(2):361)
Murina futa Kishida
捕 食 性。
分 佈：臺灣(臺中)。

Murina huttoni rubella Thomas 赤管鼻蝠 (Zhan, 1995:145; Zheng, 1987:239; Zhou, 1997:258)
別 名：*中管鼻蝠(福建亞種)*。
捕 食 性。
分 佈：福建。

Murina leucogaster leucogaster (Milne-Edward) 白腹管鼻蝠 (Zhan, 1995:145: Zheng, 1987:239; Zhou, 1997:258)
捕 食 性。
分 佈：福建。

Myotis adversus taiwanensis A. C. Linde 臺灣鬆蝠 (Chen, 1969(2):360; Chen et Yu, 1984, III:467)
Myotis adversus taiwanensis A. C. Linde
捕 食 性。
分 佈：臺灣(南部)。

Myotis altarium Thomas 西南鼠耳蝠 (Zheng, 1987:238)
捕 食 性。
分 佈：福建。

Myotis capaccinii Bonaparts 櫛鼠耳蝠 (He, et al., 1991:150)
=*Myotis fimbriatus*
別 名：*櫛足鼠耳蝠*。

捕 食：*Nephotettix virescens* (Distant) 黑尾葉蟬
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟
Sesamia inferens (Walker) 大螟
Naranga aenescens Moore 稻螟蛉
稻癭蚊。
分 佈：福建、江西、雲南、浙江、江蘇、安徽。

Myotis capaccinii fumbriartus (Peter) 櫛鼠耳蝠 (Zhou, 1997:257)
捕 食 性。
分 佈：福建。

Myotis chinensis (Thomas) 中華鼠耳蝠 (Zheng, 1987:238)
捕 食 性。
分 佈：福建。

Myotis doubentoi laniger (Oeters) 水鼠耳蝠(華南亞種) (Zhan, 1995:144)
捕 食 性。
分 佈：福建。

Myotis fimbriatus (Peters) 毛腿鼠耳蝠 (Zhan, 1995:144; Zheng, 1987:238)
別 名：*櫛鼠耳蝠*。
捕 食 性。
分 佈：福建。

Myotis formosus rufoniger (Thomas) 麗鼠耳蝠 (Zhan, 1995:144; Zheng, 1987:238; Zhou, 1997:257)
別 名：*徘鼠耳蝠(華南亞種)*。
捕 食 性。
分 佈：福建。

Myotis formosus watasei Kishida 渡瀨氏髭蝠 (Chen, 1969(2):360; Chen et Yu, 1984, III:467)
Myotis formosus watasei Kishida
=*Myotis flavus* Shamel
捕 食 性。
分 佈：臺灣(好食龍眼)。

Myotis frater frater (G. M. Allen) 長尾耳蝠(福建亞種) (Zhan, 1995:144; Zheng, 1987:238; Zhou, 1997:257)
別 名：*長脛鼠耳蝠*。
捕 食 性。
分 佈：福建。

Myotis laniger (Petes) 小鼠耳蝠 (He, et al., 1991:150; Zheng, 1987:238)
捕 食：*Nephotettix virescens* (Distant) 黑尾葉蟬

Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟
Sesamia inferens (Walker) 大螟
Naranga aenescens Moore 稻螟蛉
稻癭蚊。
分 佈：福建、雲南。

Myotis muricola latirostris Kishida 寬吻髭蝠 (Chen, 1969(2):360)
Myotis muricola latirostris Kishida
捕 食 性。
分 佈：臺灣(太平山、阿里山 1500m. 高山中)。

Myotis myotis chinensis (Thomas) 大鼠耳蝠(華南亞種) (Zhan, 1995:144; Zhou, 1997:257)
捕 食 性。
分 佈：福建。

Myotis mystacinus latirostris Kishida 寬吻髭蝠 (Chen et Yu, 1984, III:467)
=*Myotis muricola orii*
捕 食 性。
分 佈：臺灣(阿里山 1,500m 高山中、太平山)。

Myotis mystacinus moupinensis (Milne-Edwards) 須鼠耳蝠(四川亞種) (Zheng, 1987:238; Zhou, 1997:257)
別 名：*小鼠耳蝠*。
捕 食 性。
分 佈：福建、四川。

Myotis mystacinus mystacinus (Kuhl) 須鼠耳蝠 (Zheng, 1987:238)
捕 食 性。
分 佈：福建。

Myotis siligorensis sowerbyi (Howell) 高顱鼠耳蝠(華南亞種) (Zhan, 1995:144; Zhou, 1997:257)
捕 食 性。
分 佈：福建。

Myotis vickettii Thomas 大足鼠耳蝠 (He, et al., 1991:150)
捕 食：*Nephotettix virescens* (Distant) 黑尾葉蟬
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟
Sesamia inferens (Walker) 大螟
Naranga aenescens Moore 稻螟蛉
稻癭蚊。
分 佈：雲南。

Nyctalus noctula Schreber 夜蝠 (Chen et Yu, 1984, III:467)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(屏東，南投)。

Nyctalus noctula velutinus G. M. Allen 絨山蝠 (Zhan, 1995:144; Zheng, 1987:239; Zhou, 1997:258)
別 名：*山蝠(福建亞種)*。
捕 食 性。
分 佈：福建。

Pickettia pillosa (Peter) 大足蝠 (Zhan, 1995:144)
捕 食 性。
分 佈：福建。

Pipistrellus abramus abramus (Temminck) 家蝠 (Chen, 1969(2):361; Chen et Yu, 1984, III:467; He, et al., 1991:150; Zhan, 1995:145; Zheng, 1987:238; Zhang et Li, 1982:228; Zhou, 1997:258)
別 名：*普通蝙蝠，家蝙蝠，普通伏翼*。
捕 食：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲
Odontotermes formosanus Shiraki 黑翅土白蟻。
分 佈：臺灣(全省，棲家屋中)、福建、浙江、全國各省區廣佈。

Pipistrellus pipistrellus (Schreber) 歐洲家蝠 (Chen, 1969(2):361; Chen et Yu, 1984, III:468)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(北部有捕獲)；亞、歐洲廣分佈種類。

Pipistrellus pipistrellus tramatus (Thomas) 伏翼(華南亞種) (Zhan, 1995:144; Zhou, 1997:258)
捕 食 性。
分 佈：福建。

Pipistrellus pulveratus (Peters) 灰伏翼 (Zhan, 1995:145; Zheng, 1987:238; Zhou, 1997:258)
捕 食 性。
分 佈：福建。

Pipistrellus tralatitius pumilcider Tomes 蝙蝠 (Chen et al., 1993:163)
捕 食：蚊、夜蛾科、鞘翅目、雙翅目。
捕 食 性。

Pipistrellus tralatitius tramatus Thomas 印度伏翼 (Zheng, 1987:238)
捕 食 性。
分 佈：福建。

Ricketlia pilosa (Peters) 大足蝠 (Zheng, 1987:238; Zhou, 1997:257)
捕 食 性。

分 佈：福建。

Scotophilus heathi insular (Allen) 大黃蝠(華南亞種) (Zhan, 1995:145; Zhou, 1997:258)
捕 食 性。
分 佈：福建。

Scotomanes ormatus sinensis Thomas 中華斑蝠 (Zheng, 1987:239)
捕 食 性。
分 佈：福建。

Scotophilus temminckii consobrinus (J. A. Allen) 高頭蝙蝠 (Chen, 1969(2):361; Chen et Yu, 1984, III:468; Zheng, 1987:239; Zhou, 1997:258)
Scotophilus temminckii consobrinus J. A. Allen
=*Pachyotus kuhii* (Leach)
別 名：*黃蝠，小黃蝠(華南亞種)*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(臺東、澎湖、臺中)、福建。

Scotozus dormeri dormeri (Dobson) 臺中家蝠 (Chen, 1969(2):361; Chen et Yu, 1984, III:468)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(臺中)。

Vespertilio orintalis Wallin 東方食蟲蝠 (Chen et Yu, 1984, III:468)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(臺中)。

Vespertilio urinus superans (Thomas) 東方蝙蝠 (He, et al., 1991:150; Zhan, 1995:144; Zheng, 1987:239; Zhou, 1997:257)
別 名：*小家蝠*。
捕 食：*Mythimns separata* (Walker) 粘蟲。
分 佈：福建。

Rhinolophidae 菊頭蝠科

Rhinolophus affinis macrurus Andersen 中菊頭蝠(東南亞種) (Zhan, 1995:144; Zheng, 1987:237; Zhou, 1997:257)
別 名：*中菊頭蝠*。
捕 食 性。
分 佈：福建。

Rhinolophus blythi calidus G. M. Allen 小菊頭蝠(福建亞種) (Zhan, 1995:144; Zheng, 1987:237; Zhou, 1997:257)
捕 食 性。

分 佈：福建。

Rhinolophus cornutus pumilus Andersen 角菊頭蝠(華南亞種) (Zhan, 1995:144; Zheng, 1987:237; Zhou, 1997:257)

捕 食 性。

分 佈：福建。

Rhinolophus episcopus caldwelli G. M. Allen 大耳菊頭蝠 (Zheng, 1987:237)

捕 食 性。

分 佈：福建。

Rhinolophus ferrumequinum Hodgson 馬鐵菊頭蝠 (He et al., 1991:151; Zhou, 1997:257)

捕 食：*Nephotettix virescens* (Distant) 黑尾葉蟬
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟
Sesamia inferens (Walker) 大螟
Naranga aenescens Moore 稻螟蛉
稻癭蚊。

分 佈：福建、雲南。

Rhinolophus ferrumequinum nippon Temminck 馬鐵菊頭蝠(日本亞種) (Zhan, 1995:144; Zheng, 1987:237)

別 名：*馬鐵菊頭蝠*。

捕 食 性。

分 佈：福建。

Rhinolophus lanosus lanosus Andersen 絨菊頭蝠 (Zheng, 1987:238)

捕 食 性。

分 佈：福建。

Rhinolophus lepidus Blyth 麗菊頭蝠 (Zheng, 1987:237)

捕 食 性。

分 佈：福建。

Rhinolophus luctus formosae Sanborn 臺灣大蹄鼻蝠 (Chen, 1969(2):359; Chen et Yu, 1984, III:465)

Rhinolophus luctus formosae Sanborn

別 名：*臺灣菊頭蝠*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Rhinolophus luctus lanosus Andersen 大菊頭蝠(福建亞種) (Zhan, 1995:144; Zhou, 1997:257)

捕 食 性。

分 佈：福建。

Rhinolophus macrotis calduelli Allen 大耳菊頭蝠(福建亞種) (Zhan, 1995:144; Zhou, 1997:257)

捕 食 性。

分 佈：福建。

Rhinolophus monoceros K. Andersen 臺灣小蹄鼻蝠 (Chen, 1969(2):359; Chen et Yu, 1984, iII:465)

Rhinolophus monoceros K. Andersen

別 名：*單角菊頭蝠*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(特有種)。

Rhinolophus pearsoni Horsfield 皮氏菊頭蝠 (He, et al., 1991:151)

捕 食：*Nephotettix virescens* (Distant) 黑尾葉蟬

Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟

Sesamia inferens (Walker) 大螟

Naranga aenescens Moore 稻螟蛉

稻癭蚊。

分 佈：福建、江西、湖南、廣西、雲南、四川、浙江、安徽。

Rhinolophus pearsonii chinensis Andersen 皮氏菊頭蝠(福建亞種) (Zhan, 1995:144; Zheng, 1987:237; Zhou, 1997:257)

捕 食 性。

分 佈：福建。

Rhinolophus rex Allen 四川菊頭蝠 (He, et al., 1991:151)

捕 食：*Nephotettix virescens* (Distant) 黑尾葉蟬

Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟

Sesamia inferens (Walker) 大螟

Naranga aenescens Moore 稻螟蛉

稻癭蚊。

分 佈：雲南、四川。

Rhinolophus rouxi sinicus Andersen 魯氏菊頭蝠(安徽亞種) (Zhan, 1995:144; Zheng, 1987:237; Zhou, 1997:257)

Rhinolophus rouxi sinicus Andersen

捕 食 性。

分 佈：福建。

Molossidae 皺鼻蝠科

Tadarida teniotis insignis (Blyth) 皺鼻蝠 (Chen, 1969(2):361; Chen et Yu, 1984, III:469; Zhan, 1995:144; Zheng, 1987:239; Zhou, 1997:257)

Tadarida teniotis insignis (Blyth)

別 名：*皺唇蝠(福建亞種)*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建。

PHOLIDOTA 鱗甲目

Manidae 鯪鯉科(穿山甲科)

Manis aurita Hodgson 鯪鯉 (Chen et Yu, 1984:475)
捕 食 性。
分 佈：臺灣、華南；緬甸。

Manis pentadactyla dalmanni Sundevall 華南鯪鯉 (Chen et Yu, 1984, III:474)
Manis pentadactyla dalmanni Sundevall
捕 食 性。
分 佈：華南。

Manis pentadactyla pentadactyla Linneus 臺灣鯪鯉 (Chen et Yu, 1984, III:474, 475)
Manis pentadactyla pentadactyla Linneus
別 名：*穿山甲*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(山麓至 1,000 公尺)。

Manis pusilla J. A. Allen 海南鯪鯉 (Chen et Yu, 1984, III:474)
Manis pusilla J. A. Allen
捕 食 性。
分 佈：海南。

RODENTIA 嚙齒目

Petauristidae 鼯鼠科

Crocidura dracula 長尾大麝鼩 (Zhang et Zhou, 1996, 18(4):184)
捕 食：會澤新松葉蜂(繭)。
分 佈：

Muridae 鼠科

Apodemus agrarius (Pallas) 黑線姬鼠 (Chen et Yu, 1984, iII:486; Feng et al., 1994, 10(3):142)
Mus agrarius Pallas, 1771:454.
別 名：*臺灣背條鼠，黑條鼠，田姬鼠*。
捕 食：*Oxya chinensis* 中華稻蝗(卵)。
分 佈：臺灣、山西。

附 註：11 亞種，中國有 5 亞種。

Apodemus agrarius insulaemus Tokuda 臺灣田姬鼠 (Huang et al., 1995:126)
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

CARNIVORA 食肉目

Canidae 犬科(狗)

Canis familiaris 家犬 (Jiang, 1990:164)
捕 食：*Dendrolimus spectabilis* Butler 赤松毛蟲(成蟲)。
分 佈：全國。

Mustelidae 貂科(鼬科)

Martes flavigula Boddaert 青鼬 (Zhan, 1981:168; Zhou, 1997:258)
Martes flavigula Boddaert
捕 食：鼠。
分 佈：福建、吉林。

Martes flavigula chrysospila Swinhoe 黃喉貂 (Chen et Yu, 1984, III:505)
=*Martes flavigula* var. *xanthospila* Swinhoe
別 名：*黃葉貓，黃頸鼬*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(全省山地，山麓至 2,000m 地區)

Mustela sibirica Pallas 黃鼬 (Chen et al., 1993:163)
別 名：*黃鼠狼*。
捕 食：林間鼠類、小動物、昆蟲。
分 佈：臺灣、華北以南地區。

Mustela sibirica davidiana (Milne-Edwards) 華南鼬鼠 (Chen et Yu, 1984, III:505)
=Helictis subaurantiaca Swinhoe
=Helictis subaurantiaca modesta Thomas
別 名：*鯛鰍貓，小豚貓，田螺狗*。
捕 食：昆蟲、小鳥、小獸。
分 佈：臺灣(臺中埔里，平地至山麓)。

Viverridae 靈貓科

Herpestes clrva Hodgson 食蟹獴 (Zhan, 1981:168; 1995:146; Zhou, 1997:259)
Herpestes urva Hodgson

捕 食：蛙、蛇。
分 佈：福建、雲南。

Herpestes urva (Hodgson) 棕簑貓 (Chen et Yu, 1984, III:506)
別 名：*獴哥，蟹獴*。
捕 食：淡水蟹，蛙爲主、兼食魚鳥。
分 佈：臺灣(平地至 1,000m 地區，喜在溪流附近穿穴而居)。

Viverra indica Desmarest 小靈貓 (Zhan, 1981:168)
Viverra indica Desmarest
別 名：*香狸*。
捕 食：鼠。
分 佈：福建。

Viverra zibetha Linnaeus 大靈貓 (Zhan, 1981:168)
Viverra zibetha Linnaeus
別 名：*九節狸*。
捕 食：鼠。
分 佈：福建。

Felidae 貓科

Felis bengalensis Kerr 豹貓 (Zhan, 1981:168)
Felis bengalensis Kerr
捕 食：鼠。
分 佈：福建。

Felis bengalensis chinensis Gray 山貓(華南亞種) (Chen et Yu, 1984, III:506; Zhan, 1995:146)
別 名：*豹貓，石虎，錢貓*。
捕 食：鳥、獸、鼠、蛙、蛇、昆蟲等爲食、有時亦掠取果實，或潛入人家.偷食家雞。
分 佈：臺灣(全省，平地至 1,500m 均有其踪跡，性兇暴)、福建。

MOLLUSCA 軟體動物門

GASTROPODA 腹足綱

PULMONATA 肺螺目

Oleacina 肉食蝸牛科

Euglandina rosea Ferus 玫瑰蝸牛 (Chiu, 1965:19; 1960:39-43; Chiu et Chou, 1962:17-24; 1978:366; Lo, 1997:59)

捕 食：*Achatina fulica* Bowdich 非洲大蝸牛
Bradybaena similis Ferr. 扁蝸。
分 佈：臺灣(1959 年從夏威夷引進)；原產美國佛羅達州，經引入夏威夷諸島嶼防治非洲大蝸牛。

Strelaxidae 肉食小蝸牛科

Gonaxis quadrilateralis Preston 嘉納蝸牛 (Chiu, 1965:20; Chiu et Chou, 1965:192-198; 1978:367; Huang et al., 1976:414; Lo, 1997:59)
捕 食：*Achatina fulica* Bowdich 非洲大蝸牛。
分 佈：臺灣(1961 年從夏威夷引進)；原產非洲，經引入夏威夷諸島嶼防治非洲大蝸牛。

Bradybaenidae 扁蝸科

Bradybaena kiangsinensis Martens 扁蝸 (Zhu et al., 1997, 24(4):377)
抑 制：辣椒軟腐病菌
柑橘青霉病菌
鏈皮孢
葡萄白腐病菌
蘋果輪紋病菌
根霉。
分 佈：甘肅，全國。
附 註：扁蝸腺體含有生物活性物質，其提取液具有抑菌和溶菌作用。

Helicarionidae 鱉甲蝸科

(Liu et al., 1997:165-172)

Incilaria sp. 蛞蝓 (Wang, 1987[ed.]:354)
寄 主：*Ericerus pela* (Chavannes) 白蠟蟲。
分 佈：湖南、四川。

BACTERIOPHYTA 細菌門(Bacteria 細菌)

(Heilongjing, Mudingjiang FS., [ed.]:127-130; Hou, R. F., 1997:75-84; Wu, 1989:212-229, 332-349; Yue, 1989:202-211, 230-257, 350-368)

EUBACTERIALES 真細菌目

Pseudomonadaceae 假單孢菌科

Pseudomonas pseudoalcalingenes 類產鹼假單孢菌 (Liu et al., 1995, 35(2):88-90; Yang et al., 1996, 12(2):55-57; Yang et al., 1996, 12(30:114-116)
寄 主：*Aulacobothrus sinensis* Uvarov 中華坳蝗

Ceracris kiangsu Tsai　黃脊竹蝗
Locusta migratoria manilensis　東亞飛蝗
Maladera orientalis Motschulsky　黑絨鰓金龜
Mythimna separata Walker　粘蟲
Gynaephora ruoergensis Chou et Yin　草原毛蟲。
分 佈：四川、青海。

Entrobacteriaceae 腸桿菌科

Salmonella qionglei strain 沙門氏菌(瓊雷株) (Liang, 1981:35; Liang, 1987:129-132)
寄 主：*Cricetulus migratorius*　灰倉鼠
Lagurus lagurus　草原兔尾鼠
Meriones tamarisinus　檉柳沙鼠
Mus musculus　小家鼠。
分 佈：新疆。

Serratia marcescens Bizic 粘質沙雷氏桿菌 (Fang, 1984:132-135; He, et al., 1991: 156; Li, 1987:195; Lin et al., 1977:234; Liu et al., 1988:34-38)
寄 主：螻蛄。
Nilaparvata lugens (Stål)　褐飛虱
Nasia atrovenosa　花稻虱
Sogatella furcifera (Horvàth)　白背飛虱
Nephotettix virescens (Distant)　黑尾葉蟬
Inazuma dorsalis (Motschulsky)　電光葉蟬
白葉蟬
青大葉蟬
黑唇葉蟬
紫葉蟬
Myzur persicae (Sulzer)　桃蚜
Rhopalsiphnum pseudobrassicae (Davis)　菜縊管蚜
稻黑蝽
稻綠蝽
稻葉甲
黃守瓜
蠐螬
Plutella xylostella (Linnaeus)　小菜蛾
Chilo suppressalis (Walker)　二化螟
Scirpophaga incertulas (Walker)　三化螟
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée)　稻縱捲葉螟
Phragmatoecia castaneae Hübner　蔗褐木蠹蛾
小地老虎

Mythimna separate (Walker) 粘蟲
煙青蟲
棉鈴蟲
銀紋夜蛾
Protodeltote distinguenda (Staudinger) 條紋螟蛉
Pieris rapae Linnaeus 菜粉蝶(菜青蟲)
Mycalesi gotama Moore 稻眼蝶
Bradysia tritici (Coquillett) 黃帶黑翅蕈蠅(成蟲、幼蟲)(洋菇)。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東。

茶毛蟲細菌性軟化病 (Dai, 1990:139)
寄 主：*Euproctis conspersa* 茶毛蟲
Dasychira baibarana 茶黑毒蛾
Ectropis obliqua hypulina 茶尺蠖。
分 佈：貴州。

Photorhabdas 線蟲共生福細菌 (Xu, 1995:47-50)
寄 主：
分 佈：

Xenorhabdus bedingii (Yang et al., 1998, 14(1):21-24)
寄 主：異小桿線蟲(Heteroshabditidae)
斯氏線蟲(Steinernematidae)
分 佈：

Xenorhabdus bovienii (Yang et al., 1998, 14(1):21-24)
寄 主：異小桿線蟲(Heteroshabditidae)
斯氏線蟲(Steinernematidae)。
分 佈：

Xenorhabdus luminescens 線蟲共生細菌 (Chen et al., 1994, 4:157-162; Han et al., 1990:25-32; 1991:198-201; 1993:129-134; Xu, 1995:47-50)
寄 主：*Heterorhabditis* sp. 異小桿線蟲 (ex *Galleria mellonella* 大蠟螟)。
分 佈：廣東等地。

Xenorhabdus nematophilus (Yang et al., 1998, 14(1):21-24)
寄 主：異小桿線蟲(Heteroshabditidae)
斯氏線蟲(Steinernematidae)。
分 佈：

Xenorhabdus poinarii (Yang et al., 1998, 14(1):21-24)
寄 主：異小桿線蟲(Heteroshabditidae)

斯氏線蟲(Steinernematidae)。
分 佈：

Bacillaceae 芽孢桿菌科

(Liu, 1994, 20(5):30-32)

Bacillus cereus Frankland et Frankland 蠟狀芽孢桿菌 (Liu et al., 1999, 21(3):99)
寄 主：*Chondracris rosea rosea* (De Geer) 棉蝗(木麻黃)。
分 佈：廣東。

Bacillus firmus 堅強芽孢菌 (Huang et al., 1992:182)
寄 主：*Phyllotreta vittata* 黃條跳甲。
分 佈：廣西。

Bacillus larvae White 蜜蜂幼蟲病 (Chen et al., 1997:23-32; Chien et Yen, 1969:179; Yen et Ching, 1971:12-17)
寄 主：*Apis mellifera* Linnaeus 意大利蜜蜂(幼蟲)。
分 佈：臺灣；美洲。

Bacillus lentimorbus 緩病芽桿菌 (Xie, 1991:183-184)
寄 主：蒙古麗金龜(蠐螬乳狀菌)
銅綠麗金龜(蠐螬乳狀菌)。
分 佈：山東。

Bacillus moritai 森田芽孢桿菌 (Xue, 1986:31; Yu et al., 1990(Suppl. Pub.) 4:78-82)
寄 主：家蠅(幼蟲)。
分 佈：日本(引進中國商品 Rabiusu M-10D，M-20D 和 M-200D，用作家禽畜飼料添加劑，防治糞便中蠅類的孳生)。

Bacillus penetrans 穿刺芽孢桿菌 (Lin et Chen, 1992:261-268)
寄 主：*Meloidogyne arenaria* 花生根結線蟲
Meloidogyne hapla 北方根結線蟲
Meloidogyne incognita 南方根結線蟲(優勢種)(羅漢果 *Momordica grosvenori*)
Meloidogyne javanica 爪哇根結線蟲(優勢種) (羅漢果 *Momordica grosvenori*)
Meloidogyne thamesi 泰晤士根結線蟲
分 佈：福建。

Bacillus popilliae Dutky 日本金龜芽孢桿菌 (Chang et al., 1977:355-356; Chin, 1979:253; Cui et al., 19818(2):83-89; Feng et al., 1982:156-159; Shang et al., 1981:95-100; Song et Qi, 1982:403-408; Xiao, 1985(2):31; Xie, 1991:183-184; Yang, 1985:160-164; Yang et Liu, 1981:199-202; Zhang et al., 1975, 12(2):43; Zhang et al., 1980, 23(2): 178-183)
Bacillus popilliae Dutky, 1940:57-68.
別 名：*乳狀菌*。
寄 主：*Adoretus hirsutus* Ohaus 毛喙麗金龜

Alissonotum sp. 黑色蔗龜
Anomala corpulenta Motschulsky 銅綠麗金龜
Anomala exoleta Fald. 黃褐麗金龜
Anomala mongolica Sem. 蒙古麗金龜
Apogonia cupreoviridis (Fairm.) 黑棕鰓金龜
Exolontha serrlata (Gyllenhal) 黃色蔗龜
Holotrichia diomphalia Bates 東北大黑鰓金龜
Holotrichia morosa Waterh. 暗黑鰓金龜
Holotrichia oblita Faldermann 華北大黑金龜
Holotrichia ovata Chang 桑龜
Holotrichia titanis Reitter 棕色鰓金龜
Maladera verticollis (Fairm.) 闊脛鰓金龜
Melolontha incanus Motschulsky 灰粉鰓金龜
Pentodon patruelis Friv. 闊胸犀金龜
Popillia quadriguttata Fabricius 四紋麗金龜
小茶色鰓金龜(蠐螬乳狀菌)。
分 佈：山東、山西、北京、西北、東北。
附 註：本菌由日本金龜子(*Popillia japonica* Newm.)幼蟲分雜所得。

Bacillus popilliae var. **shandong** 華北大黑芽桿菌 (Song, Xie-son, 1991:273)
寄 主：*Holotrichia oblita* Faldermann 華北大黑(蠐螬)。
分 佈：山東。

Bacillus sphaericus 球形芽孢桿菌 (Fang et al., 1994, 2(2):7; Gu et Luo, 1987:66-69; Gu et Luo, 1989:1-5; Li, 1989, 10(7):313-315; Li, 1996, 18(1):46; Liu et al., 1989, 10(7):7; Liu et al., 1995, 6(4):241-246; Lu, 1985(1):35; Lu et al., 1988:48; Luo, et al., 1991:181-182; Miao, 1987:145; Pei et Yuan, 1999, 21(1):28-37; Ren et al., 1982:349-350; Ren, et al., 1987, 30(1):21-25; Sun et al., 1986:84-86; Wang et al., 1993:174; Yuang et al., 1992, 37:404-410; Yuan et al., 1994, 10(2):95-96; Yuan et al., 1995, 22:92; Yuan et al., 1998, 14(2):82-84; Yuan et al., 1999, 15(1):23-26; Zhang et al., 1989, 1:98-101; Zhang, et al., 1991:172; Zhang et al., 1994, 5(3):168-171; Zuo et al., 1986:170-172)
寄 主：*Anopheles anthropophagus* 按蚊
Anopheles dirus 按蚊
Anopheles sinensis Wiedemann 中華按蚊
Aedes aegypti 埃及伊蚊
Aedes albopictus 白紋伊蚊
Aedes flavopictus 黃斑伊蚊
Aedes togoi 東鄉伊蚊
Culex modestus 凶小庫蚊
Culex pipiens pallens Coquillett 淡色庫蚊
Culex quinquefasciatus Say 致倦庫蚊
Cules tritaesiorhynchus 三帶喙庫蚊
尖音庫蚊淡色亞種。
分 佈：江西、湖南、廣東、貴州、四川、山東、天津。

Bacillus thuringiensis Berliner 蘇雲金芽孢桿菌 (Cai, 1992, 4: ; Cai et al., 1993, 20(4):193-195; Chang et Hou, 1990:368-369; Chang et al., 1995:368; Chen, 1996, 12(2):75-77; Chen, 1997:47-48; Chen et Chiu, 1983:288; Chen et al., 1989:63; Chen et al., 1990(Suppl. Pub.) 4:34-38; Chen et al., 1991:140; Chen et al., 1990, 6(Suppl.):12-16; Chen et al., 1990:273-282; Chen et al., 1999, 15(1):19-22; Cheng et Chen, 1961:1-4; Cheng et Tseng, 1994:566-567; Cheng et al., 1994:127; Chian et al., 1085 447; Chiang et al., 1986:179-189; Chin, 1979:253; Chou et Lei, 1986, 29:126-130; Chu, 1961:23-40; Cui et al., 1993, 18:265-267; Dai, 1974:231-232; 1992:43; Dai et Shuai, 1994, 10(2):62-66; Dai, et al., 1987, 6(2):187-188; Dai, et al., 1991:180-181; Dai et al., 1994, 10(2):62-66; Dai et al., 1994, 34(6):449-456; Dai et al., 1996, 12(4):178-181;Dong et Niu, 1991:10-12; Dong et al., 1987:172-174; Fan et al., 1996, 12(2):69-71; Feng et al., 1975, 18:374-382; Feng et al., 1985, 1:24; Feng et al., 1995, 11(1):22-25; Feng et al., 1996, 12(3):110-113; Feng et al., 1996, 39(3):238-244; Gu, 1984, 11(5):193-195; Gu et al., 1992, 19(4):197-200; Gu et al., 1993, 9(4):160-162; Guangtung, Ent. Res. Inst., 1977:5-13; Guangxi, 1974:129-134; Guo, 1995, 21(2):36-38; Guo et al., 1993, 9(4):151-155 Han, 1993:178; He, et al., 1991:156; Hong et Chen, 1991:175; Hong et Li, 1988, 22(1):61-64; 1990, 6(Suppl.):43-46; Hou, 1986:59-70; Hou et Chou, 1987:171; Hou et Kuo, 1996:334; Hsiao, 1984:173-197; Hsu et Lo, 1986:115; Huang, 1985(2):14; Huang et Huang, 1986:81-83; 1988:39-43; Huang et al., 1990:94; 128-130; Huang, et al., 1991:170; Hu et al., 1994:445-461; Huang, et al., 1991:176-177; Huang et al., 1994, 10(2):90; Huang et al., 1997:233-237; Jiang et al., 1991:6; Jiang et al., 1997, 13(2):82-85; Jin et Wang, 1991:175-176; Kao, 1993:203-204; Kao et Chang, 1998:431; Kao et Tsai, 1990:351-352; Kao et Tuan, 1991:438-439; Kao et al., 1992:256-257; 1993:350; 1994:155-160; Lee, 1966:148-153; Li, 1987:127-128; Li, 1987:195; Li, :1-4; Li, 1990:229-247; Li, 1996, 18(1):46; Li et Luo, 1989:149-157; Li et Luo, 1989, 32(2):149-157; 1989, 29(6):397-404; Li et Sheng, 1993, 36(3):263-270; Li et al., 1987:76; Li et al., 1989:83-85; Li et al., 1990(Suppl. Pub.) 4:28-30; Li et al., 1990(Suppl. Pub.) 4:31-33; Li et al., 1990, 30(5):380-388; Li et al., 1991:174; Li, et al., 1991:179; Li et al., 1992:25-29; Li et al., 1997, 13(4):166-168; Li et al., 1999, 21(4):152-155; Liang et al., 1999,26(4):353-357; Lin et Cao, 1994, 10(1):18-21; Lin et al., 1990(Suppl. Pub.) 4:21-23; 24-27; 69-72; Lin, et al., 1991:182; Lin et al., 1992, 8(1):36-40; Lin et al., 1995, 11(3):97-100; Liu, 1994, 16(2):92-93; Liu et Zhang, 1993, 15(2):90; Liu et Zhang, 1999, 15(2):70-72; Liu et al., 1985, 12(2):107-112; Liu, et al., 1991:204-205; Lin et al., 1994, 10(1):18-21; Liu et al., 1995:368-369; Liu et al., 1998, 14(1):38-42; Liu et al., 1998,25(4):359-Lo et al., 1991:292-298; Long et al., 1994, 16(4):165-169; Lu, 1985(1):34; Lu et Hong, 1993, 9(1):36-39; Lu et Yu, 1998, 18(5):57-62; Lu et al., 1983, (1):39-41; Lu et al., 1990(Suppl. Pub.) 4:17-20; 24-27; Lu et al., 1992, 6:32-33; Lu et al., 1993, 9(4):156-159; Luo et al., 1986:167-169; Lou et al., 1987, 3(4):145-148; Luo et al., 1989:27-29; Luo et al., 1990:85-87; Luo, et al., 1991:169; Luo, et al., 1991:181-182; Ma et al., 1997, 19(2):62-65; Ning et al., 1991, 7(2):86; Nong et Pang, 1998, 14(1):43-46; Nong et Pang, 1998, 14(2):78-82; Ou Yang, 1999, 21(1):18-20; Ren et al., 1983, 23(1):57-62; Sha et Bai, 1982:244-249; Sha et Xie,1992, 29:215-217; Sha et Zhang, 1994:103-107; Shao et Cui, 1995, 11(2):75-79; Shao et Yu. 1999, 15(1):66-69; Shen, 1996, 12(1):44; Shen et Qian, 1993, 9(4):181-184; Shen et Qian, 1994, 10(2):82-84; 10(3):135-140; Shen et al., 1990(Supp.) 4:12-16; Shen et al., 1990(Suppl.) 4:47-50; Shih et Hou, 1994:471-481; Shing et al., 1979:206-209; Song et Hong, 1992:87-90; Song et al., 1993, (suppl.):177-179; Su, 1990:10-23; 49-59; 1991:174-178; Sun et al., 1996, 12(3):127-129; Tai, 1973: 193-194; Tan et al., 1997, 30(55):13-19; Tan et al., 1998, 25(1):65-71; Tsai et al., 1964:855-861; Tsai et al., 1955:349-360; Tsai et al., 1995:265-270; Tseng et Yang, 1994:566; Tuan et al., 1993:70-78; 139-148; Wang et al., 1980, 20(3):285-288; Wang, 1989:94-96; Wang, 1991:176; Wang et Sha, 1991:50-53; Wang et al., 1990, 27:20-21(62); Wang et al., 1993:178-179; Wang et al., 1993:179-183; Wang et al., 1999(1):12-15; Wen, 1983:74-78; Wu, 1986, 29:35-39; Wu et Cheng, 1985, 5(2):27-30; Wu et Yang, 1988:144; Wu et al., 1987:141; Wu et al., 1988, 25:149-151; Wu et al., 1988, 25(6):254-256; Wu et al., 1989, 11:17-19; Wu et al., 1990, 17(1):15-18; Wu et al., 1993:5-8; Wu et al., 1994, 10(3):110-113; Wu et al., 1998, 14(3):101-104; Xie, 1989, 5(4):184-188; Xie et al., 1990(Suppl. Pub.) 4:51-53; Xie et al., 1990(Suppl. Pub.) 4:73-77; Xing et al., 1983, (2):19-24; Xing et al., 1990(Suppl. Pub.) 4:65-68; Xu, 1985:26; Xu et Xue, 1986:31; Xu et al., 1992, (6):23-25; Xu et al., 1998, 20(2):49-55; Yang et al., 1994:128; Yang et al., 1996, 12(3):114-116; Yang et al., 1997, 34(2):117-120; Yen et Chou, 1962; 136-142; Yin et al., 1994, 10(2):69-71; Yu, 1990:170-186; Yu, 1993:170-179; Yu, 1995, 11(2):96-97; Yu, 1995:515-521; Yu et Dai, 1987:6-9; Yu et Gu, 1999(6):50; Yu et al., 1990(Suppl. Pub.) 4:54-59; 60-64; 78-82; 90; 91; Yu et al., 1995, 3(2):100-109; Yu et al., 1995, 17(3):128-137; Yu et al., 1996, 12(2):85-89; Yu et al., 1997, 19(4):173-179; Yu et al., 1998, 20(1):38-41; Yu et al., 1998, 20(4):180-186; Yu et al., 1999, 21(1):21-27; Yuan et al., 1999, 15(1):23-26; Yuan et al., 1999, 15(2):85-89; Zeng et al., 1998, 14(4):172-175; Zeng et al., 1999, 21(1):38-42; Zhang, 1990(Suppl. Pub.) 4:92-93; Zhang et Liu, 1997, 13(2):53-56; Zhang et Zhang, 1999:26; Zhang et You, 1991:142; Zhang et al., 1988:161-164; Zhang et al., 1993, 9(4):185; Zhang et al., 1993, 12(6):579-584; Zhang et al., 1995, 11(4); 178-182; Zhang et al., 1996, 12(1):1-4; Zhang et al., 1997, (9):14-15; Zhang et al., 1998, 14(2):58-61; Zhao et al., 1980:193; Zhe et al., 1987:228-233; hong, et al., 1991:173; Zhong et al., 1990(Suppl.)(4):1-5; Zhong et al., 1990(Suppl. Pub.)4:6-8; Zhong et al., 1990(Suppl. Pub.):4:9-11; Zhong-Shan Univ., DB., 1977, 20(1):5-13; .Zhu et al., 1986, 2(1):23-25; Zhuang et al., 1993, 32(6):6-10; Zuo et al., 1994, 6:126-128; 1994, 20(2):2-4; 1994, 10(3):126-130)

別 名：*殺螟桿菌*，*蘇力菌*。

寄 主：*Aphis gossypii* Glover　棉蚜(菊花)
Hyaloptera amygdali　桃粉大尾蚜(桃)
Myzus persicae (Sulzer)　桃蚜(龍葵)
Cryptothelea minuscula　茶袋蛾
Phyllocnistis citrella Stainton　橘潛蛾
Plutella xylostella　小菜蛾
Plodia interpunctella　印度谷螟
Carposina niponensis Walsingham　桃小食心蟲
Chilo hyrax　棘禾草螟
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée)　稻縱捲葉螟
Ostrinia furnacalis (Guenée)　亞洲玉米螟
Galleria mellonella Linnaeus　大蠟螟
Brachmia macrosocopa　甘薯捲葉蛾(蕹菜)
Pectinophora gossypiella Sunders　棉紅鈴蟲
豆野螟
Iragoides fasciata　茶刺蛾
Dendrolimus superans (Butler)　落葉松毛蟲(幼蟲)
Euproctis conspersa　茶毛蟲
茶茸毒蛾
Lealia coenosa candida　蘆毒蛾(荻蘆)
茶尺蠖
Agrotis segetum Schiffermüller　黃地老虎
Argyrogramma agnata　銀紋夜蛾
Helicoverpa armigera (Hübner)　棉鈴蟲
Mythimna separata (Walker)　粘蟲
Plusia aghata　銀紋夜蛾
Spodoptera exigue　甜菜夜蛾
Spodoptera litura (Fabricius)　斜紋夜蛾
Parnara guttata guttata (Bremer et Grey)　稻苞蟲
Pieris rapae (Linnaeus)　菜粉蝶(菜青蟲)(*Artogeia*)
Pieris sordida Butler　臺灣紋白蝶
Epilachna niponica 馬鈴薯瓢蟲
天牛(幼蟲)
Phyllotreta vittata Fabricius　黃條跳甲
Tenebrio molitor　黃粉蟲
Anopheles sinensis　中華按蚊
Culex fritoeniorhynchus 庫蚊
尖音庫蚊淡色亞種
Culex pipiens pallens　庫蚊
Culex pipiens fatigans　庫蚊
Culex pipiens quinquefasciatces　致倦庫蚊。

分 佈：臺灣、廣東、廣西、湖南、浙江、江蘇、上海、河南、山東、河北、全國各地。

附 註：SB-1(血清型 H3a3b)；(是否包括血清型 HD-1, H-9)，在臺灣通稱蘇力菌。商品有 Thuricide, Agritrol (美國)

Bacillus thuringiensis 蘇雲金桿菌(SD-5) (Dai et al., 1994, (6):26-28; Dai et al., 1995, 10(2):187-191; Dai et al., 1996, 12(2):58-61)

寄 主：*Psilogramma menephron* 霜天蛾(蟲尸)

Plusia agnata 銀紋夜蛾(大豆)。

分 佈：山東

附 註：屬血清型 H3a3b

Bacillus thuringiensis var. **aizwai** 蘇雲金芽孢桿菌 (Li et Sheng, 1993:263-271)

寄 主：*Spodoptera litura* (Fabricius) 斜紋夜蛾。

分 佈：湖北；日本。

Bacillus thuringiensis ssp. **chinensis** 蘇雲金桿菌(中華亞種) (Yu, et al., 1991:247-248)

寄 主：*Plutella xylostella* 小菜蛾

Culex pipiens 致倦庫蚊

Apriou germani 桑天牛

Henosepilachna vigintioctopunctata 茄二十八星瓢蟲

Musca domestica 家蠅(幼蟲)。

分 佈：

Bacillus thuringiensis ssp. **dali** Yan, et al. 蘇雲金芽孢桿菌(大理亞種) (Yan, et al., 1991: 171-172)

寄 主：

分 佈：雲南(大理)。

Bacillus thuringiensis var. **dendrolimus** 蘇雲金芽孢桿菌(松蠋變種) (Sha et Bai, 1982:244-249; Xiao, 1985(2):30)

寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲

Mythimna separata (Walker) 粘蟲

Heliothis armigera Hübner 棉鈴蟲

Galleria mellonella Linnaeus 大蠟螟

Agrotis segetum Schiffermüller 黃地老虎。

分 佈：東北。

Bacillus thuringiensis var. **galleriae** Heimpel 蘇雲金芽孢桿菌(蠟螟變種)(青蟲菌 6 號) (ASZI, Inst. Pathol., 1973:91-93; CAAC, 1988:99-105; Dong et al., 1987:172-174; He, et al., 1991: 156; Hong et Li, 1990(Suppl. Pub.) 4:43-46; Hong et al., 1990(Suppl. Pub.) 4:39-42; 88-89; Hubei, Plant Prot. Res. Inst. et al., 1985:1-18; Hubei et al., 198761-65; Li et al., 1992:21-25; Qiu, 1965:276-280; Qin, 1987:187; Shen et Qian, 1994, 10(2):93-94; Shen et Qian, 1994, 10(3):118-122; Shen et al., 1994, 10(2):72-75; Shen et al., 1994, 21(4):373-377; Xing et al., 1990(Suppl. Pub.) 4:95-96; Ye et al., 1985(3):44; Ye et al., 1988:76-86)

寄 主：*Aphis gossypii* Glover 棉蚜
Hyaloptera amygdalis 桃粉大蚜
Myzus persicae (Sulzer) 桃蚜
Chilo suppressalis (Walker) 二化螟
Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟
Galleria mellonella 大蠟螟
Clanis bilineata (Walker) 豆天蛾
Sesamia inferens (Walker) 大螟
Dendrolimus punctatus (Walker) 馬尾松毛蟲
Anomis falva 棉小造橋蟲
Helicoverpa armigera 棉鈴蟲
Mythimna separata (Walker) 粘蟲(蛹)
Parnara guttata guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲
Mycalesi gotama Moore 稻眼蝶。
分 佈：廣西、湖南、湖北、天津。
附 註：包括 A, B, C.

Bacillus thuringiensis var. **israelensis** Goldberg 蘇雲金桿菌(以色列變種)(Serotype H 14)
(Chen et al., 1984:115-117; Chen et al., 1984:153-154; Chen et al., 1987:90-93; Chou et al., 1981(4):40-41; Han, 1988:153-156; Hong et Li, 1990(Suppl. Pub.) 4:43-46; Kang et Chen, 1986:39-56; Lien et al., 1982:101; Long et Liang, 1983:14-17; Long et al., 1983:68-73; Lu, 1985(1):34; Qiu, 1982 4(3):50; Qiu et Lei, 1986:126-130; Ren et al., 1982:349-350; Sha et Bai, 1982:244-249; Sha et al., 1981:237-243; Wang et al., 1981:42-47; Wu, 1986: 35-40; Xu, 1988:146-147; Yao et al., 1989:127-128; Yu et al., 1985, (1):273-277; Zhongsun Univ. et al., 1983:18-19; Zuo et al., 1987:115-117)
Bacillus thuringiensis var. *israelensis* Goldberg, 1977:
寄 主：*Aedes aegypti* 埃及斑蚊
Aedes albopictus 白紋伊蚊
Anopheles sinensis 中華按蚊(幼蟲)
Armigeres subalbatus 白腹叢蚊
Culex pipiens quinquefasciatus 致倦庫蚊(熱帶家蚊)
Culex pipiens var. *pallens* Coqillett 淡色庫蚊
Mythimna separata (Walker) 粘蟲
Helicoverpa armigera Hübner 棉鈴蟲
Galleria mellonella Linnaeus 大蠟螟
Agrotis segetum Schiffermüller 黃地老虎
分 佈：臺灣、湖北、北京、山東；以色列、德國、美國，(於 1979 從美國引進該菌)。

Bacillus thuringiensis var. **kenyae** 蘇雲金桿菌(肯尼亞變種) (Sha et Bai, 1982:244-249)
寄 主：*Mythimnai separata* (Walker) 粘蟲
Helicoverpa armigera Hübner 棉鈴蟲
Galleria mellonella Linnaeus 大蠟螟

Agrotis segetum Schiffermüller 黃地老虎
分 佈：北京。

Bacillus thuringiensis ssp. **kurstaki** 殺蟲菌 (Hong et Li, 1990(Suppl. Pub.) 4:43-46; Liu et Yang, 1995, 11(3):111-113; Liu et al., 1988, 11(2):54; Lu, et al., 1991:177-178; Sha et Bai, 1982:244-249; Shen et al., 1997, 24(3):283-284; Wang et Jin, 1991:250-251; Wang et al., 1993, 9(1):48; Wang et al., 1993, 20(3):273-276; Xing et al., 1988:101; Xu et al., 1990(Suppl. Pub.) 4:83-87; Yang et al., 1985:19-21; Zhu et al., 1990, 17(3):241-245)
寄 主：*Holotrichia parallela* Motschulsky 暗黑鰓金龜(花生田蠐螬)
Maladera orientalis Motschulsky 黑絨鰓金龜(花生田蠐螬)
闊脛絹金龜(花生田蠐螬)
小闊脛絹金龜(花生田蠐螬)
Plutella xylostella Linnaeus 小菜蛾(西洋菜 *Nasturtium officinale* R. Br.)
Mythimna separata (Walker) 粘蟲
Helicoverpa armigera Hübner 棉鈴蟲(西紅柿)
Galleria mellonella Linnaeus 大蠟螟
Agrotis segetum Schiffermüller 黃地老虎
燈蛾
Pieria rapae (Linnaeus) 菜粉蝶(菜青蟲)。
分 佈：廣東(廣州)、江蘇、湖北、山東、河北、北京(美國引進)。

Bacillus thuringiensis var. **ostriniae** 蘇雲金桿菌(玉米螟變種) (Sha et Bai, 1982:244-249)
寄 主：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲
Helicoverpa armigera Hübner 棉鈴蟲
Galleria mellonella Linnaeus 大蠟螟
Agrotis segetum Schiffermüller 黃地老虎
分 佈：北京。

Bacillus thringiensis serotype (H-14) 蘇雲金桿菌(H-14) (Chen et al., 1991, 7(3):222; Li, 1996, 18(1):46; Lien et al., 1982:101; Liu, 1984:139-144; Ning et al., 1991, 7(2):86; Xu et al., 1986:20-22)
寄 主：*Aedes aegypti* 埃及伊蚊(幼蟲)
Aedes albopicus 白紋伊蚊(幼蟲)
Aedes flavopictus 黃斑伊蚊(幼蟲)
Anopheles anthropophagus 嗜人按蚊(幼蟲)
Anopheles sinensis 中華按蚊(幼蟲)
Culex pipiens palleae 淡色庫蚊(幼蟲)
Culex pipiens quinquefasciatus 致倦庫蚊(幼蟲)
Culex tritaeniorhynchus 三帶喙庫蚊(幼蟲)
蚋(幼蟲)。
分 佈：廣東、廣西、江蘇、上海、北京。

Bacillus thuringiensis var. **thuringiensis** 蘇雲金桿菌變種 (Sha et Bai, 1982:244-249)
寄 主：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲

Helicoverpa armigera Hübner 棉鈴蟲
Galleria mellonella Linnaeus 大蠟螟
Agrotis segetum Schiffermüller 黃地老虎。
分 佈：北京。

Bacillus thuringiensis var. **tienmensis** Zou et Wen 蘇雲金芽孢桿菌(天門變種)(He, et al., 1991: 156; Sha et Bai, 1982:244-249)
寄 主：*Scirpophaga incertulas* (Walker) 三化螟
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟
Mythimna separata (Walker) 粘蟲(蛹)
Parnara guttata guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲
稻薊馬
Helicoverpa armigera (Hübner) 棉鈴蟲
Galleria mellonella Linnaeus 大蠟螟
Agrotis segetum Schiffermüller 黃地老虎。
分 佈：浙江、江蘇、湖北、河南、河北、天津、內蒙古。

Bacillus thuringiensis (Tm 13-14) 蘇雲金桿菌(Tm 13-14)菌株 (Luo et al., 1991:24-26)
寄 主：*Tenebrio molitor* 黃粉蟲(幼蟲)
分 佈：湖北。

Bacillus thuringiensis (DL-5789) 蘇雲金桿菌(DL-5789)菌株 (Lu et al., 1997, 13(2):72-75)
寄 主：*Spodoptera litura* Fabricius 斜紋夜蛾
Helicoverpa armigera (Hübner) 棉鈴蟲
Plutella xylostella (Linnaeus) 小菜蛾
分 佈：湖北。

Bacillus thuringiensis ssp. **wenquanensis** 蘇雲金桿菌(溫泉亞種)
寄 主：
分 佈：

Bacillus thuringiensis ssp. **wuhanensis** 7805 蘇雲金桿菌(武漢亞種) (Huang, 1990[ed.]:230-233; Zhang et al., 1987:30-32)
寄 主：蘋小吉丁
小菜蛾
蘋果巢蛾
大豆捲葉蛾
玉米螟
草地螟
Apocheima cinerarius Ersehoff 沙棗尺蠖
梨星毛蟲
天幕毛蟲

粉白燈蛾
Mythimna separata (Walker) 粘蟲
Plusia agnata 銀紋夜蛾
Mamestra bassacae (Linnaeus) 甘藍夜蛾
麥穗夜蛾
Parnara guttata Bremer et Grey 稻苞蟲
Aporia crataegi Linnaeus 山楂粉蝶(梅白蝶)
Pieris rapae (Linnaeus) 菜粉蝶。
分 佈：雲南、貴州、河南、甘肅。

Bacillus thuringiensis var. **yunnanensis** Wang et al. 蘇雲金芽孢桿菌(雲南變種) (He, et al., 1991: 156)
寄 主：*Chilo suppressalis* (Walker) 二化螟
Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟
Mythimna separata (Walker) 粘蟲(蛹)
Parnara guttata guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲。
分 佈：雲南。

Bacillus thuringiensis (85-10-6) 蘇雲金芽孢桿菌(85-10-6) (Wu et al., 1988, 15(6):254-256)
寄 主：
分 佈：

Bacillus thuringiensis (9419) 蘇雲金芽孢桿菌(9419) (Chen et Xiao, 1995, 21(5):4-6)
寄 主：*Plutella xylostella* (Linnaeus) 小菜蛾。
分 佈：廣東。

Streptomycetaceae 鏈黴菌科

(Ruan, 1977:)

Avermectin 殺蟲抗生素 (Cai et al., 1997, 13(2):86-89; Shen et Yang, 1994, 16(3):1-13; Wang et al., 1998, 25(3):258-262; Zhang et al., 1990, 17(2):126; Zhang et al., 1996, 23(4):349-354; Zheng, 1991, 13(1):19-26)
別 名：*齊墩霉素*。
寄 主：*Helicoverpa armigera* (Hübner) 棉鈴蟲
Trichogramma chilonis Ishii 螟黃赤眼蜂
Coccinella septempunctata 七星瓢蟲
Erigonidium graminicolum 草間小黑蛛。
分 佈：北京。

愛福丁**(BA-1)** 抗生素殺蟲劑 (Cao et Zhang, 1994, 20(4):46-47)
對 象：*Helicoverpa armigera* (Hübner) 棉鈴蟲。
分 佈：北京。

天力 II 號 (Meng et al., 1997, 13(2):90-92)

對 象：*Aphis gossypii* 棉蚜
Acyrthosiphon gossypii 棉長管蚜。
分 佈：新疆。

Streptomyces avermitilis 霉蟲素 (Li et Qian, 1996, 23(4):333-337; Rui et al., 1995, 21(2):45-46; Zhang et al., 1996, 23(4):349-354)

別 名：*齊墩霉素，害極滅*。
對 象：棉鈴蟲
粘蟲
桃蚜
菜縊管蚜
紅蜘蛛。
分 佈：日本。
附 註：日本從土壤微生物 *Streptomyces avermitilis* 的發酵培養液中提取的 Avermectin B1。

Streptomyces griseolus 瀏陽霉素(230) (Liuyangmycin) (Cao, 1982:40; Cheng, 1989:32-33; Dong, 1990:97-101; Fang et Wang, 1993(2):47; Geng et al., 1990:42-43; Jiang et al., 1991:6; Liu, 1993, 19(2):50; Xie, 1983:11-15; Xie, 1993, 9(2):87-89; Xie et al., 1992:29-32; Yao et al., 1993, 9(4):190; Zhang et Zhang, 1999:27)

寄 主：桃蚜
桃小食心蟲
Pieris rapae Linnaeus 菜青蟲
Polyphgotarsonemus latus 多食跗線蟎(溫室辣椒)
Tetranychus cinnabarinus 朱砂葉蟎
Tetranychus trancatus 截形葉蟎
Tetranychus urticae 二斑葉蟎
蘋果葉蟎
Tetranychus vinnensis 山楂葉蟎
分 佈：湖南、山東、北京。

Streptomyces griseolus var. **hangzhouensis** Yan et Fang 淺灰鏈黴菌(杭州變種) Chen et al. 1985(3):43)

Streptomyces griseolus var. *hangzhouensis* Yan et Fang, 1978:
寄 主：蚜蟲
蟎類。
分 佈：浙江。

Streptomyces saraceticus (Berger et al.) (Lee et al., 1996:235-245)

寄 生：*Meloidogyne incognita* 南方根瘤線蟲。
分 佈：臺灣。

Streptomyces sp. 放射菌 (Chen et al., 1996, 12(1):45-46)

寄 主：*Heterodera glycines* 大豆孢囊線蟲。

分 佈：山東。

Nikkomycin 華光霉素 (Cheng et al., 1991:45; Wang et al., 1992:177; Zhang et Zhang, 1999:27)

寄 主：*Panonychus citri* 柑橘葉蟎

Phyllocoptruta oleivora 銹蟎

Piricular iu oryzae 水稻瘟病蟎

Tetranychus cinnabarinus 硃砂葉蟎

Tetranychus vienensis 山楂葉蟎。

分 佈：浙江。

附 註：華光霉素亦稱尼柯霉素，係輪枝鏈霉唐德 S-09 變種 (Streptomycin tendel TVE901) 產生的一種核甘猿類抗生素。

Shaoguanmycin 韶關霉素 (Jiang et al., 1991:6; Liu, 1985:27-32; Liu et al., 1986:93-96)

寄 主：蚜蟲(棉花、蔬菜、果樹、茶、大豆、花卉等植物上)

蟎類

一些鱗翅目害蟲。

分 佈：上海。

Tussah streptococcus phage 柞蠶鏈球菌噬菌體 (Jin et al., 1996:17-19)

寄 主：*Antheraea pernyi* 柞蠶空胴病。

分 佈：吉林、遼寧。

Virus 病毒

(Heilongjing, Mudingjiang FS., 1988[ed.]:130-131; Hong et Yang, 1995, 11(2):84-88; Hou, 1997:75-84; Huang, 1990[ed.]:235-236; Liang et al., 1997, 13(4):179-181; Shi, 1980[ed.]:126; Wu, 1989:332-349; Yue, 1989:202-211, 287-323, 350-368; Zhang et Gu, 1995, 10(3):60-64; Zhang et al., 1997, 13(3):135-139)

Baculoviridae 桿狀病毒科

(Chao et al., 1994:561; Lee et al., 1994:561-562; Liu et Wang, 1996:337; Wang et al., 1996:193-202)

(*Baculovirus* subgroup **A** 桿狀病毒屬 A 亞組)

Nuclear polyhedrosis virus, NPV 核型多角體病毒 (Wu, 1989:45)

Acidalia carticcaria NPV 尺蠖核型多角體病毒 (Tsai et al., 1978:101; Yu et Cai, 1991:61)

寄 主：*Acidalia carticcaria* 尺蠖。

分 佈：廣西(玉林)。

Actias artemis NPV 短尾大蠶蛾核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:61)

寄 主：*Actias artemis* 短尾大蠶蛾。
分 佈：

Actias selene ningpoana NPV 綠尾大蠶蛾核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:61)
寄 主：*Actias selene ningpoana* 綠尾大蠶蛾。
分 佈：

Aglais (=Vanessa) urticae NPV 蕁蛺蝶核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:61)
寄 主：*Aglais urticae* 蕁蛺蝶。
分 佈：

Agrotis tokionis NPV 大地老虎核型多角體病毒 (Liu, 1985:239)
寄 主：*Agrotis tokionis* 大地老虎。
分 佈：

Agrotis ypsilon NPV 小地老虎核型多角體病毒 (Tsai et al., 1978:101; Yu et Cai, 1991:61)
寄 主：*Agrotis ypsilon* 小地老虎。
分 佈：河北。

Agrotis segetum NPV 黃地老虎核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:61)
寄 主：*Agrotis segetum* 黃地老虎。
分 佈：

Alphaea phasma NPV 粉白燈蛾核型多角體病毒 (Chen et al., 1986:166-167; Liu, 1985:233; Yu et Cai, 1991:61)
寄 主：*Alphaea phasma* 粉白燈蛾(褐點粉燈蛾)。
分 佈：雲南(昆明)。

Amata germana NPV 桑鹿蛾核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:61)
寄 主：*Amata germana* 桑鹿蛾。
分 佈：

Ampelophaga rubiginosa NPV 葡萄天蛾核型多角體病毒 (Tsai et al., 1978:101; Yu et Cai, 1991:61)
寄 主：*Ampelophaga rubiginosa* 葡萄天蛾。
分 佈：北京。

Amsacta lactiea NPV 紅緣燈蛾核型多角體病毒 (Liu, 1985:233; Yu et Cai, 1991:61)
寄 主：*Amsacta lactiea* 紅緣燈蛾。
分 佈：

Anisolemnia dilatata NPV 十斑大蟲核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:61)
寄 主：*Anisolemnia dilatata* (Fabricius) 十斑大瓢蟲。
分 佈：

Anomis flava NPV 小造橋蛾核型多角體病毒 (Tu et al., 1989-90:37-42; Yu et Cai, 1991:61)

寄 主：*Anomis flava* 小造橋蛾。

分 佈：上海。

Antheraea pernyi NPV 柞蠶核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:61)

寄 主：*Antheraea pernyi* 柞蠶。

分 佈：

Apochemia cinerarius NPV 沙棗尺蠖核型多角體病毒 (Liu, 1985:235; Qiu et Zhu, 1987:42; Wang, et al., 1984:42-48; Xiao, 1985(2):31; Yu et Cai, 1991:61)

寄 主：*Apochemia cinerarius* 沙棗尺蠖(榆尺蠖、楊尺蠖)。

分 佈：

Aporia crataegi NPV 絹粉蝶核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:61)

寄 主：*Aporia crataegi* 絹粉蝶。

分 佈：

Arctornis alba NPV 茶白毒蛾核型多角體病毒 (Liu, 1985:237; Yu et Cai, 1991:61)

寄 主：*Arctornis alba* 茶白毒蛾。

分 佈：

Arygyrogramma agnata (Staudinger) **NPV** 銀紋夜蛾核型多角體病毒 (Ding, 1982:414; Liu, 1985:243; Shu et al., 1997, 13(3):118-121; Sun, 1981:29-32; Sun et Gao, 1992:33-35; Sun et al., 1982, 8(1):33-35; 25(4): 461-464; Tsia et hu et al., 1981:111-114; Tu et al., 1989-90:37-42; Yan et al., 1983, (2):73-79; Yan et al., 1990, 5(4):53-59; Yu et Cai, 1991:64)

Plusia agnata Staudinger,

寄 主：*Argyrogramma agnata* (Staudinger) 銀紋夜蛾。

分 佈：江蘇、上海、山東、河北(保定)。

Autographa californica (Speyer) **NPV** 苜蓿夜蛾核多角體病毒 (Chen et al., 1993, (4): ; Hou et al., 1999, 26(4):343-346;Hu et al., 1993:257-262; Hui et al., 1997, 13(4):187-189; Kao et al., 2000:23-35; Li et al., 1998, 20(3):118-123; Liu et al., 1994, 16(3):127-133; 1994, 16(4):160-164; 1994, 16(4):170-174; Long et Hong, 1997, 13(3):140-143; Lu et al., 1995:458; Qiu et Zhu, 1986:129-134; 1991:41-44; Shih et Hu, 1996:1-12; Tien et al., 1989:307; Tuan et Kao, 1995:376; Tuan et al., 1997:209-225; Yang et al., 1990, 27(5):287-289; Yao et al., 1984:151-156; Yuan et al., 1999, 15(2):86; Zhou et Zhu, 1991:19-27; Zhu et Zhang, 1984:145-149)

寄 主：*Autographa californica* (Speyer) 苜蓿夜蛾(苜蓿Y紋夜蛾)(Chen et al., 1993(4): ; Yang, 1990, 27(5):287-289)

Argyrogramma agnata (Staudinger) 銀紋夜蛾(代替寄主)

Helicoverpa armigera (Hübner) 玉米穗蟲

Ostrinia furnacalis (Geunée) 亞洲玉米螟

Plutella xylostella (Linnaeus) 小菜蛾

Spodoptera exigua 甜菜夜蛾

Spodoptera litura (Fabricius) 斜紋夜蛾

Trichoplusia ni 擬尺蠖。

分 佈：臺灣、廣東。

Bhima idiota NPV 白楊枯葉蛾核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:61)

寄 主：*Bhima idiota* 白楊枯葉蛾。

分 佈：

Bhima undulosa Walker NPV 柳枯葉蛾核型多角體病毒 (Wu et Chang, 1977:485-486; Yu et Cai, 1991:61)

寄 主：*Bhim undulosa* Walker 柳枯葉蛾。

分 佈：雲南。

Biston marginata NPV 油茶尺蠖核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:61)

寄 主：*Biston marginata* 油茶尺蠖。

分 佈：

Bombyx mori Linnaeus **NPV** 家蠶核型多角體病毒 (Liao, 1990:367; Liao et Chang, 1987:162; 1989:45-48; Lin et al., 1990:367-368; Liu et Hou, 1982:102; 1985:23-30; Long et Hong, 1997, 13(3):140-143; Ma et al., 1988:73-80; Tu et Hou, 1983:80; Wang et al., 1987:413; Xie et al., 1981:336-337; Yen, 1962:53-58; Yu et Cai, 1991:62)

寄 主：*Bombyx mori* Linnaeus 家蠶

Andraca bipunctata Walker 茶蠶。

分 佈：臺灣、養蠶區。

Buzura suppressaria NPV 油桐尺蠖核型多角體病毒 (Dai, 1992:43; Ding et Meng, 1988:179-180; Gan, 1981:372-378; Li, et al., 1991: 191-192; Liang, 1991, 7(1):84-86; Liang et Liu, 1997, 24(2):187-188; Liu, 1985:235; Liu et al., 1985, :9-13; Liu, et al., 1991:204-205; Peng et al., 1988:186-197; Peng, et al., 1991:190-191; Peng et al., 1993, 9(3):119-121; Qi et al., 1985(3):19; Qiu et Zhu, 1987:42; Shi, 1985(3):46; Xu, et al., 1991:197; Yu, 1985:70-71; Yu et Cai, 1991:62; Zhang et al., 1980, : ; Zhang et al. , 1987, (2):60-64; Zhang et al., 1987, (3):5-6; Zhang et al., 1995, 10:56-60; Zhu et al., 1985, (5):14-17; Zeng et al., 1983, (4):1-5)

寄 主：*Buzura suppressaria* (Guenée) 油桐尺蠖。

分 佈：江西、湖南、湖北。

Buzura thibetaria NPV 雲尺蠖核型多角體病毒 (Liu, 1985:235; Tu et al., 1989-90:37-42; Xu, et al., 1991:197; Yu et Cai, 1991:62)

寄 主：*Buzura thibetaria* 雲尺蠖。

分 佈：

Cerura erminea menciana NPV 楊雙尾舟蛾核型多角體病毒 (Sun, 1996, 18(1):13-15)

寄 主：*Cerura erminea menciana* 楊雙尾舟蛾(楊二尾舟蛾)

Clostera anachoreta 楊扇舟蛾

Micromelalopha troglodyta 楊小舟蛾

Phalera fuscescens 榆掌舟蛾

Dictyoploca japonica 銀杏大蠶蛾

Herse convolvuli Linnaeus 甘薯天蛾

Clanis billineata 豆天蛾

Bombyx mori 家蠶
Antheraea pernyi 柞蠶。
分 佈：山東。

Chihuo zao Yang NPV 棗尺蠖核型多角體病毒 (Wang et Kuan, 1986:121-123)
寄 主：*Chihuo zao* Yang 棗尺蠖。
分 佈：華北。

Cifuna locuples Walker NPV 大豆毒蛾核型多角體病毒 (Liu, 1985:237; Qiu et Zhu, 1987:42; Tsia et Ding, 1982:414; Tu et al., 1989-90:37-42; Zhu et al., 1980:105-109)
寄 主：*Cifuna locuples* Walker 大豆毒蛾(肾毒蛾)。
分 佈：浙江(海寧)。

Clanis bilineata tsingtauica Mell NPV 豆天蛾核型多角體病毒 (Sun, 1984, 5:393-394; 1993, 9(1):26-28; Yu et Cai, 1991:62)
寄 主：*Clanis bilineata tsingtauica* Mell 豆天蛾(幼蟲)。
分 佈：山東。

Cnidocampa flaveescens (Walker) NPV 黃刺蛾核型多角體病毒 (Shi, 1986:228; Tsai er al., 1978:102; Yu et Cai, 1991:62)
寄 主：*Cnidocampa flaveescens* (Walker) 黃刺蛾。
分 佈：江西、北京、華北、西北、東北(二北防護林楊樹)。

Corcyra cephalonica NPV 外米綴蛾核型多角體病毒 (Jiang et al., 1986:422)
寄 主：*Corcyra cephalonica* 外米綴蛾。
分 佈：臺灣 。

Creatonotus transiens NPV 八點灰燈蛾核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:62)
寄 主：*Creatonotus transiens* 八點灰燈蛾。
分 佈：

Culcula panterinaria NPV 木橑尺蠖多角體病毒 (Chen et al., 1980:443; Liu, 1985:235; Qiu et Zhu, 1987:42; Tsai et al., 1979:101; Wang et Kuan, 1986:121)
寄 主：*Culcula panterinaria* 木橑尺蠖。
分 佈：山東、北京。

Cyclophragma undans NPV 黃斑波紋雜毛蟲核型多角體病毒 (Tsia et Ding, 1982:413; Yu et Cai, 1991:62)
寄 主：*Cyclophragma undans* 黃斑波紋雜毛蟲。
分 佈：山西。

Cyclophragma undens fasciatella NPV 波紋雜毛蟲核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:62)
寄 主：*Cyclophragma undens fasciatella* 波紋雜毛蟲。

分 佈：

Dappula tertia NPV 黛袋蛾核型多角體病毒 (Wu, et al., 1988:91-94)
寄 主：*Dappula tertia* Templeton 黛袋蛾。
分 佈：廣東。

Dasychira abietis NPV 杉茸毒蛾核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:62)
寄 主：*Dasychira abietis* 杉茸毒蛾。
分 佈：

Dasychira axutha NPV 松茸毒蛾核型多角體病毒 (Liu, 1985:237; Qiu et Zhu, 1987:42; Xiao, 1985(2):32; Yu et Cai, 1991:62)
寄 主：*Dasychira axutha* 松茸毒蛾。
分 佈：

Dasychira baibarna NPV 茶茸毒蛾核型多角體病毒 (Liu, 1985:237; Yu et Cai, 1991:62)
寄 主：*Dasychira baibarna* 茶茸毒蛾。
分 佈：

Dasychira glaucinopera NPV 蔚茸毒蛾核型多角體病毒 (Liu, 1985:237; Yu et Cai, 1991:62)
寄 主：*Dasychira glaucinopera* 蔚茸毒蛾。
分 佈：

Dasychira locuples NPV 腎毒蛾核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:62)
寄 主：*Dasychira locuples* 腎毒蛾。
分 佈：

Dasychira pudibunda Linnaeus **NPV** 蘋毒蛾(茸毒蛾)核型多角體病毒 (Qi et al., 1979, 6(3):33; Yu et Cai, 1991:62)
寄 主：*Dasychira pudibunda* Linnaeus 蘋毒蛾。
分 佈：遼寧。

Deilepltenia ribeata NPV 欉灰尺蠖核型多角體病毒 (Liu, 1985:235; Yu et Cai, 1991:62)
寄 主：*Deilepltenia ribeata* 欉灰尺蠖(大松尺蠖)。
分 佈：

Dendrolimus houi NPV 雲南松毛蟲核型多角體病毒 (Chen et al., 1997, 13(3):122-124; Liang et al., 1984;)
寄 主：*Dendrolimus houi* 雲南松毛蟲。
分 佈：雲南。

Dendrolimus kikuchii NPV 思茅松毛蟲核型多角體病毒 (Chen et al., 1985: ; Chen et al., 1992, (4):5-6; Chen et al., 1997, 13(3):122-124; Yu et Cai, 1991:62)

寄 主：*Dendrolimus kikuchii* 思茅松毛蟲。
分 佈：雲南。

Dendrolimus latipennis NPV 雲南松毛蟲核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:62)
寄 主：*Dendrolimus latipennis* 雲南松毛蟲。
分 佈：

Dendrolimus punctatus NPV 馬尾松毛蟲核型多角體病毒 (Chen et al., 1997, 13(3):122-124; Pu, 1977,: ; Yu et Cai, 1991:62)
寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲。
分 佈：廣東。

Dendrolimus punctatus tehchangensis NPV 德昌松毛蟲核型多角體病毒 (Chen et Wang, 1980, 7(4):140; Chen et al., 1980: ; Chen et al., 1997, 13(3):122-124; Yu et Cai, 1991:62)
寄 主：*Dendrolimus punctatus tehchangensis* 德昌松毛蟲。
分 佈：雲南。

Dendrolimus punctatus wenshanensis NPV 文山松毛蟲核型多角體病毒 (Chen et al., 1997, 13(3):122-124; Zhu et al., 1986: ; Zhu et al., 1991, (5):32)
寄 主：*Dendrolimus punctatus wenshanensis* 文山松毛蟲。
分 佈：雲南。

Dendrolimus superans NPV 落葉松毛蟲核型多角體病毒 (Liu et Zhang, 1993, 15(2):90)
寄 主：*Dendrolimus superans* (Butler) 落葉松毛蟲(幼蟲)。
分 佈：大興安嶺北部。

Dendrolimus suffuscus Lajonquiere NPV 柏毛蟲核型多角體病毒 (Sun et al., 1990:91)
寄 主：*Dendrolimus suffuscus* Lajonquiere 柏毛蟲。
分 佈：山東。

Diprion liuwanensis NPV 六萬松葉蜂核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:62)
寄 主：*Diprion liuwanensis* 六萬松葉蜂。
分 佈：

Diprion nanhuaensis NPV 南華松葉蜂核型多角體病毒 (Zhang et Zhou, 1996, 18(4):184)
寄 主：*Diprion nanhuaensis* 南華松葉蜂(幼蟲)。
分 佈：

Diprion pini NPV 松大葉蜂核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:62)
寄 主：*Diprion pini* 松大葉蜂。
分 佈：

Ectropis excellens NPV 外斑埃尺蠖核型多角體病毒 (Wu et al., 1991, 4(1):72-73; Wu et al., 1997, 13(2):封底)

寄 主：*Ectropis excellens* Butler 外斑埃尺蠖。

分 佈：河南、北京、東北。

Ectropis grisescens NPV 灰茶尺蛾核型多角體病毒 (Chen, et al., 1991:192)

寄 主：*Ectropis grisescens* 灰茶尺蛾。

分 佈：湖北。

Ectropis obliqua Warren **NPV** 茶尺蠖核型多角體病毒 (Chen et al., 1989:168-172; Chen et al., 1986:38, 39; Chen et al., 1987:69-75; Chen, et al., 1991:192; Dai, 1992:43; Hu et al., 1990, 16(2):113-118; Hu et al., 1997:215-220; Liu, 1985:235; Liu et Lan, 1988"38-44; Ye et Hu, 1991:193; Ye et Hu, 1991, 2(3):269-274; Ye et Hu, 1991, 18(3):215-220; Ye et al., 1992:27-33; Ye et al., 1992, 7(3):283-288; Ye et al., 1994, 21(3):231-237; Yu et Cai, 1991:62; Zhang et al., 1981:119-122; Zhang et al., 1986:198-200; Zhao et Ho, 1989:14-17; Zhao et al., 1980:14-17; Zhao et al., 1986:52-59; Zhao et al., 1986:13-16; Zhu et al., 1981:115-118)

寄 主：*Ectropis obliqua hypulina* 茶尺蠖。

分 佈：貴州、浙江、湖北(我國南方茶區)。

Erannis ankeraria Staudinger **NPV** 落葉松尺蠖核型多角體病毒 (Liu, 1985:235; Qiu et Zhu, 1987:42; Sun et al., 1990:46; Xiao, 1985(2):32; Yu et Cai, 1991:62)

寄 主：*Erannis ankeraria* 落葉松尺蠖。

分 佈：河北。

Eriogyna pyretorum NPV 樟蠶核型多角體病毒 (Qiu et Zhu, 1987:42; Xiao, 1985(2):32; Yu et Cai, 1991:62)

寄 主：*Eriogyna pyretorum* 樟蠶。

分 佈：

Euleidae comstock NPV 刺毛蟲核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:62)

寄 主：*Euleidae comstock* 刺毛蟲。

分 佈：

Eumeta minuscuta NPV 小窠袋蛾核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:62)

寄 主：*Eumeta minuscuta* 小窠袋蛾。

分 佈：

Eumeta variegata Snellen **NPV** 大袋蛾核型多角體病毒 (Chen et al., 1980:443; Hu, 1991:185; Sun, 1985(3):13-16; Tsai et al., 1979:101; Yu et Cai, 1991:62)

寄 主：*Eumeta variegata* Snellen 大袋蛾。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、山東。

Euproctis bipunctapex NPV 烏桕毒蛾核型多角體病毒 (Liu, 1985:237; Yu et Cai, 1991:62)

寄 主：*Euproctis bipunctapex* 烏桕毒蛾。

分 佈：

Euproctis conspersa Butler **NPV** 茶黃毒蛾核型多角體病毒 (Dai, 1992:43; Li et al., 1985, (4):15-19; Liu, 1985:237; Liu, et al., 1991:204-205; Qi et al., 1986:43; Qiu et Zhu, 1987:42; Shi et Chen, 1991:194; Shi et al., 1993, 9(3):130-132; Yu et Cai, 1991:63; Zhao et al., 1986, (6):13-16)

=*Euproctis pseudoconspera* Strand

寄 主：*Euproctis conspersa* Butler 茶黃毒蛾。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、貴州、浙江、江蘇、安徽、湖北、陝西；日本、歐洲。。

Euproctis flava NPV 折帶黃毒蛾核型多角體病毒 (Tsia et Ding, 1982:414; Yu et Cai, 1991:62)

寄 主：*Euproctis flava* 折帶黃毒蛾。

分 佈：遼寧。

Euproctis karghalica NPV 綴黃毒蛾核型多角體病毒 (Liu, 1985:237; Yu et Cai, 1991:63)

寄 主：*Euproctis karghalica* 綴黃毒蛾。

分 佈：

Euproctis similis Fuessly **NPV** 桑毛蟲核型多角體病毒 (Qiu et Zhu, 1987:42; Qiu et Zhu, 1988:10; Yu et Cai, 1991:63; Zhang et Zhu, 1984:157-161; Zhu et al., 1975:93-100)

寄 主：*Euproctis similis* Fuessly 桑毛蟲。

分 佈：上海。

Euproctis varians NPV 幻帶黃毒蛾核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:63)

寄 主：*Euproctis varians* 幻帶黃毒蛾。

分 佈：

Euproctis vitellina NPV 卵黃毒蛾核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:63)

寄 主：*Euproctis vitellina* 卵黃毒蛾。

分 佈：

Eupterote chinensis NPV 中華金帶蛾核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:63)

寄 主：*Eupterote chinensis* 中華金帶蛾。

分 佈：

Galleria mellonella NPV 蠟螟核型多角體病毒 (Yuan et al., 1999, 15(2):86)

寄 主：*Galleria mellonella* 蠟螟。

分 佈：

Gastropacha quercifolia NPV 李枯葉蛾核型多角體病毒 (Tsia et Ding, 1982:413; Yu et Cai, 1991:63)

寄 主：*Gastropacha quercifolia* 李枯葉蛾。

分 佈：北京。

Gastropcha quercifolia thibetana NPV 焦褐枯葉蛾核型多角體病毒 (Liang, et al., 1991: 198-199)

寄 主：*Gastropcha quercifolia thibetana* 焦褐枯葉蛾。
分 佈：四川。

Gilpinia massoniana NPV 馬尾松吉松葉蜂病毒 (Zhang et Zhou, 1996, 18(4):184)
寄 主：*Gilpinia massoniana* 馬尾松吉松葉蜂。
分 佈：

Gynaephora ruoergensis NPV 草原毛蟲核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:63)
寄 主：*Gynaephora ruoergensis* 草原毛蟲。
分 佈：

Hadena basilinea NPV 麥穗夜蛾核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:63)
寄 主：*Hadena basilinea* 麥穗夜蛾。
分 佈：

Heliocoverpa armigera NPV 棉鈴蟲核型多角體病毒 (Chen, 1984, 18(3):93-97;Chen et al., 1981, 15(3):88-90; Chen, et al., 1991:203; Chen et al., 1997, 15:219-225; Chen et al., 1990, 17(1):5-10; Hua-zhong, TC. 1978:133-136; 1979, 13(2):18-21; 1980,:108-111; Huang et al., 1985, 9(3):239-240; Jiang et al., 1978, (4):85-92; Jiang et al., 1993,14(1):47-52;Jin et Cai, 1987, 30(4):377-386; Jin-zhou Area MBCS et Hua-zhong NC,BD., 1975,9(1/2):42-53; Kao, 1993:204; Ke et Wu, 1987, 1(1):57-63; Li, et al., 1986, 19(2):121-125; Liu et al., 1998, 14(1):35-37; Lu et al., 11993:63; Qiu et Zhu, 1986:129-134; 1991, 7(2):153-157; Qiu et al., 1988, 8:1-4; Qiu et al., 1988, 8:5-9; Sun et Zhang, 1994, 9(4):310-318; Sun et al., 1999, 15(3):127; Ting et Cai, 1981, 24(2):160-165; Tsai et al., 1981:193-198; Tuan et Hou, 1986:115-116; 1987:162-163; Tuan et al., 1987:163; 1996:336; 1999167-186; Virus Res. Inst. 1980: ; Wang, et al., 1991:189; Wu, 1988, 4(4):373-375; 1990, 24(2):188-194; 1990, 4(3):274-299; 1994, 28(3):383-387; Wu et Wang, 1990, 6(4):352-357; Wu et al., 1991, 25(4):484-488; Xia et Xu, 1983:146-149; Xie et Yang, 1980:129-133; Yang et Xie, 1985:163-169; Yang et Wu, 1988:161-166; Yang et al., 1996, 12(4):150-155; Yu et Cai, 1991:63; Yu et al., 1986, 20(4):499-501; Zhang, 1994, 3(1):39-44; Zhang et Bai, 1991: 186-187; Zhang et al., 1981, 8(4):235-240; Zhang et al., 1982:15; Zhang et al., 1983:63-74; Zhang et al., 1983:101-103; Zhang et al., 1988, 4(4):165-167; Zhang, et al., 1991:201-202; Zhang, et al., 1991:203-204; Zhang et al., 1996, 12(1):1-4; Zhang et al., 1996, 12(1):24-28; Zhang et al., 1998, 25(3):204-208)
寄 主：*Heliocoverpa armigera* (Hübner) 棉鈴蟲(玉米穗蟲)。
分 佈：臺灣、廣東、江蘇、湖北、新疆。

Heliocoverpa assulta Guenée **NPV** 煙青蟲核型多角體病毒 (Tsia et Ding, 1982:414; Yu et Cai, 1991:63)
寄 主：*Heliothis assulta* Guenée 煙青蟲。
分 佈：四川(射洪)。

Helicoverpa zea (Boddie) **NPV** 穀實夜蛾核型多角體病毒 (Wei et Chao, 1991:439)
寄 主：*Helicoverpa zea* (Boddie) 穀實夜蛾。
分 佈：臺灣。

Hyphantria cunea (Drury) **NPV** 美國白蛾核型多角體病毒 (Ai et al., 1984:127-132; Liu et al., 1986:74; Shu et Yu, 1985:93; Qiu et Zhu, 1987:42; Yu et Cai, 1991:63)
寄 主：*Hyphantria cunea* (Drury) 美國白蛾。
分 佈：陝西、山東、遼寧。

Hyphorma minax NPV 長須刺蛾核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:63)

寄 主：*Hyphorma minax* 長須刺蛾。
分 佈：

Iragoides fasciata NPV 茶奕刺蛾核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:63)
寄 主：*Iragoides fasciata* 茶奕刺蛾。
分 佈：

Ivela ochropoda NPV 榆毒蛾核型多角體病毒 (Qiu et Zhu, 1987:42; Xiao, 1985(2):32; Yu et Cai, 1991:63)
寄 主：*Ivela ochropoda* 榆毒蛾。
分 佈：

Junkowskia athleta NPV 茶紋尺蠖核型多角體病毒 (Huang, 1982-83, (3):137-143; Liu, 1985:236)
寄 主：*Jankoskia athleta* 茶紋尺蠖(茶用克尺蛾)。
分 佈：

Latiua gukarat NPV 雙齒綠刺蛾核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:63)
寄 主：*Latiua gukarat* 雙齒綠刺蛾。
分 佈：

Lebeda nobilis NPV 油茶枯葉蛾核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:63)
寄 主：*Lebeda nobilis* 油茶枯葉蛾。
分 佈：

Leucoma salicis Stand. **NPV** 柳毒蛾核型多角體病毒 (Chen et al., 1980:443; Shi, 1986:228; Tsai et al., 1979: 101; Xiao, 1985(2):32)
寄 主：*Leucoma salicis* Stand. 柳毒蛾。
分 佈：山東、北京、華北、西北、東北(三北防護林楊樹)。

Lymantria dispae (Linnaeus) **NPV** 舞毒蛾核型多角體病毒 (Chen et al., 1980:443; Ding et Ma, 1993:272-276; Liao et al., 1999, 15(1):41-44; Qiu et Zhu, 1987:42; Xiao, 1985(2):31; Yan et al., 1993, 9(2):50; Yu et Cai, 1991:63)
寄 主：*Lymantria dispae* (Linnaeus) 舞毒蛾。
分 佈：山東、遼寧。

Lymantria mathura NPV 栗毛蟲核型多角體病毒 (Liu, 1985:238; Tsia et Ding, 1982:414; Yu et Cai, 1991:63)
寄 主：*Lymantria mathura* 栗毛蟲(槲毒蛾)。
分 佈：山東(萊陽)。

Lymantria viola Swinhoe **NPV** 珊毒蛾核型多角體病毒 (Liu, 1985:238; Yu et Cai, 1992:63)
寄 主：*Lymantria violal* Swinhoe 珊毒蛾。
分 佈：

Lymantria xylina Swinhoe **NPV** 木毒蛾核型多角體病毒 (Chen et al., 1987:33-34; Fujian et al.,

1980:184-187; He et al., 1991:31; Kao et al., 2000:23-35; Liu, 1985:238; Xiao, 1985(2):31; Yu et Cai, 1991:63; Yu et al., 1996:338; 1997:11-22)

寄 主：*Lymantria xylina* Swinhoe　木毒蛾(木麻黃毒蛾)。

分 佈：臺灣、福建。

Mahasena colons NPV 褐袋蛾核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:63)

寄 主：*Mahasena colons*　褐袋蛾。

分 佈：

Malacosoma neustria testacea NPV 天幕毛蟲核型多角體病毒 (Tsai et al., 1979:101; Yu et Cai, 1991:63)

寄 主：*Malacosoma neustria testacea*　天幕毛蟲(黃褐天幕毛蟲)。

分 佈：北京。

Mamestra brassicae (Linnaeus) **NPV** 甘藍夜蛾核型多角體病毒 (Chen, et al., 1991:203; Gong et al., 1990:44-46; Liu et al., 1987:84-87; Ni et Zhang, 1991, 7(4):169-171; Pan, 1993, 9(3):106-110; Tsai et al., 1978:102; Wang et al., 1981: ; Xi et Li, 1997, 13(4):154-156; Yu et Cai, 1991:63; Zhang et Zhang, 1988, 19(4):361-364)

寄 主：*Helicoverpa armigera* (Hübner)　棉鈴蟲

Helicoverpa assulta　煙青蟲

Mamestra brassicae (Linnaeus)　甘藍夜蛾。

分 佈：北京、遼寧、黑龍江。

Mamestra trifolii NPV 旋幽夜蛾核型多角體病毒 (Liu, 1985:242)

寄 主：*Mamestra trifolii*　旋幽夜蛾(三葉草夜蛾)。

分 佈：

Mesonura rufonota (Rohwer) **NPV** 樟葉蜂核多角體病毒 (Su et al., 1986:38; Yu et Cai, 1991:63)

寄 主：*Mesonura rufonota* (Rohwer)　樟葉蜂。

分 佈：廣東。

Moricella rufonota Rhower **NPV**　樟葉蜂中腸核型多角體病毒 (Pang et Chen, 1982:43)

寄 主：*Moricella rufonota* Rhower　樟葉蜂。

分 佈：廣東。

Myrteta tinagmaria NPV 小白尺蠖核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:63)

寄 主：*Myrteta tinagmaria*　小白尺蠖。

分 佈：

Mythimna separata (Walker) **NPV** 粘蟲核型多角體病毒 (Cai, 1965, 14(6):535-540; He, et al., 1991: 157; Liu, 1985:242; Tsai, 1965:534-540; Xie et al., 1965:313-317; Yu et Cai, 1991:63)

寄 主：*Mythimna separata* (Walker)　粘蟲。

分 佈：廣東、安徽、北京。

Neodiprion guangxiicus NPV 廣西新松葉蜂病毒 (Zhang et Zhou, 1996, 18(4):184)

寄 主：*Neodiprion guangxiicus* 廣西新松葉蜂(幼蟲)。
分 佈：

Neodiprion xianyunicus NPV 祥雲新松葉蜂病毒 (Zhang et Zhou, 1996, 18(4):184)
寄 主：*Neodiprion xianyunicus* 祥雲新松葉蜂(幼蟲)。
分 佈：

Nototontidae NPV 舟蛾核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:63)
寄 主：Notodontid 舟蛾。
分 佈：

Ocinara varians Walker **NPV** 灰白蠶蛾核型多角體病毒 (Su et al., 1986:38; Yu et Cai, 1991:64)
寄 主：*Ocinara varians* Walker 灰白蠶蛾(榕樹)。
分 佈：廣東。

Oeneria dissoluta NPV 柏毒蛾核型多角體病毒 (Liu, 1985:238)
寄 主：*Oeneria dissoluta* 柏毒蛾。
分 佈：

Operophtera brumata NPV 冬尺蠖核型多角體病毒 (Wang et Kuan, 1986:121)
寄 主：*Operophtera brumata* 冬尺蠖。
分 佈：

Orgyia antiqua NPV 大豆葉毒蛾核型多角體病毒 (He et Zhang, 1991:196; Yu et Cai, 1992:64)
寄 主：*Orgyia antiqua* (Linnaeus) 大豆葉毒蛾(古毒蛾)。
分 佈：黑龍江。

Orgyia ericae Germar **NPV** 灰斑古毒蛾核型多角體病毒 (Dai et Zu, 1996, 12(3):117-122; Sun, 1996, 12(3):141-142; Zhang et al., 1991:93; Zu et Dai, 1997, 13(2):57-60)
寄 主：*Euproctis similis xanthocampa* Dyar 桑毒蛾
Ivela ochropoda Eversmann 榆毒蛾
Leucoma candida Staudinger 楊毒蛾
Lymantria dispae (Linnaeus) 舞毒蛾
Orgyia ericae Germar 灰斑古毒蛾
Orgyia postica Walker 棉古毒蛾
Parocneria furva Leech 側柏毒蛾
Stilpnotia salicis Linnaeus 柳毒蛾
Bombyx mori Linnaeus 家蠶。
分 佈：山東、寧夏。

Orgyia gonostigma NPV 角斑古毒蛾核型多角體病毒 (Liang, et al., 1991:198-199)
寄 主：*Orgyia gonostigma* 角斑古毒蛾。

分 佈：四川、福建、江蘇。

Orgyia parallela NPV 平紋古毒蛾核型多角體毒 (Liang, et al., 1991:198-199)
寄 主：*Orgyia parallela* 平紋古毒蛾。
分 佈：四川。

Orgyia posticus Walker **NPV** 小白紋毒蛾核角體病毒 (Su, 1986:153-158; Su et al., 1986:38)
寄 主：*Orgyia posticus* Walker 小白紋毒蛾(棉古毒蛾，紅花羊蹄夾等)。
分 佈：臺灣、廣東；美國、加拿大。

Pantana phyllostachyase NPV 剛竹毒蛾核型多角體病毒 (Liang, et al., 1991:198-199; Liu, 1985:238; Qiu et Zhu, 1987:42; Xiao, 1985(2):32; Yu et Cai, 1991:64)
寄 主：*Pantana phyllostachyase* 剛竹毒蛾。
分 佈：四川、福建、江蘇。

Papilio xuthus Linnaeus **NPV** 柑橘鳳蝶核型多角體病毒 (Chen et al., 1990:78-79; Qiu et Zhu, 1987:42; Sun, 1988, 15(4):261-264; Yu et Cai, 1991:64)
寄 主：*Papilio xuthus* Linnaeus 柑橘鳳蝶(花椒)。
分 佈：山東。

Paralebada plagifera NPV 櫟毛蟲核型多角體病毒 (Liang, et al., 1991:198-199)
寄 主：*Paralebada plagifera* 櫟毛蟲(水杉枯奎蛾)。
分 佈：四川。

Parasa bicolor NPV 兩色綠刺蛾核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:64)
寄 主：*Parasa bicolor* 兩色綠刺蛾。
分 佈：

Parasa consocia Walker **NPV** 褐邊綠刺蛾核型多角體病毒 (Yan et al., 1985:113-116; Yu et Cai, 1991:64)
寄 主：*Parasa consocia* Walker 褐邊綠刺蛾。
分 佈：山東。

Parasa lepida NPV 麗綠刺蛾核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:64)
寄 主：*Parasa lepida* 麗綠刺蛾。
分 佈：

Parasa sinica NPV 中國綠刺蛾核型多角體病毒 (Tsai et al., 1978:102; Yu et Cai, 1991:64)
寄 主：*Parasa sinica* 中國綠刺蛾。
分 佈：江西、北京。

Parnara guttata NPV 稻苞蟲核型多角體病毒 (He, et al., 1991: 157; Yu et Cai, 1991:64)
寄 主：*Parnara guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲。

分 佈：貴州。

Parnara mathias NPV 隱紋稻弄蝶核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:64)

寄 主：*Parnara mathias* 隱紋稻弄蝶。

分 佈：

Parocneria furva NPV 柏毒蛾核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:64)

寄 主：*Parocneria furva* 柏毒蛾。

分 佈：

Parocneria orienta Chao **NPV** 蜀柏毒蛾核型多角體病毒 (Luo et al., 1998, 14(4):188)

寄 主：*Parocneria orienta* Chao 蜀柏毒蛾。

分 佈：四川。

Pelopidas mathias NPV 隱紋稻苞蟲核型多角體病毒 (He, et al., 1991: 157; Pang et Chen, 1982 4(2):47-48;)

寄 主：*Pelopidas mathias oberthüri* Evans 隱紋稻苞蟲。

分 佈：廣東。

Perina nuda Fabricius **NPV** 榕透翅毒蛾核型多角體病毒 (Chen et Wang, 1994:563; Chung et al., 1994:564; Kao et al., 2000:23-35; Liu et al., 1994:130-131; Su et al., 1986:38; Wang et Tsai, 1995:59-68; Wang et al., 1987:161; 413; 1989:306; 1998:259-271; Yu et Cai, 1991:64)

寄 主：*Perina nuda* Fabricius 榕透翅毒蛾(榕樹)。

分 佈：臺灣、江西、廣東、西藏；日本、印度、斯里蘭卡。

Phalera assimilis NPV 櫟掌舟蛾核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:64)

寄 主：*Phalera assimilis* 櫟掌舟蛾。

分 佈：

Phalera flavescens NPV 蘋掌舟蛾核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:64)

寄 主：*Phalera flavescens* 蘋掌舟蛾。

分 佈：

Phauda flammans NPV 焰斑蛾核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:64)

寄 主：*Phauda flammans* 焰斑蛾。

分 佈：

Phehonosema tendinosaria NPV 蘋煙尺蠖核型多角體病毒 (Liu, 1985:236)

寄 主：*Phehonosema tendinosaria* 蘋煙尺蠖。

分 佈：

Philosamia cynthia NPV 樗蠶核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:64)

寄 主：*Philosamia cynthia* 樗蠶。

分 佈：

Philosamia cynthia ricini NPV 蓖麻蠶核型多角體毒 (Yu et Cai, 1991:64; Zhu et al., 1994, 16(4):151-155)

寄 主：*Philosamia cynthia ricini* 蓖麻蠶。

分 佈：廣東、廣西。

Phthonosema tendinosaria NPV 蘋煙尺蠖核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:64)

寄 主：*Phthonosema tendinosaria* 蘋煙尺蠖。

分 佈：

Pleonomus canaliculatus NPV 溝金針蟲核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:64)

寄 主：*Pleonomus canaliculatus* 溝金針蟲。

分 佈：

Plusia eriosoma NPV 南方銀紋夜蛾核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:64)

寄 主：*Plusia eriosoma* 南方銀紋夜蛾。

分 佈：

Plusia nigrisigna Walker **NPV** 黑點銀紋夜蛾核型多角體病毒 (Sun, 1985(3):45; Sun, 1986, 13(1):71-72; Sun, 1986:98; Yu et Cai, 1991:64)

寄 主：*Plusia nigrisigna* Walker 黑點銀紋夜蛾。

分 佈：山東。

Plutella xylostella NPV 小菜蛾核型多角體病毒 (Yuan et al., 1999, 15(2):85-89)

寄 主：*Plutella xylostella* (Linnaeus) 小菜蛾。

分 佈：

Porthesia atereta NPV 黑褐盜毒蛾核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:64)

寄 主：*Porthesia atereta* 黑褐盜毒蛾。

分 佈：

Porthesia scintillans Walker **NPV** 雙線盜毒蛾核型多角體病毒 (Liu, 1985:239; Su et al., 1986:38; Yu et Cai, 1991:64)

寄 主：*Porthesia scintillans* Walker 雙線盜毒蛾(魚尾菊等)。

分 佈：廣東。

Pristphora sp. **NPV** 楊葉蜂核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:64)

寄 主：*Pristphora* sp. 楊葉蜂。

分 佈：

Rondotia mehciana NPV 桑螨核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:64)

寄 主：*Rondotia mehciana* 桑螨。

分 佈：

Scopelodes contracta NPV 球須刺蛾核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:64)
寄 主：*Scopelodes contracta* 球須刺蛾。
分 佈：

Scopelodes venosa NPV 顯脈球須刺蛾核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:65)
寄 主：*Scopelodes venosa* 顯脈球須刺蛾。
分 佈：

Scopula subkuntaria NPV 尺蠖核型多角體病毒 (Liu, 1985:236; Yu et Cai, 1991:65)
寄 主：*Scopula subkuntaria* 尺蠖(茶銀尺蠖)。
分 佈：

Scotogramma trifolii NPV 旋幽夜蛾核型多角體病毒 (Tsia et Ding, 1982:414; Yu et Cai, 1991:65)
寄 主：*Scotogramma trifolii* 旋幽夜蛾。
分 佈：內蒙古(自治區杭綿)。

Setora postornata NPV 桑褐刺蛾核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:65)
寄 主：*Setora postornata* 桑褐刺蛾(=*Thosea*)。
分 佈：

Setora suberecta NPV 窄斑褐刺蛾核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:65)
寄 主：*Setora suberecta* 窄斑褐刺蛾。
分 佈：

Spilarctia obliqua NPV 塵污燈蛾核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:65)
寄 主：*Spilarctia obliqua* 塵污燈蛾。
分 佈：

Spilarctia subcarnea NPV 人紋污燈蛾核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:65)
寄 主：*Spilarctia subcarnea* 人紋污燈蛾。
分 佈：

Spilosoma lubricipeda NPV 歧污燈蛾核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:65)
寄 主：*Spilosoma lubricipeda* 歧污燈蛾(=*Spilarctia*)。
分 佈：

Spilosoma puncteria NPV 紅腹燈蛾核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:65)
寄 主：*Spilosoma puncteria* 紅腹燈蛾。
分 佈：

Spodoptera exigua (Hübner) NPV 甜菜夜蛾核型多角體病毒 (Huang, et Kao, 1994:343-352; Kao, 1993:204; Kao et Huang, 1990:351; 1992:31-40; 357; Kao et al., 1991:330-334; 2000:23-35; Lee et al., 1996:337-338; Li et al., 1999, 15(4):178-182; Tsai et al., 1978:102; 1995:458; Tuan et al., 1994:33-45; 130; 1996:336; 1999:167-186; Wang et al., 1989:307; Yu et Cai, 1991:65)

寄 主：*Spodoptera exigua* (Hübner) 甜菜夜蛾。

分 佈：臺灣、北京。

Spodoptera frugiperda NPV 秋行軍蟲核型多角體病毒 (Lee et Chao, 1996:335-336; Shih et Hu, 1996:1-12)

寄 主：*Spodoptera litura* (Fabricius) 斜紋夜蛾

Spodoptera frugiperda 秋行軍蟲。

分 佈：臺灣。

Spodoptera litura NPV 斜紋夜蛾核型多角體病毒 (Chang et Shih, 1996:338-339; 1999:51-63; Chen, 1990:103-105; Chiu et Shih, 1996:267-278; Dai, 1973, 16(1):89-90; Fan et al., 1994:563-564; Hou, 1986:59-70; Huang, 1990:128-135; 1991:188-189; Huang, 1995, 17(3):99-105; Huang et Ting, 1975, 18(1):17-24; Huang et Zhang, 1994, 16(1):36-39; Hung et al., 1987:413; Jiang et Liang, 1999, 21(1):13-17; Kao, 1993:204; Kao et al., 1991:330-334; 2000:23-35; Li et Hong, 1989, 23(3):381-385; Liu et al., 1990,:179-184; Lu, 1986, 7(2):33-42; Peng, 1990:46-48; Peng et Liu, 1990:48; Pu et Huang, 1980, 17(3):123; Pu, et al., 1991:187-188; Qiu et Zhu, 1987:42; Shih et Chang, 1996:177-185; Shih et Hu, 1996:1-12; Shih et Lee, 1998:273-283; Shih et Lin, 1995:333-344; Shih et al., 1995:157-167; 169-177; Su, 1989:189-196; 1990:61-67; 1992:227-234; Sun et al., 1999, 15(3):127; Tai, 1973:89-90; Tsai et Wang, 2001:183-195; Tuan et Kao, 1995:458-459; Tuan et al., 1994:33-45; 45-46; 1995:19-33; 47-58; 1996:336; 384; 1998:101-116; 1999:167-186; Wang et al., 1987:413; Xie et al., 1999, 21(22):88; Yang et al., 1990, :124-127; Yen et Huang, 1977:127-132; Yen et Kuo, 1971:182; Yu et Cai, 1991:64; Zhang et Gu, 1996, 35(3):18-22; Zhang et al., 1997, 36(1):54-59; 1997, 36(2):11-16; Zhongshan Univ., 1976, (3):92-97)

寄 主：*Spodoptera litura* (Fabricius) 斜紋夜蛾。

分 佈：臺灣、廣東、湖北、北京。

Stilpnotia candida NPV 楊雪毒蛾核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:65)

寄 主：*Stilpnotia candida* 楊雪毒蛾。

分 佈：

Stilpnotia salicis NPV 楊雪毒蛾核型多角體病毒 (Qiu et Zhu, 1987:42; Tu et al., 1989-90:37-42; Wu, 1989:45; Yu et Cai, 1991:65)

寄 主：*Stilpnotia salicis* 楊雪毒蛾。

分 佈：上海、北京。

Sucra jujuba Chu **NPV** 棗尺蠖(棗步曲)核型多角體病毒 (Xing et al., 1990:133; Xing, 1994, 10(1):40; Yu et Cai, 1991:65)

寄 主：*Sucra jujuba* Chu 棗尺蠖(棗步曲)。

分 佈：河南、山東、山西、河北。

Syngrapha falcifera MNPV 廣譜型芹菜夜蛾核型多角體病毒 (Lu et al., 1997, 13(4):151-153; Yuan et al., 1999, 15(2):86)

寄 主：*Plutella xylostella* (Linnaeus) 小菜蛾

Heliocoverpa armigera (Hübner) 棉鈴蟲

Laphygma exigua 甜菜夜蛾

Syngrapha falcifera 芹菜夜蛾。
分 佈：湖北。

Terpan crionomc subnubigosa NPV 水杉尺蠖核型多角體病毒 (Liang, et al., 1991:198-199)
寄 主：*Terpan crionomc subnubigosa* 水杉尺蠖。
分 佈：四川。

Theophila mandarina NPV 野蠶核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:65)
寄 主：*Theophila mandarina* 野蠶(=*Bombyx*)。
分 佈：

Theretra japonica NPV 雀紋天蛾核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:65)
寄 主：*Theretra japonica* 雀紋天蛾。
分 佈：

Theretra pinastrina NPV 芋單線天蛾核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:65)
寄 主：*Theretra pinastrina* 芋單線天蛾。
分 佈：

Thosea baibarana NPV 褐刺蛾核型多角體病毒 (Tsai et al., 1978:102)
寄 主：*Thosea baibarana* 褐刺蛾。
分 佈：廣東。

Thosea sinensis NPV 扁刺蛾核型多角體病毒 (Tsai et al., 1978:102; Yu et Cai, 1991:65)
寄 主：*Thosea sinensis* 扁刺蛾。
分 佈：江西、湖南、安徽、山東、河北。

Ticera castanea NPV 木麻黃枯葉蛾核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:65)
寄 主：*Ticera castanea* 木麻黃枯葉蛾。
分 佈：

Trabala vishnou NPV 栗黃枯葉蛾核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:65)
寄 主：*Trabala vishnou* 栗黃枯葉蛾。
分 佈：

Trabala vishnou gigantina NPV 櫟黃枯葉蛾核型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:65)
寄 主：*Trabala vishnou gigantina* 櫟黃枯葉蛾。
分 佈：

Trichoplusia ni (Hübner) **NPV** 粉紋夜蛾核多角體病毒 (Li, 1992, 23(2):135-140; Pang et al., 1995, 17(2):90-92; Yu et Cai, 1991:56)
別 名：*擬尺蠖核多角體病毒*。

寄 主：*Argyrogramma agnata* 銀紋夜蛾
Helicoverpa armigera (Hübner) 棉鈴蟲
Spodoptera exigua 甜菜夜蛾
Trichoplusia ni (Hübner) 粉紋夜蛾。
分 佈：廣東、東北。

NPV 木麻黃毒蛾核多角體病毒 (Qiu et Zhu, 1987:42)
寄 主：木麻黃毒蛾。
分 佈：

NPV 椰蛀犀金龜核多角體病毒 (Qiu et Zhu, 1987:42)
寄 主：椰蛀犀金龜。
分 佈：

燕尾鳳蝶核型多角體病毒 (Sun, 1987:159-160)
寄 主：燕尾鳳蝶。
分 佈：

(*Baculovirus* subgroup B 桿狀病毒屬 B 亞組)

Granulosis virus, GV 顆粒體病毒

Actias selen ningpoana GV 綠尾大蠶蛾顆粒體病毒 (Yu et Cai, 1991:65)
寄 主：*Actias selen ningpoana* 綠尾大蠶蛾。
分 佈：

Adoxophyes orana (Fischer von Röslerstamm) **GV** 茶小捲葉蛾顆粒體病毒 (Dai, 1992:43; Gan, 1994:205; Yu et Cai, 1991:65)
寄 主：*Adoxophyes orana* (Fischer von Röslerstamm) 茶小捲葉蛾(棉褐帶捲蛾)
Homona magnanima Diakonoff 茶長捲葉蛾。
分 佈：貴州、湖北。

Agrotis exclamationis (Linnaeus) **GV** 警紋地老虎顆粒體毒 (Huang et al., 1985:155-162; Yu et Cai, 1991:65; Zhu et al., 1980:111-114)
寄 主：*Agrotis exclamationis* (Linnaeus) 警紋地老虎。
分 佈：新疆；蒙古。

Agrotis segetum GV 黃地老虎顆粒體毒 (Dai et al., 1982:17; Yu et Cai, 1991:65; Zhang et al., 1988:110-119; 129-135)
寄 主：*Agrotis segetum* (Denis et Schiffermüller) 黃地老虎(玉米田)。
分 佈：華北、新疆。

Agrotis tokionis GV 大地老虎顆粒體病毒 (Liu, 1985:239; Tsia et Ding, 1982:414; Yu et Cai, 1991:66)

寄 主：*Agrotis tokionis* 大地老虎。
分 佈：北京(圓明園)。

Amsacta lactiea GV 紅緣燈蛾顆粒體病毒 (Liu, 1985:233; Yu et Cai, 1991:66)
寄 主：*Amsacta lactiea* 紅緣燈蛾。
分 佈：

Andraca bipuntatam GV 茶蠶顆粒體病毒 (Chen et Chang, 1983:50-52; Chen et al., 1992:72-76; Ding, et al., 1989:79-81; 1991:194-195; Ding et al., 1999, 15(4):154-156; Yu et Cai, 1991:66)
寄 主：*Andraca bipuntata* Walker 茶蠶。
分 佈：安徽。

Anomis flava GV 棉小造橋蟲顆粒體病毒 (Yin et al., 1991:180-185)
寄 主：*Anomia flava* 棉小造橋蟲。
分 佈：山西(太谷)。

Anoplophora nobilis GV 黃斑星天牛顆粒體病毒 (Yu et Cai, 1991:66)
寄 主：*Anoplophora nobilis* 黃斑星天牛。
分 佈：

Artona funeralis GV 竹斑蛾顆粒體病毒 (Su et al., 1986:38)
寄 主：*Artona funeralis* 竹斑蛾(竹)。
分 佈：廣東。

Clostera anachoreta GV 楊扇舟蛾顆粒體病毒 (Tsai et al., 1978:102; Xiao, 1985(2):31; Yu et Cai, 1991:66)
寄 主：*Clostera anachoreta* 楊扇舟蛾。
分 佈：安徽。

Clostera anastomosis GV 分月扇舟蛾顆粒體病毒 (Tian et al., 1993, 15(4):156; Xiao, 1985(2):32; Yu et Cai, 1991:66)
寄 主：*Clostera anastomosis* (Linnaeus) 分月扇舟蛾(蛹)。
分 佈：黑龍江(海林)。

Cnaphlocrocis medinalis (Guenée) **GV** 稻縱卷葉螟顆粒體病毒 (He, et al., 1991: 156; Yu et Cai, 1991:66)
寄 主：*Cnaphlocrocis medinalis* 稻縱卷葉螟(幼蟲)。
分 佈：廣東、廣西。

Cnidocampa flavescens GV 黃刺蛾顆粒體病毒 (Yu et Cai, 1991:66)
寄 主：*Cnidocampa flavescens* 黃刺蛾。
分 佈：

Darna trima (Moore) **GV** 茶刺蛾顆粒體病毒 (Yang et al., 1994, 21(4):357-361; Yu et Cai, 1991:66)

寄 主：*Darna trima* (Moore) 茶刺蛾(油棕刺蛾)。
分 佈：四川。

Dendrolimus spectabilis Butler GV 赤松毛蟲顆粒病毒 (Chen et al., 1979: ; Chen et al., 1980:443; Chen et al., 1997, 13(3):122-124; Yu et Cai, 1991:66)
寄 主：*Dendrolimus spectabilis* Butler 赤松毛蟲。
分 佈：山東。

Ectropis grisecens GV 茶尺蠖顆粒病毒 (Yu et Cai, 1991:66)
寄 主：*Ectropis grisecens* 茶尺蠖。
分 佈：

Erinnyis ello GV 木薯天蛾顆粒體病毒 (Li, 1991:200)
寄 主：*Erinnyis ello* 木薯天蛾。
分 佈：東北。

Eriogyna pyretorum GV 樟蠶顆粒體病毒 (Xiao, 1985(2):32)
寄 主：*Eriogyna pyretorum* 樟蠶。
分 佈：

Eterusia aedea GV 茶斑蛾顆粒體病毒 (Yu et Cai, 1991:66)
寄 主：*Eterusia aedea* 茶斑蛾。
分 佈：

Mumeta variegata GV 大袋蛾顆粒體病毒 (Yu et Cai, 1991:66)
寄 主：*Eumeta variegata* (Snellen) 大袋蛾。
分 佈：

Helicoverpa armigera GV 棉鈴蟲顆粒體病毒 (Liao et al., 1999, 15(1):41-44)
寄 主：*Helicoverpa armigera* 棉鈴蟲。
分 佈：

Hellula undalis GV 菜螟顆粒體病毒 (Yu et Cai, 1991:66)
寄 主：*Hellula undalis* 菜螟
分 佈：

Homona coffearia GV 柑橘長捲蛾顆粒體病毒 (Yu et Cai, 1991:66)
寄 主：*Homona coffearia* 柑橘長捲蛾
分 佈：

Homona magnanima GV 茶長捲蛾顆粒體病毒 (Yu et Cai, 1991:66)
寄 主：*Homona magnanima* 茶長捲蛾。

分 佈：

Hyphorma minak GV 長須刺蛾顆粒體病毒 (Yu et Cai, 1991:66)

寄 主：*Hyphorma minak* 長須刺蛾。

分 佈：

Iragoides conjuncta GV 棗奕刺蛾顆粒體病毒 (Yu et Cai, 1991:66)

寄 主：*Iragoides conjuncta* 棗奕刺蛾。

分 佈：

Latoia bicolor GV 兩色綠刺蛾顆粒體病毒 (Xiao, 1985(2):32)

寄 主：*Latoia bicolor* 兩色綠刺蛾。

分 佈：

Latoia hilarat GV 雙齒綠刺蛾顆粒體病毒 (Yu et Cai, 1991:66)

寄 主：*Latoia hilarat* 雙齒綠刺蛾。

分 佈：

Latoia lepida (Cramer) **GV** 麗綠刺蛾顆粒體病毒 (Shi, 1987:69; Su et al., 1986:38)

寄 主：*Latoia lepida* (Cramer) 麗綠刺蛾(檬果、八寶樹)。

分 佈：廣東、很廣。

Latoia oryzae GV 水稻綠刺蛾顆粒體病毒 (Yu et Cai, 1991:66)

寄 主：*Latoia oryzae* 水稻綠刺蛾。

分 佈：

Macroglossum bombylans GV 青背喙天蛾顆粒體病毒 (Yu et Cai, 1991:66)

寄 主：*Macroglossum bombylans* 青背喙天蛾。

分 佈：

Mamestra trifolii GV 旋幽夜蛾(三葉草夜蛾)顆粒體病毒 (Liu, 1985:242)

寄 主：*Mamestra trifolii* 旋幽夜蛾(三葉草夜蛾)。

分 佈：

Maruca testulalis Geyer **GV** 野豆螟顆粒體病毒 (Ye et al., 1998, 14(3):119-122)

寄 主：*Maruca testulalis* Geyer 野豆螟。

分 佈：廣西。

Melalopha anachoreta Fabricius **GV** 楊舟蛾顆粒體病毒 (Tsai, 1966:73)

病 毒：*Bergoldiavirus* 顆粒體病毒

寄 主：*Melalopha anachoreta* Fabricius 楊舟蛾(楊樹)。

分 佈：山東(泰山、濟南)。

Melalopha anastomosis GV 分月扇舟蛾顆粒體病毒 (Tsia et Ding, 1982:414)
寄 主：*Melalopha anastomosis* 分月扇舟蛾。
分 佈：內蒙古(自治區林西)。

Ostrinia nubilalis GV 歐洲玉米螟顆粒體病毒 (Yu et Cai, 1991:66)
寄 主：*Ostrinia nubilalis* 歐洲玉米螟。
分 佈：

Parasa bicolor GV 兩色綠刺蛾顆粒體病毒 (Yu et Cai, 1991:66)
寄 主：*Parasa bicolor* 兩色綠刺蛾。
分 佈：

Parasa cansocia Walker **GV** 青刺蛾顆粒病毒 (Chen et al., 1980:444; Xing, 1991:186; Yu et Cai, 1991:66)
寄 主：*Parasa cansocia* Walker 青刺蛾(褐邊綠刺蛾)。
分 佈：山東。

Parasa lepida GV 麗綠刺蛾顆粒體病毒 (Xiao, 1985(2):32; Yu et Cai, 1991:66)
寄 主：*Parasa lepida* 麗綠刺蛾。
分 佈：

Parasa sinica Moore **GV** 蘋綠刺蛾顆粒體病毒 (Tsai, 1966:73; Yu et Cai, 1991:66)
寄 主：*Parasa sinica* Moore 蘋綠刺蛾(核桃、棗、杏)(中國綠刺蛾)。
分 佈：北京。

Parasa sp. **GV** 稻綠刺蛾顆粒體病毒 (He, et al., 1991: 156)
寄 主：*Parasa* sp. 稻綠刺蛾(幼蟲)。
分 佈：廣西。

Parocneria orienta GV 蜀柏毒蛾顆粒體病毒 (Yu et Cai, 1991:66)
寄 主：*Parocneria orienta* 蜀柏毒蛾。
分 佈：

Pieris brassicae GV 大菜粉蝶顆粒體病毒 (Chen et al., 1987:52; Chen et al., 1987:53; Chen et al., 1988, 4(4):137-141; Hu et Wang, 1986:109-112; Meng et Li, 1987:387-392; Wan et Hu, 1987:177-183; Wan et al., 1987, 14(1):1-7; Wang, et al., 1986:371-376; Yu et Cai, 1991:66)
寄 主：*Pieris brassicae* 大菜粉蝶
Pieris rapae 菜粉蝶。
分 佈：浙江、新疆。

Peiris rapae Linnaeus **GV** 菜粉蝶顆粒體病毒(奇威) (Chen et al., 1987, 5(1,2):52; Chen et al., 1988, 4(2):137-141; Chen, et al., 1991:203; Gao, et al., 1991:197-198; Han et al., 1986:188; Hebei, Microbiol. Res. Inst., 1980(4):1-6; Hou, 1986:59-70; Huang et Li, 1983:119; Jiang et al., 1991:6; Jing, 1981:61-67; Liang, 1991: 189-190; Liu et Liang, 1979, :72-78; Liu et Liang, 1981,

(2):69-75; Liu et al., 1981, 1:49-59; Liu et al., 1982, (2):109-114; Liu et al., 1989:34-36; Liu et al., 1991:49-60, 69-75; Peng et Liu, 1990:48; Su, 1985:37-40; 1987:293-296; 412; 397-399; 1989:189-196; Su et al., 1989, 16(3):163-168; Sun et Gao, 1992, 8(1):33-35; Sun, Yet-xian Univ., Dept. Biol. 1977:351; Wan et al., 1987, 14(1):1-7; Wang et Rose, 1976:416-417; Yen et Kuo, 1971:182; Yu et Cai, 1991:66; Zhu, et al., 1991:206)

寄 主：*Pieris rapae* Linnaeus 菜粉蝶
Pieris brassicae 大菜粉蝶
東方粉蝶
斑粉蝶。

分 佈：臺灣、廣東、浙江、山東、北京。

附 註：有用 *Ariogeia rapae* (Linnaeus)

Pieris rapae crucivora Boisduval **GV** 白粉蝶顆粒體病毒 (Kao, 1993:204; Su, 1986:79-82; Wang et Rose, 1978:16-20)

寄 主：*Pieris rapae crucivora* Boisduval 白粉蝶

分 佈：臺灣。

Plutella xylostella (Linnaeus) **GV** 小菜蛾顆粒體病毒 (Hou, 1986:59-70; Hsia et Kao, 1987:412; Kao, 1993:204-206; Kao et Rose, 1975:444; 1976:391-395; Li et al., 1995,29(1):100-103; Liu et Liang, 1979,:72-78; Lu et al., 1998, 14(2):86-87; Meng et al., 1996, 12(2):66-68; Meng et al., 1996, 12(4):519-522; Su, 1987:85-87; 161-163; 293-296; 397-399; 412; 1990:10-23; Yu et Cai, 1991:67; Yuan et al., 1999, 15(2):86)

寄 主：*Pleutella xyylostella* (Linnaeus) 小菜蛾
Spodoptera frugiperda 草地貪夜蛾(轉染 PxGV-DNA)。

分 佈：臺灣、湖北。

Pontia dapliddice GV 花粉蝶顆粒體病毒 (Yu et Cai, 1991:67)

寄 主：*Pontia dapliddice* 花粉蝶。

分 佈：

Psilogramma increta GV 灰白天蛾顆粒體病毒 (Chen et Pang, 1985:170-171)

寄 主：*Psilogramma increta* 灰白天蛾(女貞)。

分 佈：廣東。

Psilogramma menephron GV 霜天蛾顆粒體病毒 (Yu et Cai, 1991:67)

寄 主：*Psilogramma menephron* 霜天蛾。

分 佈：

Scotogramma increta GV 丁香夜蛾顆粒體病毒 (Yu et Cai, 1991:67)

寄 主：*Scotogramma increta* 丁香夜蛾。

分 佈：

Scotogramma trifolii GV 旋幽夜蛾顆粒體病毒 (Yu et Cai, 1991:67)

寄 主：*Scotogramma trifolii* 旋幽夜蛾。

分 佈：

Selepa celtis Moore **GV** 細皮夜蛾顆粒體病毒 (Su et al.,1986:38; Yu et Cai, 1991:67)
寄 主：*Selepa celtis* Moore 細皮夜蛾(八寶樹)。
分 佈：廣東。

Setora postornata (Hampson) **GV** 桑褐刺蛾顆粒體病毒 (Sun, 1985:147-148; Yu et Cai, 1991:67)
寄 主：*Setora postornata* 桑褐刺蛾(*Thosea*)。
分 佈：山東。

Setora siberecta GV 窄斑褐刺蛾顆粒體病毒 (Yu et Cai, 1991:67)
寄 主：*Setora siberecta* 窄斑褐刺蛾。
分 佈：

Spilosoma punctaria GV 紅腹燈蛾顆粒體病毒 (Yu et Cai, 1991:67)
寄 主：*Spilosoma punctaria* 紅腹燈蛾。
分 佈：

Spodoptera litura (Fabricius) **GV** 斜紋夜蛾顆粒體病毒 (Tsai et al., 1978:102; Xie et al., 1999, 21(2):88; Yu et Cai, 1991:67)
寄 主：*Spodoptera litura* (Fabricius) 斜紋夜蛾。
分 佈：河北。

Trichoplusia ni GV 粉紋夜蛾顆粒體病毒 (Liao et al., 1999, 15(1):41-44; Liu et al., 1998, 44:110-112; Liu et al., 1999, 15(4):188-189)
寄 主：*Trichoplusia ni* 粉紋夜蛾(擬尺蠖)。
分 佈：湖北。

旋花天蛾 GV (Yue, et al., 1991:195-196)
寄 主：旋花天蛾。
分 佈：廣西。

雀大背天蛾 GV (Yue, et al., 1991:195-196)
寄 主：雀大背天蛾。
分 佈：廣西。

豆野螟 GV (Yue, et al., 1991:195-196)
寄 主：豆野螟。
分 佈：廣西。

紫螟 GV (Yue, et al., 1991:195-196)
寄 主：紫螟。
分 佈：廣西。

Reoviridae 呼腸孤病毒科
(*Reovirus* 呼腸孤病毒)

Cytoplasmic Polyhedrosis Viruses **CPV** 質型多角體病毒 (Ye, 1980(3):63, 62)

Abraxas miranda CPV 大葉黃楊尺蠖質型多角體病毒 (Liang, et al., 1991:198-199)
寄 主：*Abraxas miranda* 大葉黃楊尺蠖。
分 佈：四川。

Agrotis segetum CPV 黃地老虎質型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:67)
寄 主：*Agrotis segetum* 黃地老虎。
分 佈：

Amsacia lactinea CPV 赤邊燈蛾質型多角體病毒 (Yen et Kuo, 1971:182)
寄 主：*Amsacia lactinea* 赤邊燈蛾。
分 佈：臺灣。

Bombyx mori Linnaeus **CPV** 家蠶質型多角體病毒 (Liaw et Soo, 1981:95-101; Yu et Cai, 1991:67)
寄 主：*Bombyx mori* Linnaeus 家蠶。
分 佈：臺灣；日本。

Cnidocampa flavescens CPV 黃刺蛾質型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:68)
寄 主：*Cnidocampa flavescens* 黃刺蛾。
分 佈：

Dasychira axutha Collenette **CPV** 松茸毒蛾質型多角體病毒 (Liu, 1985:237; Su et al, 1985:456-458; Yu et Cai, 1991:68)
寄 主：*Dasychira axutha* Collenette 松茸毒蛾。
分 佈：廣東(陽江)。

Dasychira grotei Moore **CPV** 線茸毒蛾質型多角體病毒 (Wu et Huang, 1986:124-125; Yu et Cai, 1991:68)
寄 主：*Dasychira grotei* Moore 線茸毒蛾。
分 佈：福建(南平、三明)。

Dendrolimus punctatus CPV 馬尾松毛蟲質型多角體病毒 (Chen et al., 1997, 13(3):122-124; Chen et al., 1990:282-308; Pu, 1973, : ; Xiao, 1985(2):31; Yu et Cai, 1991:68; Zhou et Dai, 1991:199-200)
寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲。
室內接種：
Spodoptera litura (Fabricius) 斜紋夜盜
Gallera mellonella 大蠟螟
Ostrinia furnacalis (Guenée) 玉米螟

Corcyra cephalonica 米蛾

筧麻尺蠖

分 佈：臺灣、廣東、廣西。

Dendrolimus punctatus wenshanensis CPV 文山松毛蟲質型多角體病毒 (Chen et al., 1998, 14(2):48-49; Yu et Cai, 1991:68)

寄 主：*Dendrolimus punctatus wenshanensis* 文山松毛蟲。

分 佈：雲南。

Dendrolimus spectabilis Butler **CPV** 赤松毛蟲質型多角體病毒 (Chen et al., 1979: ; Chen et al., 1980:443; Chen et al., 1997, 13(3):122-124; Huang et Liu, 1987:185; Yu et Cai, 1991:68)

寄 主：*Parasa sinica* 中華綠刺蛾

Botyodes diniasalis 棉捲葉螟

Sylepta derogata 棉大捲葉螟

Dendrolimus punctata (Walker) 馬尾松毛蟲

Dendrolimus spectabilis Butler 赤松毛蟲

Gastropacha populifolia 楊枯葉蛾

Clostera anachoreta 楊扇舟蛾

Stilpaotia candida 柳毒蛾

Rhyparioides amurensis 肖渾黃燈蛾

Autographa nigrisigna 黑點銀紋夜蛾

Helicoverpa armigera 棉鈴蟲

Mamestra brassicae 甘藍夜蛾

Mythimna separata (Wakler) 粘蟲。

分 佈：江蘇、山東、河北。

Dendrolimus spectabilis CPV 赤松毛蟲質型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:68)

寄 主：*Dendrolimus spectabilis* 赤松毛蟲。

分 佈：

Dendrolimus superans (Butler) **CPV** 落葉松毛蟲質型多角體病毒 (Liu et Zhang, 1993, 15(2):90)

寄 主：*Dendrolimus superans* (Butler) 落葉松毛蟲。

分 佈：大興安嶺北部。

Dendrolimus tabulaeformis CPV 油松毛蟲質型多角體病毒 (Chen et al., 1997, 13(3):122-124; Pu et al., 1979: ; Yu et Cai, 1991:68)

寄 主：*Dendrolimus tabulaeformis* 油松毛蟲。

分 佈：遼寧。

Dendrolimus punctatus tehchangensis CPV 德昌松毛蟲質型多角體病毒 (Chen et al., 1983: ; Chen et al., 1997, 13(3):122-124; Yu et Cai, 1991:68)

寄 主：*Dendrolimus punctatus tehchangensis* 德昌松毛蟲。

分 佈：雲南。

Dendrolimus punctatus wenshanensis CPV 文山松毛蟲質型多角體病毒 (Chen et al., 1983: ; Chen et al., 1987, (2):35; Chen et al., 1988, (3):54; Chen et al., 1997, 13(3):122-124; Liu et al., 1992, 7(1):69-73; Peng et al., 1998, 14(3):111-114)

寄 主：*Dendrolimus punctatus wenshanensis* 文山松毛蟲。

分 佈：雲南。

Discophora tullia CPV 竹環紋蝶質型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:68)

寄 主：*Discophora tullia* 竹環紋蝶

分 佈：

Euproctis pseudoconspersa CPV 茶黃毒蛾質型多角體病毒 (Liu, 1985:237)

寄 主：*Euproctis conspersa* (Butler) 茶黃毒蛾

分 佈：

Euproctis similis CPV 盜毒蛾質型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:68)

寄 主：*Euproctis similis* 盜毒蛾(*Porthesia*)。

分 佈：

Helicoverpa armigera (Hübner) **CPV** 棉鈴蟲質型多角體病毒 (Chier et al., 1986:92, 91; Yu et Cai, 1991:68; Yue et al., 1981:475-476)

寄 主：*Helicoverpa armigera* (Hübner) 棉鈴蟲。

分 佈：上海。

Helicoverpa assulta CPV 煙草夜蛾質型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:68)

寄 主：*Helicoverpa assulta* 煙草夜蛾。

分 佈：

Hyphantria eunea CPV 美國白蛾質型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:68)

寄 主：*Hyphantria eunea* 美國白蛾。

分 佈：

Leucoma salicis Stand. **CPV** 柳毒蛾質型多角體病毒 (Chen et al., 1980:443)

寄 主：*Leucoma salicis* Stand. 柳毒蛾。

分 佈：山東。

Lymantria disper CPV 舞毒蛾質型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:68)

寄 主：*Lymantria disper* 舞毒蛾。

分 佈：

Maruca testulalis Geyer **CPV** 豆野螟質型多角體病毒 (Ye et al., 1998, 14(4):187-188)

寄 主：*Maruca testulalis* Geyer　豆野螟。
分 佈：廣西。

Micromelalopha troglodgta CPV 楊小舟蛾質型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:68)
寄 主：*Micromelalopha troglodgta*　楊小舟蛾。
分 佈：

Pectinophora gossypeilla CPV 紅鈴蟲質型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:68)
寄 主：*Pectinophora gossypeilla*　紅鈴蟲。
分 佈：

Pleonomus canaliculatus CPV 溝金針蟲質型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:68)
寄 主：*Pleonomus canaliculatus*　溝金針蟲。
分 佈：

Rondotia menciana CPV 桑蟥質型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:68)
寄 主：*Rondotia menciana*　桑蟥。
分 佈：

Selepa celtes CPV 細皮夜蛾質型多角體病毒 (Wu et al., 1988:91-94; Yu et Cai, 1991:68)
寄 主：*Selepa celtes* Moore　細皮夜蛾。
分 佈：廣東。

Spodoptera litura (Fabricius) **CPV** 斜紋夜蛾質型多角體病毒 (Xie et al., 1999, 21(2):88)
寄 主：*Spodoptera litura* (Fabricius)　斜紋夜蛾。
分 佈：

Setora postornata CPV 桑褐刺蛾質型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:68)
寄 主：*Setora postornata*　桑褐刺蛾(=*Thosea*)。
分 佈：

Stilpnotia salicis CPV 雪毒蛾質型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:68)
寄 主：*Stilpnotia salicis*　雪毒蛾。
分 佈：

Theophila mandarina CPV 野蠶質型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:68)
寄 主：*Theophila mandarina*　野蠶(=*Bombyx*)。
分 佈：

Yponpmenia padella CPV 蘋果巢蛾質型多角體病毒 (Yu et Cai, 1991:68)
寄 主：*Yponpmenia padella*　蘋果巢蛾。
分 佈：

Iridoviridae 虹彩病毒科

Iridoviruses 虹彩病毒 IV

Spodoptera litura (Fabricius) **IV** 斜紋夜蛾虹彩病毒 (Xie et al., 1999, 21(2):88)
寄 主：*Spodoptera litura* (Fabricius) 斜紋夜蛾。
分 佈：

Poxviridae 痘病毒科

Entomopoxvirus **EPV** 昆蟲痘病毒

Dendroctonus armandi EPV 華山松大小蠹痘病毒 (Yu et Cai, 1991:67)
寄 主：*Dendroctonus armandi* 華山松大小蠹。
分 佈：

Gromphocerus sibiricus EPV 西伯利亞蝗痘病毒 (Liu, 1985:246; Yu et Cai, 1991:67)
寄 主：*Gromphocerus sibiricus* 西伯利亞蝗。
分 佈：

Mythimna separata (Walker) **EPV** 粘蟲痘病毒 (He, et al., 1991: 157; Li, 1999, 15(1):41-44; Liu, 1985:242; Yu et Cai, 1991:67)
寄 主：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲。
分 佈：河南、吉林。

Oedaleus asiaticus EPV 亞洲小車蝗痘病毒 (Gao et al., 1997, 13(4):157-158; Wang, 1994, 27(4):60-63; Wang et al., 1997, 13(1):17-19)
寄 主：*Oedaleus asiaticus* 亞洲小車蝗
Oedaleus infernalis 黃脛小車蝗。
分 佈：內蒙古。

Proagopertha lucidula EPV 蘋毛麗金龜痘病毒 (Ding et Tsia, 1985:30-35; Yu et Cai, 1991:67)
寄 主：*Proagopertha lucidula* Falderman 蘋毛麗金龜。
分 佈：北京。

楊扇舟蛾痘病毒 (Liang et Liu, 1995, 21(6):42)
寄 主：楊扇舟蛾。
分 佈：湖北。

Parvoviridae 細小病毒科

Densonucleosis Viruses **DNV** 濃核病毒 **DNV**

Binbyx mori DNV 家蠶濃核症病毒 (Huang, et al., 1991:245; Yu et Cai, 1991:67)

寄 主：*Binbyx mori* 家蠶。

分 佈：

Catopsilia crocala DNV 鐵刀木粉蝶濃核症病毒 (Yu et Cai, 1991:67)

寄 主：*Catopsilia crocala* 鐵刀木粉蝶。

分 佈：

Dendrolimus punctatus DNV 馬尾松毛蟲濃核症病毒 (Chen et al., 1997, 13(3):122-124; Liang et al., 1983: ; Yu et Cai, 1991:67)

寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲。

分 佈：廣西。

Galleria mellonella DNV 大蠟螟濃核症病毒 (Huang, et al., 1991:245)

寄 主：*Galleria mellonella* 大蠟螟。

分 佈：

Odontosina morosa DNV 愚肖齒舟蛾濃核症病毒 (Yu et Cai, 1991:67)

寄 主：*Odontosina morosa* 愚肖齒舟蛾。

分 佈：

Periplaneta fulgionosa DNV 黑胸大蠊濃核症病毒 (Huang, et al., 1991:245; 1994:16-19)

寄 主：*Periplaneta fulgionosa* 黑胸大蠊。

分 佈：湖北。

Pieris rapae Linnaeus **DNV** 菜粉蝶濃核症病毒 (Yu et Cai, 1991:67)

寄 主：*Pieris rapae* Linnaeus 菜粉蝶。

分 佈：

(*Enterovirus* 腸道病毒屬)

Acute bee parlysis virus **APV** 蜂急性痲痺病毒

Diprion sp. **APV** 松葉蜂腸型核角體病毒 (Xiao, 1985(2):32)

寄 主：*Diprion* sp. 松葉蜂。

分 佈：

Mesoneura rufonota APV 樟葉蜂腸型核角體病毒 (Xiao, 1985(2):23)

寄 主：*Mesoneura rufonota* 樟葉蜂。

分 佈：

Picornaviridae 微核糖核酸科

白蟻病毒 (Hu, et al., 1991:245-246)
寄 主：白蟻。
分 佈：江蘇。

未定昆蟲病毒

Antheraea pernyi 柞蠶病毒 (Yu et Cai, 1991:68)
寄 主：*Antheraea pernyi* 柞蠶。
分 佈：

Apis mellifera 意大利蜂囊狀病毒 (Yu et Cai, 1991:68)
寄 主：*Apis mellifera* 意大利蜂。
分 佈：

Apis mellifera 意大利蜂慢性麻痹病毒 (Yu et Cai, 1991:68)
寄 主：*Apis mellifera* 意大利蜂。
分 佈：

Apis sinensis 中華蜜蜂大幼蟲病毒 (Yu et Cai, 1991:69)
寄 主：*Apis sinensis* 中華蜜蜂。
分 佈：

Apis sinensis 中華蜜蜂囊狀幼蟲病病毒 (Yu et Cai, 1991:69)
寄 主：*Apis sinensis* 中華蜜蜂。
分 佈：

Latoia hilarat 雙齒綠刺蛾病毒 (Yu et Cai, 1991:69)
寄 主：*Latoia hilarat* 雙齒綠刺蛾。
分 佈：

Leptothorax congruus 似細胸蟻(家蟻)病毒 (Yu et Cai, 1991:69)
寄 主：*Leptothorax congruus* 似細胸蟻(家蟻)。
分 佈：

Netria viridescens 梭舟蛾病毒 (Yu et Cai, 1991:69)
寄 主：*Netria viridescens* 梭舟蛾。
分 佈：

Odentotermes formosanus Shiraki 黑翅土白蟻病毒 (Yu et Cai, 1991:69)
寄 主：*Odentotermes formosanus* Shiraki 黑翅土白蟻。
分 佈：

Plutella xylostela Linnaeus 小菜蛾病毒 (Yu et Cai, 1991:69)
寄 主：*Plutella xylostela* Linnaeus 小菜蛾。
分 佈：

Stora sp. 刺蛾病毒 (Yu et Cai, 1991:69)
寄 主：*Stora* sp. 刺蛾。
分 佈：

Trialeurodes vaporaiorum (Westwood) 溫室粉蝨病毒 (Yu et Cai, 1991:69)
寄 主：*Trialeurodes vaporaiorum* (Westwood) 溫室粉蝨。
分 佈：

EUMYCOTA 真菌門(Fungi)

(Huang et al., 1997:260-266; Huo, 1997:75-84; Li, 1997:1-5; Tseng et al., 1989:307; Wu, 1989:212-229, 258-286, 332-349; Yue, 1989:202-211, 350-368; Zhang et al., 1996, 22(1):43-46; Zhang et al., 1997:32-36)

MASTIGOMYCOTINA 鞭毛菌亞門

BLASTOCLADIALES 芽枝菌目(厚囊瓶菌目)

Coelomomycetaceae 雕蝕菌科(蚊菌科)

Coelomomyces indica 印度雕蝕菌 (Liu et Hsu, 1982:409-412)
寄 主：*Culex tritaeniorhynchus* 三帶喙庫蚊(幼蟲血腔中)。
分 佈：上海。

OOMYCETES 卵菌綱

Lagenidiaceae 葫蘆菌(水綿菌科)

Lagenidium giganteum Couch 大鏈壺菌 (Zhang et al., 1996, 22(1):43-46; Zhou et Su, 1996, 12(3):123-126)
寄 主：蚊。
分 佈：貴州；美國。

ZYGOMYCETES 接合菌亞門

MUCORALES 毛霉目(酵黴目)

Mucoraceae 毛霉科(酵黴科)

Mucor fragilis Bainier 易脆毛霉 (He, et al., 1991:152)
寄 主：稻飛蝨

稻葉蟬
Chilo suppressalis (Walker)　二化螟
Scirpophaga incertulas (Walker)　三化螟
Sesamia inferens (Walker)　大螟。
分 佈：湖南。

Mucor mucedo (Linnaeus) Fresenius 大毛霉 (He, et al., 1991:152)
寄 主：稻飛蝨
稻葉蟬
Chilo suppressalis (Walker)　二化螟
Scirpophaga incertulas (Walker)　三化螟
Sesamia inferens (Walker)　大螟。
分 佈：湖南。

Mucor rufescens Fishcher 歪孢毛霉 (He, et al., 1991:152)
寄 主：*Chilo suppressalis* (Walker)　二化螟
Scirpophaga incertulas (Walker)　三化螟
Sesamia inferens (Walker)　大螟。
分 佈：湖南。

Rhizopus cohnii Berlese et de Toni 科恩根霉 (He, et al., 1991:152)
寄 主：稻飛蝨
稻葉蟬
Chilo suppressalis (Walker)　二化螟
Scirpophaga incertulas (Walker)　三化螟
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée)　稻縱捲葉螟
Mythimna separata (Walker)　粘蟲
Sesamia inferens (Walker)　大螟
Parnara guttata guttata (Bremer et Grey)　稻苞蟲。
分 佈：湖南。

Mortierellaceae 被孢霉科(腐植菌科)

Haplosporangium sp. 單囊霉 (He, et al., 1991:152)
寄 主：稻飛虱
稻葉蟬
稻綠蝽
黃肩蝽
Sesamia inferens (Walker)　大螟
Mycalesis gotama Moore　稻眼蝶。
分 佈：湖南。

ENTOMOPHTHORALES 蟲霉目

(Feng, 1997:6-17)

Aucylistaceae 新月霉科

Conidiobolus apiculatus (Taxter) Rem. et Kell 尖突耳霉 (Huang, et al.,:156-159)
寄 主：*Telligoniella spectra* 大白葉蟬
Nephotettix virescens (Distant) 黑尾葉蟬。
分 佈：福建。

Conidiobolus major 大孢耳霉 (Li et Kang, 1989:82-83; Zhen, et al.,:160-162)
寄 主：*Nilaparvata bakeri* 擬褐飛虱
Lipaphis erysimi Kaltenbach 蘿蔔蚜
Myzus persicae Sulzen 桃蚜。
分 佈：福建、湖南。

Conidiobolus obscurus 暗孢耳霉 (Cheng, 1991:167-168; Li, 1999, 15(1):35-40; Li et Kang, 1989:82-83; Tzen et al., 1997:46-47)
寄 主：*Hyadaphis erysimi pseudobrassicae* (Davis) 菜縊管蚜(蟲屍磚紅色)。
分 佈：北京、天津。

Conidiobolus osmodes 有味耳霉 (Cheng, 1991:167-168)
寄 主：*Hyadaphis erysimi pseudobrassicae* (Davis) 菜縊管蚜(蟲屍褐色)
分 佈：北京、天津。

Conidiobolus thremboides Drechsler 塊狀耳霉 (Lu, et al., 1988:168-171)
寄 主：*Sitobion avenae* (Fabricius) 麥長管蚜
Myzus persicae 桃蚜。
分 佈：山東。

Conidiobolus sp. 耳霉 (Yuan et al., 1999, 15(2):88)
寄 主：*Plutella xylostella* 小菜蛾。
分 佈：

Entomophthoraceae 蟲霉科

(Li, 1984:129-140)

Aleternalia sp. 交鏈孢霉 (Li, 1987:195)
寄 主：*Myzus persicae* (Sulzer) 桃蚜
Rhopalsiphnum pseudobrassicae (Davis) 菜縊管蚜
Pieris rapae Linnaeus 菜粉蝶(菜青蟲)

黃守瓜
黑守瓜
猿葉蟲
潛葉蠅
甘薯麥蛾
一種小葉蟬。
分 佈：湖南。

Conidiobolus coronatus Batko 冠耳霉 (Chang, 1987:171; Li, 1987:236; Li et Kang, 1989:82-83)
=*Entomophthora coronata* Kevork
寄 主：土壤腐生物，偶侵染昆蟲。因能引起人和馬的鼻腔瘤，故無應用價值。
Lipaphis erysimi Kaltenbach 蘿蔔蚜
Myzus persicae Sulzen 桃蚜。
分 佈：臺灣、湖南。

Conidiobolus major Rem. et Kell. 大孢耳霉 (Li, 1987:236)
=*Entomophthora major* Gustafs.
寄 主：
分 佈：

Conidiobolus obscurus Rem. et Kell. 暗孢耳霉 (Li, 1987:236; Li et Kang, 1989:82-83)
=*Entomophthora obscurus* Hall et Dunn
=*Entomophthora ignobilis* Hall et Dunn
=*Entomophthora thaxteriana* Hall et Dunn
=*Entomophthora planchoniana* Seusu Thaxt.
寄 主：*Lipaphis erysimi* Kaltenbach 蘿蔔蚜
Myzus persicae Sulzen 桃蚜。
分 佈：湖南；法國已試用于大田，英、美、瑞士等則小面積試用。

Conidiobolus osmodes Drechsler 有味耳霉 (Li, 1987:237)
寄 主：
分 佈：

Curvularia sp. 彎孢霉 (Li, 1987:195)
寄 主：*Myzur persicae* (Sulzer) 桃蚜
Rhopalsiphnum pseudobrassicae (Davis) 菜縊管蚜
黑守瓜
菜螟
Pieris rapae Linnaeus 菜粉蝶(菜青蟲)
葉螨。
分 佈：湖南。

Curvularia sp. 彎孢霉菌 (Lin, 1990:30)

寄 主：*Heterodera glycines* 大豆孢囊線蟲。
分 佈：江蘇。

Entomophthora aphidis Hoffman 蚜蟲霉 (He, et al., 1991:152; Li, 1987:194; Li, 1987:237; Yang, 1993, 19(2):43; Yen et Kao, 1972:87-88)
=*Empusa* (*Entomophthora*) *aphidis* Hoffm.
別 名：*蚜蟲疫霉*。
寄 主：*Nephotettix virescens* (Distant) 黑尾葉蟬
Telligoniella spectra 白大葉蟬
Nilaparvata lugens (Stål) 褐飛蝨
Sogatella furcifera (Horvàth) 白背飛蝨
Myzus persicae (Sulzus) 桃蚜
Rhopalsiphnum pseudobrassicae (Davis) 菜縊管蚜
Sitobion avenae (Fabricius) 麥長管蚜
Toxoptera citricidus (Kirkaldy) 大橘蚜
短痣蚜(梾木上)
多種蚜蟲。
分 佈：臺灣、福建、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、河南、河北、天津、吉林。

Entomophthora coronata (Costantin) Kevorkian 冠蟲霉 (He, et al., 1991:153)
寄 主：*Nilaparvata lugens* (Stål) 褐飛蝨
Sogatella furcifera (Horvàth) 白背飛蝨
Laedelphax striatella (Fallen) 斑飛蝨
Nisia aatrovenosa 花稻蝨
Nephotettis virescens (Distant) 黑尾葉蟬
Inazuma dorscalis (Motschulsky) 電光葉蟬。
分 佈：福建、湖南。

Entomophthora delphacis Hori 飛蝨蟲霉 (Cai, 1987:169-171; He, et al., 1991:153; Li, 1984:132-135; Li, 1987:237)
寄 主：*Nilaparvata lugens* (Stål) 褐飛蝨
Sogatella furcifera (Horvàth) 白背飛蝨
Laedelphax striatella (Fallen) 斑飛蝨
Nisia atrovenosa 花稻蝨
Recilia dorscalis (Motschulsky) 電光葉蟬
稻蚜
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟。
分 佈：湖南。

Entomophthora fleridana 蟲生藻菌 (Huang, 1990[ed.]:233-235)
寄 主：柑橘粉蝨
柑橘葉蟎。
分 佈：

Entomophthora fresenii Now 弗氏蟲霉 (Li, 1987:194; Li et al., 1997,24(2):147-149; Pu, 1985:27-31; Tang, 1988:145-150; Zhang, 1987:121-123; Zhang et al., 1983, (15):948-951; Zhang, et al., 1991:169; Zhang et al., 1996, 22(1):43-46)

別 名：*弗雷生蚜霉菌*。

寄 主：*Aphis gossypii* Glover 棉蚜

Aphis madicagenis 花生蚜

Myzus persicae (Sulzer) 桃蚜

菜縊管蚜

甘藍蚜。

分 佈：湖南、陝西；亞洲、歐洲、北美洲。

Entomophthora gracilis 細蟲疫霉 (Li et Kang, 1989:82-83)

寄 主：*Lipaphis erysimi* Kaltenbach 蘿蔔蚜

Myzus persicae Sulzen 桃蚜。

分 佈：湖南。

Entomophthora grylli Presenius 蝗蟲霉 (Feng et Zhang, 1989:156; Feng et al., 1991:18; Feng et al., 1994, 10(3):142; He, et al., 1991:153)

別 名：*蝗蟲噬霉菌*。

寄 主：*Atractomorpha bedeli* 尖頭蚱蜢

Oedaleus infernalis 小車蝗

Oxya 小稻蝗

Oxya chinensis 中華稻蝗。

分 佈：福建、廣東、雲南、山西、新疆。

Entomophthora muscae (Cohn) Fresenius 蠅蟲霉 (Tzean et al., 1997:48-49)

Entomophthora muscae (Cohn) Fresenius, 1856, 14:883.

寄 主：蠅類。

分 佈：臺灣。

Entomophthora planchoniana Corun 普氏蟲生霉 (Li, 1987:237; Li et Kang, 1989:82-83; Ye et al., 1994(4):17)

=*Entomophthora ferruginea* Phil.,

=*Entomophthora chromaphidis* Burg. et Swa.

寄 主：*Aphis citricola* van der Goot 橘捲葉蚜

Lipaphis erysimi Kaltenbach 蘿蔔蚜

Myzus persicae Sulzen 桃蚜。

分 佈：湖南、我國廣泛分佈。

Entomophthora radieans 圓孢蟲疫霉 (Dai, 1992:43)

寄 主：茶尺蠖。

分 佈：貴州、安徽。

Entomophthora sphaerosperma Fresenius 圓孢霉菌 (He, et al., 1991:153; Zhang, 1985[ed.]:153)

寄 主：*Empoasca flavescens* (Fabricius) 小綠葉蟬(茶)
Nilaparvata lugens (Stål) 褐飛蝨(成蟲)
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟(幼蟲)。
分 佈：雲南、安徽。

Entomophthora tharteriana (Petch) Hall et Bell 蟲霉 (He, et al., 1991:153)
寄 主：*Nephotettix virescens* (Distant) 黑尾葉蟬
Mythimna separata (Walker) 粘蟲。
分 佈：安徽。

Entomophthora virulenta Hall et Dunn 毒力蟲霉 (Anon., 1996, 12(3):102; 1997, 13(2):56; Cheng, 1991:167-168; Li, 1987:237; Meng et al., 1997, 13(2):90-92; Wang et al., 1997:70-73; Wang et al., 1997:74-77; Zhang et al., 1997:64-69; Zhao et al., 1994, 10(2):66-68; Zhou et Cheng, 1991:168-169)
=*Conidiobolus thromboides* Drechsler
別 名：*塊狀耳霉*。
寄 主：*Aphis citricola* van de Goot 蘋果黃蚜
Aphis gossypii Glover 棉蚜(石榴上)
Hyadaphis erysimi pseudobrassicae (Davis) 菜縊管蚜(蟲屍黑褐色)
Hyalopterus arundinis (Fabricius) 桃粉大尾蚜
Lipaphis erysimi Kaltenbach 蘿蔔蚜
Myzus persicae (Sulzer) 桃蚜
對天敵的草蛉、瓢蟲、蚜繭蜂不傷害。
分 佈：湖南、河南、北京、天津。

Entomophthora (Tarichium) sp. 蟲霉 (Wang, 1981(3):56-57; 1988:165-167)
寄 主：*Spilarctia obliqua* Walker 塵白燈蛾。
分 佈：廣東(廣州)。

Entomophthora sp. 蟲霉 (He, et al., 1991:153; Tsai et Yen, 1969:175-176; Yen et Tsai, 1970:15-20)
寄 主：飛蝨
Nephotettix cincticeps (Uhler) 僞黑尾葉蟬
稻蚜
Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟
Chilo suppressalis (Walker) 二化螟
Sesamia inferens (Walker) 大螟
Mycalesis gotama Moore 稻眼蝶。
分 佈：臺灣、湖南、雲南、浙江、上海(是否同種?)。

Entomophthora sp. 舞毒蛾蟲霉 (Hou et Wang, 1988:152)
寄 主：*Lymantria dispar* Linnaeus 舞毒蛾。
分 佈：黑龍江。

Entomophthora sp. 蟲霉 (Lu, et al., 1988:168-171)
寄 主：*Myzus persicae* 桃蚜
Lipaphis erysimi (Kaltenback) 蘿蔔蚜。
分 佈：山東。

Entomophthora sp. 蟲霉 (Lu, et al., 1988:168-171)
寄 主：*Myzus persicae* (Sulzer) 桃蚜(辣椒上)。
分 佈：山東。

Entomophthora sp. 黑翅蕈蠅蟲霉 (Lin et al., 1977:234)
寄 主：*Bradysia tritici* (Coquillett) 黃帶黑翅蕈蠅(成蟲)。
分 佈：臺灣。

Entomophthora sp. 塔薩蟲霉 (Zhang et al., 1990, 17(2):162)
寄 主：蚜蟲。
分 佈：

Erynia anhuiensis Li 安徽蟲疫霉 (Wang, et al., 1988:154)
寄 主：
分 佈：安徽。

Erynia canadensis Humb. et Ben-Zéev 加拿大蟲疫霉 (Li, 1987:237)
Entomophthora canadensis Maeleod et al.,
=*Entomophthora aphidis,* Sensu Grobler et al.,
寄 主：松綿蚜。
分 佈：

Erynia erinacea Rem. et Henn. 蝟孢蟲疫霉 (Li, 1987:237; Li et Kang, 1989:82-83)
Zoophthora erinacea Ben-Zéev et Kenn.,
寄 主：*Lipaphis erysimi* Kaltenbach 蘿蔔蚜
Myzus persicae Sulzen 桃蚜。
分 佈：湖南。

Erynia neoaphidis Remaudière et Hennebert 新蚜蟲疫霉 (Li, 1987:238; Li et Kang, 198982-83; Lu, et al., 1988:168-171; Tzean et al., 1997:50-51; Qiu et al., 1989:1-4; Zhang, et al., 1988:140-144)
=*Entomophthora aphidis* sensu Thaxt., Nowak., et Batko,
寄 主：*Rhoopalosiphum pseudobrassicae* 菜縊管蚜(白菜、蘿蔔、甘藍等十字花科蔬菜上)
Lipaphis erysimi Kaltenbach 蘿蔔蚜
Macrosiphum granarium (Kirby) 麥長管蚜
Myzus persicae Sulzer 桃蚜
Cavariealla salicicola 柳二尾蚜。
分 佈：臺灣、湖南、山東；全世界。

Erynia nouryi Rem. et Henn. 諾氏蟲疫霉 (Li et Kang, 1989:82-83; Lu, et al., 1988:168-171; Wang, et al., 1988:153-155)

=*Entomophthora exitialis* Hall et Dunn
=*Enomophthora aphidis,* sensu Petch
Erynia nouryi Rem. et Henn., 1980:
寄 主：根蚜
Lipaphis erysimi Kaltenbach 蘿蔔蚜
Myzus persicae Sulzen 桃蚜。
分 佈：湖南、山東。

Erynia occidentalis Humb. et Ben-Zéev 西方蟲疫霉 (Li, 1987:238)

=*Empusa* (*Entomophthora*) *occidentalis* Thaxt.,
寄 主：蚜蟲(樺木)
蚜蟲(茄上)。
分 佈：

Erynia orientalis Humb. et Ben-Zéev 東方蟲疫霉 (Li, 1987:237; Wang, et al., 1988:154)

Zoophthora orientalis Ben-Zéev et Kenn.,
寄 主：柑橘蚜。
分 佈：

Erynia phaloides Humb. et Ben-Zéev 筒孢蟲疫霉 (Li, 1987:238)

寄 主：
分 佈：

Erynia radicans Humb. Ben-Zéev et Kenn. 圓孢蟲疫霉 (Li, 1987:238; Li et Kang, 1989:82-83)

=*Entomophthora radicans* Brefeld
=*Entomophthora sphaerosperma* Fresenius
寄 主：*Lipaphis ersyiuii* Kaltenbach 蘿蔔蚜
Myzus persicae Sulzen 桃蚜。
分 佈：湖南、廣佈。

Erynia sp. 蟲疫霉 (Huang et al., 1997:28-31)

寄 主：
分 佈：

Eryniopsis turbnata Humb. 螺孢擬蟲霉 (Li, 1987:239; Li et Kang, 1989:82-83)

=*Entomophthora turbinata* Kenneth
寄 主：桃幹蚜
Lipaphis ersyiuii Kaltenbach 蘿蔔蚜
Myzus persicae Sulzen 桃蚜。
分 佈：湖南。

Neozygites floridana (Weiser et Muma) Remaudière et Keller 佛州蟎霉 (Shih et Shiue, 1994:128-129; Tsean et al., 1997:52-53)

寄 主：*Tetranychus urticae* Koch 二點葉蟎(楊桃)。

分 佈：臺灣。

Pandora neoaphidis 新蚜蟲癘霉 (Fan et Li, 1997:224-229)

寄 主：*Acythosipphoon pisum* 豌豆蚜
Plutella xylostella 小菜蛾
Psylliodes chrysocephala 油菜跳甲。

分 佈：安徽。

Sporoethrix sp. 簇孢霉 (Li, 1994, 3(3):129-140; Liu et al., 1999, 21(3):99)

寄 主：*Chondracris rosea rosea* (De Geer) 棉蝗(木麻黃)。

分 佈：廣東。

Triplosporium fresenii Batko 弗氏三孢霉 (Li, 1987:239; Li et Kang, 1989:82-83; Lu, et al., 1988:168-171)

Entomophthora fresenii (Nowak.) Gustafs.

寄 主：*Rhopalosiphum maidis* (Fitch) 玉米蚜
Aphis glycines Matsumura 大豆蚜
Aphis gossypii Glover 棉蚜
Lipaphis erysimi Kaltenbach 蘿蔔蚜
Myzus persicae Sulzen 桃蚜。

分 佈：湖南、陝西、山東。

Triplosporium lageniformis Batk. 瓶孢三孢霉 (Li, 1987:239)

Empusa (*Entomophthora*) *lageniformis* Thaxt.

寄 主：

分 佈：

Zoophthora aphidis (Hoffimann in Fresenius) Batko 蚜蟲瘟霉 (Tzean et al., 1997:54-55)

Zoophthora aphidis (Hoffimann in Fresenius) Batko, 1964, 12:405.

寄 主：*Myzus persicae* Sulzer 桃蚜。

分 佈：臺灣。

Zoophthora radicans Brefeld 根蟲瘟霉 (Fan et Li, 1997:224-229; Yuan et al., 1999, 15(2):87)

寄 主：*Plutella xylostella* (Linnaeus) 小菜蛾。

分 佈：臺灣；馬來西亞、佛羅里達。

CLAVICIPITALES 麥角菌目

Clavicipitaceae 麥角菌科

(Wang, 1988:427)

Cordyceps arbuscula Teng 多枝蟲草 (Zhang et al., 1997:96)

Cordyceps arbuscula Teng, 1936, 7:812.

寄 主：闊葉林地金龜幼蟲

分 佈：廣東(肇慶市鼎湖山)。

Cordyceps aspera 粗糙蟲草 (Yang, 1997:37-43)

寄 主：

分 佈：雲南(滇西北：維西、蘭坪、貢山，2,600-3,200m)。

Cordyceps acicularis 大塔頂蟲草 (Yang, 1997:37-43)

寄 主：

分 佈：雲南(滇西北：瀘水、六庫、貢山，800-2,100m)。

Cordyceps barnesii 香棒蟲草 (Yang, 1997:37-43)

寄 主：

分 佈：雲南(滇西北各縣，780-3,400m)。

Cordyceps brasiliensis Henn. 巴西蟲草 (Zhang et al., 1997:95)

Cordyceps brasiliensis Henn., 1900, 39:78.

寄 主：鞘翅目幼蟲。

分 佈：廣東(鼎湖山)。

Cordyceps brongniartii 布氏蟲草 (Yang, 1997:37-43)

寄 主：

分 佈：雲南(滇西北：瀘水、貢山、中甸、麗江，11,300-2,600m)。

Cordyceps cicadae Shing 大蟬蟲草 (Xing, 1994:253; Yang, 1997:37-43)

Isaria cicadae Miquel

寄 主：

分 佈：福建、廣東、雲南(西北各縣，1,500-2,300m)。

Cordyceps cicadicola 蟬蟲草 (Yang, 1997:37-43)

寄 主：

分 佈：雲南(西北各縣，1,800-2,500m)。

Cordyceps crassispora 闊孢蟲草 (Yang, 1997:37-43)

寄 主：

分 佈：雲南(德欽、中甸，4,400-5,100m)。

Cordyceps crinalis Ellis ex Lloyd 發狀蟲草 (Zhang et al., 1997:96)

Cordyceps crinalis Ellis ex Lloyd, 1920:912.

寄 主：竹林或闊葉林內枯枝落葉層下鱗翅目幼蟲。

分 佈：廣東(乳源縣天井山林場)。

Cordyceps dipteerigena Berk et Br. 蠅蟲草 (Tzean et al., 1997:56-57)

Cordyceps dipteerigena Berk et Br., 1875, 14:111.
寄 主：蠅類。
分 佈：臺灣。

Cordyceps grylli Teng 蟋蟀蟲草 (Zhang, et al., 1997:95)

Cordyceps grylli Teng, 1936, 7:811.
寄 主：蟋蟀科昆蟲。
分 佈：廣東(肇慶市鼎湖山)。

Cordyceps gunnii (Berk.) Berk. 古尼蟲草 (Zhang et al., 1997:95)

Cordyceps gunnii (Berk.) Berk., 1895, 2:278.
寄 主：鱗翅目幼蟲。
分 佈：廣東(肇慶市鼎湖山)。

Cordyceps irangiensis Moureau 蟻蟲草 (Tzean et al., 1997:58-59)

Cordyceps irangiensis Moureau, 1961, 30:334-339.
寄 主：*Polyrhachis* sp. 蟻。
分 佈：臺灣。

Cordyceps koreana Kob. et Shim. 朝鮮蟲草 (Zhang et al., 1997:94)

寄 主：鞘翅目成蟲。
分 佈：廣東(乳源縣天井山林場)。

Cordyceps liangshanensis 涼山蟲草 (Yang, 1997:37-43)

寄 主：
分 佈：雲南(西北各縣，1,200-2,000m)。

Cordyceps martialis Speg. 燈蛾蟲草 (Tzean et al., 1997:60-61)

Cordyceps martialis Speg., 1889, 11:305.
寄 主：燈蛾(幼蟲)
分 佈：臺灣。

Cordyceps militaris (L.) Link 蛹草 (Chen, 1988:239-240; Yang, 1997:37-43; Zhang et al., 1997:85)

Cordyceps militaris (L.) Link, 1833, 3:347.
寄 主：*Cjanis deucalin* (Walker) 洋槐天蛾
Sphginidae 天蛾科
Thesea loesa (Moore) 扁刺蛾
Notodontidae 舟蛾科
分 佈：廣東(鼎湖山、乳源縣天井山林場)、雲南(西北各縣，800-2,800m)、遼寧(瀋陽)。

Cordyceps militaris f. albina Kob. et Shim. ex Yao 蛹蟲草(白化變型) (Zhang et al., 1997:95)

Cordyceps militaris f. *albina* Kob. et Shim. ex Yao, 1995, 14(4):256.

寄 主：土內蟲蛹。

分 佈：廣東(肇慶市鼎湖山)。

Cordyceps myrmecophila Ces 蟻蟲草 (Tsean et al., 1997:62-63; Zhang et al., 1997:95)

Cordyceps myrmecophila Ces, 1846, 4:877.

寄 主：*Polyrhachis* sp. 林內蟻。

分 佈：臺灣、廣東(肇慶市鼎湖山)。

Cordyceps nutans Pat. 蝽蟲草 (Tzean et al., 1997:64-65)

Cordyceps nutans Pat., 1887, 3:127.

寄 主：*Erthesina fullo* Thunberg 蝽。

分 佈：臺灣。

Cordyceps opphioglossoides 大團囊蟲草 (Yang, 1997:37-43)

寄 主：

分 佈：雲南(瀘水、德欽、中甸，2,500-4,500m)。

Cordyceps oxycephala 黃峰蟲草 (Yang, 1997:37-43)

寄 主：

分 佈：雲南(怒江流域各縣，800-1,800m)。

Cordyceps polyarthra Möll. 蛾蛹草 (Chen, 1988:239-240; Yang, 1997:37-43; Zhang et al., 1997:95)

Cordyceps polyarthra Möll., 1901, 1:213.

寄 主：*Cjanis deucalin* (Walker) 洋槐天蛾
林內蛾蛹。

分 佈：廣東(肇慶市鼎湖山)、雲南(西北各縣，1,200-3,000m)、遼寧(瀋陽)。

Cordyceps pruinosa Petch 繭草 (Chen, 1988:239-240)

Mariannaea pruinosa Liang, 1991:104. 粉被馬利亞霉(無性型)(Liu, 1997:78-81)

寄 主：Euncleidae 刺蛾科一種繭。

分 佈：遼寧(瀋陽)。

Cordyceps speudolloydii Evans et Samson 蟻蟲草 (Tzean et al., 1997:66-67)

Cordyceps speudolloydii Evans et Samson, 1984, 82:133.

寄 主：*Dolichoderus bituberculatus* 蟻(Dolichoderinae)。

分 佈：臺灣。

Cordyceps ramose Teng 分枝蟲草 (Zhang et al., 1997:95)

Cordyceps ramose Teng, 1936, 7:810.

寄 主：生于闊葉林內大團囊菌(*Elaphomyces* sp.)子實體上。
分 佈：廣東(肇慶市鼎湖山)。

Cordyceps roseostromata Kob. et Shim. 紅座蟲草 (Zhan et al., 1997:94)
寄 主：鞘翅目成蟲。
分 佈：廣東(乳源縣天井山林場)。

Cordyceps sinensis (Berkeley) Saccardo 冬蟲夏草菌 (Chen et al., 1973:198-202; Chen et al., 1997:97-101; Chu, 1965:620-621; Chu et Wang, 1985:121-134; Gao, et al., 1992:317-321; Liu et al., 1995, 17(4):184-190; Wang, 1992:893-894; Yang, 1997:37-43; Yang, et al.,1988:230-234; 235-238)
別 名：*蟲草真菌，中華蟲草*。
寄 主：*Bipectilus yunnanensis* Chu et Wang, 1985. 雲南雙櫛蝠蛾
Forkalus xizangensis Chu et Wang 西藏二岔蝠蛾
Hepialiscus flavus Chu et Wang 黃類蝠蛾
Hepialiscus nepalensis (Walker) 尼泊爾類蝠蛾
Hepialiscus sylvinus Linnaeus, 1924. Y 紋類蝠蛾
Hepialus albipictus 白紋蝠蛾
Hepialus anomopterus 異翅蝠蛾
Hepialus armoricanus Oberthür, 1909. 蟲草蝙蝠蛾 (Chen et al., 1973:198-202; Wang, 1992:893; Zhang, et al., 1988:395-400)
Hepialus baimaensis 白馬蝠蛾
Hepialus davidi Poujade 蝠蛾(四川寶興)
Hepialus deqinensis 德欽蝠蛾
Hepialus ferrugineus 銹色蝠蛾
Hepialus ganna Hübner 條紋蝠蛾
Hepialus jiachuanensis 劍川蝠蛾
Hepialus jianlangensis 甲郎蝠蛾
Hepialus jinshaensis 金沙蝠蛾
Hepialus kangdingensis Chu et Wang, 1985. 康定蝠蛾
Hepialus kangdingroides Chu et Wang, 1985. 康姬蝠蛾
Hepialus lijiangensis Chu et Wang, 1985. 麗江蝠蛾
Hepialus macilentus Eversmann 二角紋蝠蛾
Hepialus markamensis 芒康蝠蛾
Hepialus meiliensis 梅里蝠蛾
Hepialus menyuanicus Chu et Wang, 1985. 門源蝠蛾
Hepialus nebulosus Alpheraky (西藏)蝠蛾
Hepialus oblifureus Chu et Wang, 1985. 斜紋蝠蛾
Hepialus pratensis 草地蝠蛾
Hepialus renzhiensis 人支蝠蛾
Hepialus sichuanus Chu et Wang, 1985. 四川蝠蛾
Hepialus varians Studinger 蝠蛾
Hepialus yunlongensis Chu et Wang, 1985. 雲龍蝠蛾

Hepialus yunnanensis 雲南蝠蛾 (Yang et al., 1988, 9(Suppl.):43-49)
Hepialus yushuensis Chu et Wang, 1985. 玉樹蝠蛾
Hepialus zaliensis 察里蝠蛾
Hepialus zhangmoensis Chu et Wang 樟木蝠蛾
Hepialus zhayuensis Chu et Wang 察隅蝠蛾
Hepialus zhongzhiensis 中支蝠蛾
Napialus hunanensis Chu et Wang 湖南棒蝠蛾
Phassus giganodus Chu et Wang, 1985. 巨瘤蝠蛾(廣西)。

分 佈：雲南(西北各縣，3,800-4,800m)、西藏、四川(康定)、青海、甘肅等省(高原雪山草甸中)。

Cordyceps sobolifera (Berkeley) Berkeley et Broome 小蟬草 (Xing, 1994:253; Yang, 1997:37-43; Zhang et al.., 1997:95)

Cordyceps sobolifera (Berkeley) Berkeley et Broome, 1895, 14:110.

別 名：*蟬蛹蟲草*。

寄 主：蟬蛹。

分 佈：廣東(珠江三角洲、乳源縣天井山林場)、雲南(西北各縣，1,500-2,300m)。

Cordyceps tuberculata 瘤座蟲草 (Yang, 1997:37-43)

寄 主：

分 佈：雲南(貢山、福貢、寧蒗，1,500-2,800m)。

Cordyceps unilateralis (Tul.) Sacc. (Tzean et al., 1997:68-69)

Cordyceps unilateralis (Tul.) Sacc., 1883, 2:570.

寄 主：*Polyrhachis* sp. 蟻(Formicinae)。

分 佈：臺灣。

Cordyceps variabis 變形蟲草 (Yang, 1997:37-43)

寄 主：

分 佈：雲南(西北各縣，1,800-2,500m)。

Cordyceps sp. (Wu et Pong, 1954:155)

寄 主：*Pleonomus canaliculatus* Faldermann 小麥溝叩甲。

分 佈：河南。

Cordyceps sp. 蟲草菌 (Li, 1987:195)

寄 主：小地老虎

Pieris rapae Linnaeus 菜粉蝶(菜青蟲)。

分 佈：湖南。

Cordyceps sp. 蟲草 (Li, 1993, 9(4):188)

寄 主：*Chilo hyrax* 棘禾草螟

Chilo luteelus 蘆螟
Procerax venosata 高粱條螟
Sesamia inferens (Walker) 大螟。
分 佈：湖南。

Cordyceps sp. 蝠蛾蟲草 (Yang, 1997:37-43)
寄 主：
分 佈：雲南(貢山、劍川，2,900-4,000m)。

Cordyceps sp. 蟲草子座 (Li et al., 1997:91-93)
寄 主：各種培基
分 佈：河南。

Cordyceps sp. 金龜蟲草 (Yang, 1997:37-43)
寄 主：
分 佈：雲南(德欽、中甸，3,600-4,200m)。

LABOULBENIOMYCETALES 蟲生菌目

Laboulbeniaceae 蟲生菌科

Acompsomyces pauperculus Thaxter 貧弱無雜菌 (Shen et al., 1997:255)
Acompsomyces pauperculus Thaxter, 1902, 38:23.
寄 主：*Atomaria lewisi* Reitter 遠東星甲。
分 佈：廣東。

Aporomyces uniflagellatus Thaxter 無孔菌 (Shen et al., 1997:255)
Aporomyces uniflagellatus Thaxter, 1931, 116:75.
寄 主：*Liminichus* sp.
分 佈：雲南(景洪)。

Autoicomyces marginicola Thaxter 緣生單主菌 (Shen et al., 1997:255)
Autoicomyces marginicola Thaxter, 1931, 116:361
寄 主：*Berosus* sp.
分 佈：雲南(景洪)。

Botryandromyces heteroceri (Maire) Tavares et Majeewski 長泥甲葡雄菌 (Shen et al., 1997:255)
Botryandromyces heteroceri (Maire) Tavares et Majeewski, 3(2):196.
寄 主：*Heterocerus fenestratus* Thunberg 。
分 佈：河南。

Chitonomyces intermedius Thaxter 間型甲殼菌 (Shen et al., 1997:255)
Chitonomyces intermedius Thaxter,1926, 15:523.

寄 主：*Laccophilus* sp. 粒龍蝨。
分 佈：海南(尖峰嶺)。

Chitonomyces paradoxus (Peyr.) Thaxter 怪甲殼菌 (Shen et al., 1997:255)
Chitonomyces paradoxus (Peyr.) Thaxter, 1896, 12:287.
寄 主：*Laccophilus* sp. 粒龍蝨。
分 佈：海南(東太農場)。

Dimeromyces cherrhonesites Balazuc 亞洲排殼菌 (Shen et al., 1997:255)
Dimeromyces cherrhonesites Balazuc, 1975, 3, 22:197
寄 主：*Gerropria induta* Wiedemann.
分 佈：海南(壩王嶺)。

Herpomyces periplanctae Thaxter 蜚蠊二托菌 (Shen et al., 1997:255)
Herpomyces periplanctae Thaxter, 1902, 38:13.
寄 主：*Periplaneta american* Lin 。
分 佈：海南(瓊山)。

Laboulbenia borealis Speg 北方蟲囊菌 (Shen et al., 1997:255)
Laboulbenia borealis Speg, 1915, 26:468.
寄 主：*Gyrinus* sp. 鼓甲。
分 佈：廣東(九連山)。

Laboulbenia brachyonychi Thaxter 細柄蟲囊菌 (Shen et al., 1997:256)
Laboulbenia brachyonychi Thaxter, 1899, 35:162.
寄 主：*Peronomerus nigrinus* Bates 黑角胸步甲。
分 佈：湖南(沅江)。

Laboulbenia cristata Thaxter 雞冠狀蟲囊菌 (Shen et al., 1997:256)
Laboulbenia cristata Thaxter, 1893, 28:174.
寄 主：*Paederus* sp. 隱翅甲。
分 佈：海南、山東。

Laboulbenia flagellata Peyr. Sitzungsber 簇生蟲囊菌 (Shen et al., 1997:256)
Laboulbenia flagellata Peyr. Sitzungsber, 1873, 68:248.
寄 主：*Trigonotoma bhamoensis* Bates 綠胸短角步甲。
分 佈：安徽(滁縣)。

Laboulbenia flagellata Peyr. 鞭蟲囊菌 (Shen et al., 1997:256)
Laboulbenia flagellata Peyr., 1873, 68:247.
寄 主：Harpaluus tridens Morawitz 三齒婪步甲。
分 佈：黑龍江(林口縣)。

Laboulbenia fujianensis Ye 福建蟲囊菌 (Shen et al., 1997:256)

Laboulbenia fujianensis Ye, 1994, 13(4):241.
寄 主：*Dolichoctis* sp.　長唇步甲。
分 佈：福建(三明)。

Laboulbenia hainanensis Ye et Y.H. Shen 海南蟲囊菌 (Shen et al., 1997:256)
Laboulbenia hainanensis Ye et Y.H. Shen, 1994, 13(4):241.
寄 主：*Lema coromandeliana* (Fabricius)　齒負泥蟲。
分 佈：海南(那大)。

Laboulbenia idiostoma Thaxter 觸角生蟲囊菌 (Shen et al., 1997:256)
Laboulbenia idiostoma Thaxter, 1914, 50:28.
寄 主：*Haltica cyanea* (Weber)　藍跳甲。
分 佈：廣東、廣西、雲南。

Laboulbenia manubriolata Thaxter 小柄蟲囊菌 (Shen et al., 1997:256)
Laboulbenia manubriolata Thaxter, 1915, 51:44.
寄 主：*Pergona* sp.
分 佈：海南。

Laboulbenia partite Thaxter 分裂蟲囊菌 (Shen et al., 1997:256)
Laboulbenia partite Thaxter, 1914, 50:34.
寄 主：*Nisotra gemella* (Erichson)　麻四線跳甲。
分 佈：廣西、雲南。

Laboulbenia pheropsophi Thaxter 氣步甲蟲囊菌 (Shen et al., 1997:256)
Laboulbenia pheropsophi Thaxter, 1908, 13:401.
寄 主：*Pheropsophus javanus* (Dejean)　氣步甲。
分 佈：海南、廣東。

Laboulbenia polymorpha Sugiyama 多形蟲囊菌 (Shen et al., 1997:256)
Laboulbenia polymorpha Sugiyama, 1978, 53(9):284-285.
寄 主：*Ophionea indica* Thunber　多形蟲。
分 佈：海南。

Laboulbenia polyphaga Thaxter 多主蟲囊菌 (Shen et al., 1997:256)
Laboulbenia polyphaga Thaxter, 1893, 28:156.
寄 主：*Harpalus* sp.
Bembidion sp.
分 佈：雲南、黑龍江。

Laboulbenia proliferans Thaxter 多育蟲囊菌 (Shen et al., 1997:256)
Laboulbenia proliferans Thaxter, 1893, 28:168.
寄 主：*Chlaenius nogouchii* Bates　步甲。
分 佈：雲南(勐海)。

Laboulbenis pterrostichi Thaxter 廣東蟲囊菌 (Shen et al., 1997:256)

Laboulbenis pterrostichi Thaxter, 1893, 28:166.

寄 主：*Harpalus tinctulus* Bates 小綠婪步甲。

分 佈：雲南(景洪)。

Laboulbenia tachyis Thaxter 步甲蟲囊菌 (Shen et al., 1997:256)

Laboulbenia tachyis Thaxter, 1902, 38:38.

寄 主：*Tachys* sp. 步甲。

分 佈：遼寧。

Laboulbenia thyreopteri Thaxter var. **borrnensis** Thaxter 瘤殼蟲囊菌(婆羅洲變種) (Shen et al., 1997:256)

Laboulbenia thyreopteri Thaxter var. *borrnensis* Thaxter1908, 13:380.

寄 主：*Dolichoctis tetraspilotus* (Macheay) 四斑長唇步甲。

分 佈：海南。

Laboulbenia vermiformis Balazue 蠕形蟲囊菌 (Shen et al., 1997:256)

Laboulbenia vermiformis Balazue, 1975, 3, 22:196.

寄 主：*Peripristus alter* Cast 鋸緣步甲。

分 佈：海南。

Laboulbenia vulgaris Peyr. 普通蟲囊菌 (Shen et al., 1997:257)

Laboulbenia vulgaris Peyr., 1873, 68:245.

寄 主：*Bembidion* sp. 步甲。

分 佈：內蒙古(四王子旗)。

Misgomyces dyschirii Thaxter 頂枝菌 (Shen et al., 1997:257)

Misgomyces dyschirii Thaxter, 1900, 35:443.

寄 主：*Dyschivius* sp. 小螻步甲。

分 佈：黑龍江(穆棱)。

Peyritschiella clivinae Thaxter 步甲多精菌 (Shen et al., 1997:257)

Peyritschiella clivinae Thaxter, 1931, 16:18.

寄 主：*Clivina* sp. 步甲。

分 佈：安徽(滁縣)。

Rickia ancylopi Thaxter 深褐蟲生菌 (Shen et al., 1997:257)

Rickia ancylopi Thaxter, 1916, 52:40.

寄 主：*Ancylopus melanocephalus* Oliver 四星僞瓢蟲。

分 佈：湖南(岳陽)。

Rickia coleostomalis Thaxter 牙甲蟲生菌 (Shen et al., 1997:257)

Rickia coleostomalis Thaxter, 1926, 15:460.

寄 主：*Coelostoma* sp.　牙甲。
分 佈：雲南(勐臘)。

Rickia coptengalis Thaxter 多雄蟲生菌 (Shen et al., 1997:257)
Rickia coptengalis Thaxter, 1915, 51:13.
寄 主：*Episcopha gorhomi* Lewis　戈氏大蕈甲。
分 佈：廣西(賀縣)。

Rickia episcaphae Thaxter 大蕈甲蟲生菌 (Shen et al., 1997:257)
Rickia episcaphae Thaxter, 1916, 52:41.
寄 主：*Episcopha gorhomi* Lewis　戈氏大蕈甲。
分 佈：湖南(青岩山)。

Synandromyces sinensis Y. H. Shen 中國聚雄菌 (Shen et al., 1997:257)
Synandromyces sinensis Y.H. Shen, 1992, 11(2):105.
寄 主：*Typhaea stercoreea* (Linnaeus)　蕈甲。
分 佈：廣東。

Tettigomyces acuminatus Thaxter 漸尖螻蛄菌 (Shen et al., 1997:257)
Tettigomyces acuminatus Thaxter, 1915, 51:28.
寄 主：*Gryllotalpa africana* Palisot de Beauvois　非洲螻蛄。
分 佈：海南、雲南。

Tettigomyces africanus Thaxter 非洲螻蛄菌 (Shen et al., 1997:257)
Tettigomyces africanus Thaxter, 1926, 15:538.
寄 主：*Gryllotalpa africana* Palisot de Beauvois　非洲螻蛄。
分 佈：安徽(滁縣)、湖北(江陵)。

Tettigomyces brevis Thaxter 短螻蛄菌 (Shen et al., 1997:257)
Tettigomyces brevis Thaxter, 1915, 51:27.
寄 主：*Gryllotalpa africana* Palisot de Beauvois　非洲螻蛄。
分 佈：海南(瓊山)。

Tettigomyces chaetophilus Thaxter 毛生螻蛄菌 (Shen et al., 1997:257)
Tettigomyces chaetophilus Thaxter, 1915, 51:25.
寄 主：*Gryllotalpa africana* Palisot de Beauvois　非洲螻蛄。
分 佈：海南(三亞、文昌)、雲南(景洪)。

Tettigomyces confusus Thaxter 混淆螻蛄菌 (Shen et al., 1997:257)
Tettigomyces confusus Thaxter, 1915, 51:26.
寄 主：*Gryllotalpa africana* Palisot de Beauvois　非洲螻蛄。
分 佈：海南。

Tettigomyces filiformis Ye 絲狀螻蛄菌 (Shen et al., 1997:257)

Tettigomyces filiformis Ye, 1992, 11(4):285-288.
寄 主：*Gryllotalpa africana* Palisot de Beauvois　非洲螻蛄
分 佈：河南(息縣)。

Tettigomyces gryllotalpae Thaxter 螻蛄菌 (Shen et al., 1997:257)
Tettigomyces gryllotalpae Thaxter, 1915, 51:22.
寄 主：*Gryllotalpa africana* Palisot de Beauvois　非洲螻蛄。
分 佈：河南(息縣)。

Tettigomyces indicus Thaxter 印度螻蛄菌 (Shen et al., 1997:257)
Tettigomyces indicus Thaxter, 1915, 51:24.
寄 主：*Gryllotalpa africana* Palisot de Beauvois　非洲螻蛄。
分 佈：海南(文昌)、湖南(岳陽)。

Tettigomyces indermedius Thaxter 間型螻蛄菌 (Shen et al., 1997:258)
Tettigomyces indermedius Thaxter, 1926, 15:543.
寄 主：*Gryllotalpa africana* Palisot de Beauvois　非洲螻蛄。
分 佈：雲南(景洪)、安徽(滁縣)。

Tettigomyces pterophilus Thaxter 翅生螻蛄菌 (Shen et al., 1997:258)
Tettigomyces pterophilus Thaxter, 1915, 51:23.
寄 主：*Gryllotalpa africana* Palisot de Beauvois　非洲螻蛄。
分 佈：海南(瓊山)。

Tettigomyces vulgaris Thaxter 普通螻蛄菌 (Shen et al., 1997:258)
Tettigomyces vulgaris Thaxter, 1926, 15:544.
寄 主：*Gryllotalpa africana* Palisot de Beauvois　非洲螻蛄。
分 佈：湖南(江陵)、山東(金鄉)。

Zodiomyces subseriatus Thaxter 成列大托菌 (Shen et al., 1997:258)
Zodiomyces subseriatus Thaxter, 1931, 16:331.
寄 主：*Helochares anchoralis* Sharp　錨突麗陽牙甲。
分 佈：雲南(景洪)。

BASIDIOMYCOTINA 擔子菌亞門

UREDINALES 銹菌目

Melampsoraceae 黑腫病科

Eudophyllum sp. 銹病 (Pemberton et Wang, 1989:66)
寄 主：*Euphorbia esula*　乳漿大戟(爲牧草大區的害草，大戟科 Euphorbiaceae)(系統性病害，引起植株矮化，扭曲和死亡。

分 佈：內蒙古。

Melampsora sp. 銹病 (Pemberton et Wang, 1989:66)

寄 主：*Euphorbia esula* 乳槳大戟(花、葉銹病)(爲牧草大區的害草，大戟科 Euphorbiaceae)。

分 佈：內蒙古。

SEPTOBASIDIALES 紋羽病菌目

Septobasidiaceae 紋羽病菌科

Septobasidium spp. (Ye et al., 1994(4):17)

寄 主：矢尖蚧。

分 佈：浙江。

(Z400-1) 擔子菌 (Zhang et al., 1996, 22(1):43-46)

寄 主：根結線蟲。

分 佈：貴州。

HERICIALES 猴頭菌目

Lentinaceae 香菇科

Pleurotus citrinopileatus 側耳 (Liu et al., 1997, 4:230-234)

捕 食：*Panagrellus redivivus* 線蟲。

分 佈：

Pleurotus colombinus 側耳 (Liu et al., 1997, 4:230-234)

捕 食：*Panagrellus redivivus* 線蟲。

分 佈：

Pleurotus cornucopiae 側耳 (Liu et al., 1997, 4:230-234)

捕 食：*Panagrellus redivivus* 線蟲。

分 佈：

Pleurotus cystidiosus 側耳 (Liu et al., 1997, 4:230-234)

捕 食：*Panagrellus redivivus* 線蟲。

分 佈：

Pleurotus florrida 側耳 (Liu et al., 1997, 4:230-234)

捕 食：*Panagrellus redivivus* 線蟲。

分 佈：

Pleurotus ostreatus 側耳 (Liu et al., 1997, 4:230-234)
捕 食：*Panagrellus redivivus* 線蟲。
分 佈：

Pleurotus salmoneostramineus 側耳 (Liu et al., 1997, 4:230-234)
捕 食：*Panagrellus redivivus* 線蟲。
分 佈：

Pleurotus sapidus 側耳 (Liu et al., 1997, 4:230-234)
捕 食：*Panagrellus redivivus* 線蟲。
分 佈：

Pleurotus sajor-caju 側耳 (Liu et al., 1997, 4:230-234)
捕 食：*Panagrellus redivivus* 線蟲。
分 佈：

Pleurotus shodophyllus 側耳 (Liu et al., 1997, 4:230-234)
捕 食：*Panagrellus redivivus* 線蟲。
分 佈：

Pleurotus sp. 側耳 (Liu et al., 1997, 4:230-234)
捕 食：*Panagrellus redivivus* 線蟲。
分 佈：

DEUTEROMYCOTINA 半知菌亞門

MONILIALES 叢梗孢目

Moniliaceae 叢梗孢科

(Chen et al., 1990:256-257; Cheng, 1988, 1: ;Lou et al., 1992, 8(1):22-25)

Acrostalagurus albus (Ye et al., 1994(4):17)
寄 主：柑橘綿蚧。
分 佈：浙江。

Acrostalagmus aphidium 球孢白僵菌 (Ye et al., 1994(4):17, 18)
寄 主：*Diaphorina citri* Kuwayama 柑橘木蝨
Toxoptera citricidus (Kirkaldy) 大橘蚜
白點星天牛。
分 佈：福建、浙江。

Arthiobotrys oligospora 寡孢節叢孢菌 (Qian et al., 1993, 9(2):91-92)

寄 主：*Mekiudigtbe hapla* 北方根結線蟲。
分 佈：浙江、上海。

Aspergillus flavus Link. 黃曲霉 (Chai, 1995, 11(2):68-69; He, et al., 1991:153, Li, 1987:194; Tzean et al., 1997:116-117)
Aspergillus flavus Link., 1809, 3:16.
寄 主：*Coptotermes formosanus* Shiraki 家白蟻
尖頭蚱蜢
稻飛;蝨
稻葉蟬
Myzus persicae (Sulzer) 桃蚜
菜縊管蚜
馬鈴薯 28 星瓢蟲
菜青蟲
Pollyrhachis sp. 蟻(Formicinae)。
分 佈：臺灣、福建、湖南、四川、浙江。

Aspergillus fumigatus Fresenius 煙曲霉 (Chai, 1995, 11(2):68-69; He, et al., 1991:153)
寄 主：*Coptotermes formosanus* Shiraki 家白蟻
稻飛虱
稻葉蟬
Chilo suppressalis (Walker) 二化螟
Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟
Sesamia inferens (Walker) 大螟。
分 佈：湖南、浙江。

Aspergillus japonica 蚧曲霉 (Ye et al., 1994(4):16)
寄 主：矢尖蚧。
木瓜刺盾蚧。
分 佈：浙江。

Aspergillus niger van Tihgem 黑曲霉 (He, et al., 1991:153; Li, 1987:194)
寄 主：尖頭蚱蜢
Nilaparvata lugens (Stål) 褐飛蝨
Nephotettix virescens (Distant) 黑尾葉蟬
Myzus persicae (Sulzer) 桃蚜
菜縊管蚜
馬鈴薯 28 星瓢蟲
Chilo suppressalis (Walker) 二化螟
Sesamia inferens (Walker) 大螟
菜青蟲。
分 佈：福建、湖南。

Aspergillus parasiticus Speare 藷象曲霉 (Tzean et al., 1997:118-119)

Aspergillus parasiticus Speare, 1912, 12:38.

寄 主：*Cylas formicarius* Fabricius 藷象。

分 佈：臺灣。

Aspergillus sclerotiorum Huber (Tzean et al., 1997:120-121)

Aspergillus sclerotiorum Huber, 1933, 23:306.

寄 主：蜘蛛 Arachnidae.

分 佈：臺灣。

Aspergillus ustus (Ye et al., 1994(4):16)

寄 主：矢尖蚧

木瓜刺盾蚧。

分 佈：浙江。

Beauveria amorpha (Höhn) Samson et Evans 多形白僵菌 (Chen et al., 1990:216-217; Tzean et al., 1997:122-123)

寄 主：瓢蟲。

分 佈：臺灣。

Beauveria aranearum (Petch) von Arx 蜘蛛白僵菌 (Chen et al., 1990:217)

寄 主：蜘蛛。

分 佈：

Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin 球孢白僵菌 (Cai et Chen, 1997:176-179; Chang, 1987:171; Chang et Fan, 1990:359; Chen et al., 1990:215-256; Cheng, 1981, 8(1):25; Cheng et Xing, 1984:23-27; Chin, 1979: 253; Cui, 1992:292; Ding et al., 1997:150-153; Ding et al., 1997:172-175; Fan et al., 1986:126-128; Fan et al., 1994, 2(4):202-206; Feng, 1997:102-107; Feng et al., 1993:19-23; Feng et al., 1996, 4(1):22-33; He et al., 1982:51-56; He, et al., 1991:154; He et al., 1997:183-1191; Hong et Xu, 1997:125-130; Hong et al., 1989, 2:158-162; Hsiao, 1994:129; 1996:334-335; 1998:203-206; Hsiao et Lin, 1995:377; 459; 295-304; 1996:335; Hsu et al., 1959:203-216; Hu, 1985:110-112; Hu, 1991:185; Hu et al., 1993, 8(4):36-40; Huang, 1990[ed.]:233-235; Huang et al., 1990:121-123; Huang et al., 1994:156-158; Hung, 1994:564; Huang, 1997:270-271; Huang et al., 1997:141-144; Huang et al., 1997:166-171;Huang et al., 1997:209-212; Jilin, 1977:269-275; Kao, 1993:202; Kao et al., 1989: ; Kao et al., 1986:422; 1995: 376-377; Lee, 1959:3-10; 1964:7075; Lee, 1966:148-153; Li, 1981: ; Li, 1987:78-81; 194; Li, 1988:241-255; Li, 1989:91; Li, 1993, 9(4):188; Li, 1999, 15(1):35-40; Li et Lu, 1981: ; 1989:182; Li et al., 1996, 23(3):329-335; 1996, 23(3):344-345; 1997:145-149; Li et al., 1996, 23(3):381-391; 1996, 23(3):397-403; Li et al., 1997:145-149; Lin, 1956:539-540; Lin, 1998, 25(4):315-320; Lin et Hsiao, 1994:654-565; Lin et al., 1988:35-39; Liu et Zhang, 1993, 15(2):90; Liu et al., 1957:48; Lin et al., 1997, 13(1):32-36; Lin et al., 1997:154-160; Lin et al., 1997:161-165; Liu et al., 1999, 21(3):99; Li et al., 1999, 21(4):152-155; Liu et al., 1999, 26(1):30-34; Liu et al., 1999, 26(4):347-352; Long et Du, 1988, 1:80-82; Miao et al .1993:1-4; Mu, 1997:60-63; Mu, 1997:217-219; Nong et al., 1996, 12(3):97-99; Nong et al., 1999, 15(3):111-114; Pan et Yin, 1989:4-6; Pan et al., 1985:5-9; Pu, 1985(1):27-31; Liu et al., 1990:49-58; Sheng et Li, 1981(1-2):64-65; Shi, 1980[ed.]:125; Shih et al., 1998:430-431; Song et al., 1979, (1):39-47; Su, 1987:171; 1988:157-160; 1989:317-325; 1991:162-168; 198-203; Su et al., 1988:195-197; Sun et Liu, 1958:241, 243; Tang et al., 1996:131-136; Tang et al., 1997:131-136; Tao, 1988: ; Tao et al., 1988:90-93; Tien, 1961:53-55; Tsean et al., 1997:124-125; Wang, 1988:89; Wang, 1996, 23(3):375-380; Wang et Deng, 1986:186; Wang et al., 1996, 2:42-43; Wang et al., 1997, (4):15-18; Wamg et al., 1997:137-140; Wang et al., 1999 15(1):16-18; Wang et al., 1999, 15(4):162-165; Wen, 1983:74-78; Weng, 1991:31; Wu, 1988, 4(4):168-171; Wu et al., 1988:168-171; Xiang et al., 1994:340; Xiao, 1985(2):30; Xiao et al., 1991:100; Xie et al., 1997:195-197; Xu, 1985:27; Xu, 1991:77-80; Xu et al., 1973:203-206; Xu et al., 1977, 20(3):269-275; Xu et al., 1986, 2(1):14-16; Xu et al., 1987:25-27; Xu et al., 1988:44-46; Xu

et al., 1997:120-124; Yan et al., 1981(3):30; Yan et al., 1993, 9(2):50; Yang et al., 1994, 21(1):62, Yang et al., 1997, 13(3):132-134; Yang et al., 1998, 25(1):89-90; 78; Yao et al., 1997:113-119; Ye et al., 1994(4):17; Yen, 1960:158-161; Yin, 1988:126-129; Yuan et al., 1999, 15(2):87; Zhan et al., 1997:192-194; Zhang, 1985:49; Zhang, 1992:353; Zhang et Zhang, 1999:26; Zhang et al., 1987, 12:14-16; Zhang et al., 1988:34; Zhang et al., 1990:118-120; 161-164; Zhang et al., 1991: 163; Zhang et al., 1991, 7(4):172-174; Zhang et al., 1992:118-120; Zhang et al., 1994, 10(4):151-156; Zhang et al., 1996, 22(1):43-46; Zhang et al., 1997:180-182; Zhang et al., 1997:213-216; Zhao et al., 1987:124-126; Zhou et al., 1988:140)

別 名：*白僵菌*。

寄 主：(Li, 1988:241-255)

Blattella germinica 德國蜚蠊
Periplaneta americana Linnaeus 美洲蜚蠊
Gryllotalpa africana 非洲螻蛄
Gampsocleis grafiosa Brunner von Wattenwvl 蟈蟈
Chondracris rosea rosea (De Geer) 棉蝗
Melanoplus sanguinipes 遷徙蚱蜢
Hierodula patellifora Serville 廣腹螳螂(成蟲、若蟲)
Mantis religiosa Linnaeus 薄翅螳螂(成蟲、若蟲)
Paratenodera angustipennis Saussure 窄大刀螂(成蟲、若蟲)
Paratenodera aridifolia Stoll 大刀螂(成蟲、若蟲)
Paratenodera sinensis Saussure 中華大刀螂(成蟲、若蟲)
Statilia maculata Thunberg 小刀螂(成蟲、若蟲)
薊馬
Nephotettix virescens (Distant) 黑尾葉蟬(成蟲、若蟲)
Nilaparvata lugens (Stål) 褐飛蝨(成蟲、若蟲)
Heteropsylla cubana Crawford 銀合歡木蝨
褐圓蚧
矢尖蚧
Tessaatoma papillosa (Drury) 荔蝽
稻黑蝽
黃肩蝽
稻綠蝽
二星蝽
稻蛛緣蝽
Dysdercus megalopygus Breddin 赤星蝽
棉盲蝽
瓢蟲
葉甲
Anoplophora chinensis Förster 星天牛
Anoplophora nobilis Ganglbauer 黃斑星天牛(幼蟲)
Botocera horsfieldi (Hope) 雲斑天牛(幼蟲)
Saperda populinea Linnaeus 青楊天牛(幼蟲)
Ophrida spectabilis Baly 黑角直緣跳甲(鹽膚木 *Rhus chinensis* Mill)
Pyrrhalta aenescens 榆葉甲

Metriona circumdata Herbst　甘薯葉甲
Cosmopolites sordidus Germer　香蕉球莖象鼻蟲
Odoiporus longicollis Olivier　香蕉假莖象甲
Polytus multerborgi Boheman　香蕉小象甲
Cylas formicarius Fabricius　甘藷蟻象
棉鈴象
Arbela bailbarana Matsumura　相思擬木蠹蛾
Cossus cossus mongolicus Erschoff　蒙古木蠹蛾(幼蟲)
Zeuzera multistrigata Moore　木麻黃多紋蠹蛾
Clania veriegata Snellen　大袋蛾
Carposina niponensis Walsingham　桃小食心蟲(Peach fruit moth)(Jiamg. et al., 1991:164; Tao, et al., 1991:165-166)
Chilo hyrax　粏禾草螟
Chilo lutelus　蘆螟
Chilo suppressalis (Walker)　二化螟
Euzophera batangensis Caradja　皮暗斑螟(木麻黃上)
Scirpophaga incertulas (Walker)　三化螟
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée)　稻縱捲葉螟
Ostrinia furnacalis (Guenée)　亞洲玉米螟(Cheng et Xing, 1984:23-27; Xu et al., 1973:203-206; Zhang et al., 1994, 10(4):151-156)
Proceras venosata　高粱條螟
Phragmataecia castanea　蘆葦豹蠹蛾
Grapholitha glycinivorella Matsumura　大豆食心蟲
Evergestis extimalis Scopoli　茴香薄翅野螟
Loxostege sticticalis (Linnaeus)　草地螟
Sylepta dorogata Fabricius　棉螟
Andraca bipunctata　茶蠶
茶小捲蛾(幼蟲、蛹)
荔枝捲葉蛾(幼蟲)
Holcocerus vicarius Walker　木蠹蛾
油桐尺蠖
Dendrolimus punctatus Walker　馬尾松毛蟲(幼蟲、蛹)
Dendrolimus spectabilis (Butler)　赤松毛蟲(幼蟲、蛹)
Dendrolimus superans (Butter)　落葉松毛蟲(幼蟲、蛹)
Dendrolimus tubulaeformis Tsai et Liu　油松毛蟲(幼蟲、蛹)
Antheraea pernyi (Guerin-Meneville)　柞蠶
Bombyx mori (Linnaeus)　家蠶
Laelia candida　蘆素毒蛾(荻蘆)
Lymantria dispar (Linnaeus)　舞毒蛾
Naranga aenescens Moore　稻螟蛉
Sesamia inferens (Walker)　大螟

銀紋夜蛾
小地老虎
Rivula biatomea Moore 竹涓夜蛾
Spodoptera lutira (Fabricius) 斜紋夜蛾
Parnara guttata guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲
Mycalesis gotama Moore 稻眼蝶
Pieris rapae Linnaeus 菜青蟲
Pieris rapae crucivora Boisduval 菜白蝶
Pieris sordida Butler 臺灣紋白蝶
稻根葉甲
Mimastra cyanura Hope 桑藍葉甲(成蟲)
稻紅瓢蟲
Exolontha serrulata (Gyllenhal) 大等鰓金龜(蠐螬)
Holotrichia parallela Motschulsky 暗褐鰓角金龜
Alissonotum impressicolle Arrow 突背蔗金龜
桑天牛
Monochamus alterntus Hope 松褐天牛
楊樹雲斑天牛(Lu, et Mao, 1991:166)
Hypera (*Phytonomus*) *variabilis* 苜蓿葉象甲(Liang, et al., 1991:164-165)
Cylas formicarius Fabricuis 甘薯象鼻蟲 (Lin, 1956:539-540)
稻搖蚊
家蠅
Diprion nanhuaensis Xiao 南華松葉蜂(雲南松)
Neodiprion guangxiicus Xiao et Zhou 廣西新松葉蜂(雲南松)
Neodiprion xiangyunicus Xiao et Zhou 祥雲新松葉蜂(寄生率 12.5%)
Braconidae 繭蜂
Polistes sp. 馬蜂
Vespa formosana Sonan 胡蜂。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、陝西、山西、河北、北京、遼寧、吉林、大興安嶺北部、黑龍江、全國各地；菲律賓。

附 註：寄主昆蟲計有 12 目 92 科 420 多種。

Beauveria brongniartii (Saccardo) Petch 卵孢白僵菌 (Chen et al., 1990:216; Deng et al., 1995, 11(2):56-59; Deng et al., 1996, 12(4):165-167; He, et al., 1991:154; Hu et Dian, 1989:94-95; Hu et al., 1991, 2:154-155; Li, 1999, 15(1):35-40; Lin et al., 1988:, 1:135-139; Lu et Feng, 1995, 11(3):144-; Nong, 1997:220-223; Nong et al., 1994, 10(1):22-24; Tian et Hu, 1989, 5(4):139; Tsean et al., 1997:126-127; Wu et al., 1984, 10(5):21-22; Xu et al., 1993:179-180; Xu et al., 1997, 13(1):23-25; Xu et al., 1997:198-203; Xu et al., 1997:204-208; Zhang et Hu, 1988, 1:134; Zhang et al., 1996, 22(1):43-46; Zhang et al., 1997:213-216)

Sporotrichum epigaeum Brunaud, 1888:
Sporotrichum schenckii Matr. var. *fioccoi* Dodge,
Beauveria epigaea (Brunaud) Langer.,
Sporotrichum beurmannii Matr. et Ramond var. *fioccoi* (Dodge) Red. et Cif.
Botrytis brongniartii Sacc.

=*Botrytis menlolonthae* Sacc.
=*Beauveria tenella* (Delacr.) Siem.
=*Beauveria densa* (Link)
=*Isaria kogane* Hasegawa et Koyama,

寄 主：*Melanoplus mexicanus* 墨西哥黑蝗
沫蟬
Nephotettix cincticeps 原黑尾葉蟬
Parnara guttata guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲
Anomala corpulenta Motschulsky 銅綠麗金龜
Anomala costata 柳杉麗金龜
Costelytra zealandica 麗金龜
Holotrichia consanguinea 暗血紅鰓金龜
Holotrichia diomphalia 東北大黑鰓金龜
Holotrichia oblita (Faldermann) 大黑鰓金龜
Holotrichia parallela Motschulsky 暗黑鰓金龜(*H. morosa*)
Holotrichia serrata 鋸齒鰓金龜
Melolontha melolontha 歐洲五月鰓金龜
Melolontha hippocastani 東方五月鰓金龜
Popillia quadriguttta (Fabricius) 四紋麗金龜
廿八星瓢蟲
Anoplophora malasiaca 胸斑天牛
Niphonoclea sp. 天牛
Psacothea hilaris 黃星天牛
Semanotus japonicus 柳杉天牛
Curculio camelliae 山茶象
Otiorrhynchus sulcatus 黑葡萄耳象
Sitophilus zeamais 玉米象
Acanthoscelides obtectus 大豆象(菜豆象)
Aedes aegypti 埃及伊蚊
Aedes dorsalis 背點伊蚊
Aedes hexodentus 伊蚊
Aedes sierrensis 塞拉伊蚊
Culex quinquefasciatus 五帶淡色暗蚊
Culex pipiens 尖音庫蚊
Culex tarsalis 環喙庫蚊
Culiseta incidens 脈毛蚊
Chilo auricilius 臺灣稻螟
Diatraea scccharalis 小蔗桿草螟
Euctectona machaeralis 柚木野螟
Chilo suppressalis (Walker) 二化螟
Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟
Sesamia inferens (Walker) 大螟

Pelopidas mathias 隱紋稻苞蝶
Castnia licoides 蔗蝶蛾
Solenopsis invicta 盜竊蟻。
分 佈：臺灣、福建、湖南、雲南、浙江、江蘇、安徽、河南、山東、河北、北京。

Beauveria caledonica Bissett et Widden (Tzean et al., 1997:128-129)
Beauveria caledonica Bissett et Widden, 1988, 66:361.
寄 主：?偽瓢蟲。
分 佈：臺灣。

Beauveria globulifera Pic. 球孢白僵菌 (Shu et Yu, 1985:93; Zhang et Zhou, 1996, 18(4):184)
寄 主：*Hyphantia cunea* (Drury) 美國白蛾(幼蟲)
Gilpinia massoniana 馬尾松吉松葉蜂(幼蟲)。
分 佈：遼寧。

Beauveria tenella (Saccardo) Siemaski 卵孢白僵菌 (Hu et Dian, 1989:94-95; Xu, 1985:27)
寄 主：*Holotrichia oblita* (Faldermann) 大黑鰓金龜(豆田)
Holotrichia parallela Motschulsky 暗黑鰓金龜(豆田)
天牛(成蟲)
鱗翅目部分幼蟲。
分 佈：江蘇、山東、黑龍江。

Beauveria velata Samson et Evans 粘孢白僵菌 (Chen et al.,1990:216)
寄 主：燈蛾(幼蟲)。
分 佈：

Beauveria sp. 白僵菌 (Huang et al., 1994:157)
Beauveria sp. Huang et al., 1994:157.
寄 主：*Alissonotum impressicolle* Arrow 突背蔗金龜
Exolontha serrulata (Gyllenhal) 大等鰓金龜
Holotrichia parallela Motschulskky 暗褐鰓金龜。
分 佈：雲南。

Beauveria sp. 白僵菌 (Zhu et Ma, 1985(4):44)
Beauveria sp. Zhu et Ma, 1985(4):44.
寄 主：*Carpocapsa pomonella* Linnaeus 蘋果蠹蛾。
分 佈：新疆(哈密)。

Beauveria sp. 白僵菌 (Zhang et Zhou, 1996, 18(4):184)
寄 主：*Diprion jinyenicus* 靖遠松葉蜂(幼蟲)
Neodiprion xinyunicus 祥雲新松葉蜂(幼蟲)
Neodiprion zhejiangensis 浙江黑松葉蜂(幼蟲)。

分 佈：

Beauveria spp. 白僵菌 (Gao et al., 1995, 11(3):142-143)

寄 主：以大蠟螟於土壤中誘集。

分 佈：貴州、河北、內蒙古、遼寧、吉林。

Beauveria sp. (Hu et Huang, 1997:23-27; Hu et Huang, 1997:108-112)

寄 主：

分 佈：

Botrytis spp. 葡萄孢霉 (He, et al., 1991:154)

寄 主：*Nilaparvata lugens* (Stål) 褐飛蝨
Myzus persicae (Sulzer) 桃蚜
菜縊管蚜
一種蜻象
潛葉蠅
Chilo suppressalis (Walker) 二化螟
Sesamia inferens (Walker) 大螟
葉蟎。

分 佈：湖南。

Capnodium citri B. et Desm. (Lo et Chen, 1995:369)

寄 主：*Diaphorina citri* Kuwayama 柑橘木蝨。

分 佈：臺灣。

Cephalosporium acremonium 頂頭孢霉 (Li et al., 1993,(3):261-265)

寄 主：合歡蠟蚧。

分 佈：

Cephalosporium coccorum Petch 蚧頭孢霉 (Li et al., 1993, 20(3):261-265; Ye et al., 1994(4):17)

寄 主：紅花長指管蚜
大紅花粉蚧
紅圓蚧
柳長蚧
榆蚧
長牡蠣蚧
矢尖蚧。

分 佈：福建。

Cephalosporium fulva 頭孢霉 (He, et al., 1991:154; Li, 1987:195; Yen et Ooi, 1967:15-20)

寄 主：稻飛蝨
稻葉蟬

Myzur persicae (Sulzer) 桃蚜
菜縊管蚜
猿葉蟲
Chilo suppressalis (Walker) 二化螟
Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟
Parnara guttata guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲
菜青蟲。
分 佈：臺灣、湖南。

Cephalosporium lecanii Zimm. 蠟蚧頭孢霉 (Li et al., 1993, 20(3):261-265)
寄 主：蠟蚧科昆蟲
Diaphorina citri Kuwayama 柑橘木蝨。
分 佈：臺灣。

Cephalosporium nodulosum Petch 多節頭孢霉 (Li et al., 1993, 20(3):261-265)
寄 主：螟蛾科成蟲。
分 佈：

Cephalosporium sinensis 蟲草頭孢 (Chu et al., 1997:82-86)
寄 主：*Cordyceps sinensis* (Berkeley) Saccardo 冬蟲夏草菌。
分 佈：山西。

Cephalosporium sp. 李小食心蟲頭孢霉 (Wang, et al., 1988:206)
寄 主：*Grapholitha funebrana* Tretischeke 李小食心蟲。
分 佈：東北。

Cephalosporium sp. 黑蝽頭孢霉 (Yen et Han, 1968:47-58)
寄 主：*Scotinophara lurida* Burmeister 稻黑蝽。
分 佈：臺灣。

Cephalosporium sp. 蟲草頭孢霉 (Liu et al., 1995, 17(4):187)
寄 主：*Cordyceps sinensis* (Berjekt) Saccards 冬蟲夏草菌(1-3 齡)。
分 佈：廣東。

Cephalosporium sp. (86A-2) 葉蟎頭孢霉 (Li et al., 1993, 20(3):261-265)
寄 主：葉蟎。
分 佈：遼寧。

Cladsporium sp. (Ye et al., 1994(4):17)
寄 主：*Toxoptera citricidus* (Kirkaldy) 大橘蚜。
分 佈：浙江。

Cylindrocarpon heteronema (Berk. et Br.) Wollenw. (Zhang et al., 1993, 9(2):89-90)
寄 主：*Heterodera glycines* 大豆孢囊線蟲。
分 佈：黑龍江。

Cylindrocarpon spp. (Liu, et al., 1991:217-218)
寄 主：*Heterodera glycines* 大豆孢囊線蟲。
分 佈：河南、山西、吉林、黑龍江。

Epicoccum sp. 附球霉 (Li, 1987:195)
寄 主：*Myzus persicae* (Sulzer) 桃蚜
潛葉蠅。
分 佈：湖南。

Gliocladium roseum 粉紅粘帚 (Chai, 1995, 11(2):68-69)
寄 主：*Coptotermes formosanus* Shiraki 家白蟻。
分 佈：浙江。

Glomus sp. (Liu, et al., 1991:217-218; Wang et al., 1997, 13(2):93)
寄 主：*Heterodera glycines* 大豆孢囊線蟲。
分 佈：河南、山東、河北、山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江。

Hirsutella formicarum Petch (Tzean et al., 1997:138-139)
Hirsutella formicarum Petch, 1935, 19:183.
寄 主：*Polyrhachis* sp. 蟻(Formicinae)。
分 佈：臺灣。

Hirsutella nodulosa Petch 瘤狀多毛菌 (He, et al., 1991:154)
寄 主：*Chilo suppressalis* (Walker) 二化螟。
分 佈：浙江。

Hirsutella saussurei (Cooke) Speare (Tzean et al., 1997:140-141)
Hirsutella saussurei (Cooke) Speare, 1920, 12:69.
寄 主：*Polistes* sp. 馬蜂。
分 佈：臺灣。

Hirsutella stilbelliformis var. **stilbelliformis** Evans et Samson (Tzean et al., 1997:142-143)
Hirsutella stilbelliformis var. *stilbelliformis* Evans et Samson, 1982, 79:434.
寄 主：Stephylinidae 隱翅甲。
分 佈：臺灣。

Hirsutella subulata Petch 錐形多毛菌 (He, et al., 1991:154)
寄 主：蝽

飛蝨
Chilo suppressalis (Walker) 二化螟
Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟。
分 佈：湖南。

Hirsutella thompsonii Fishet 湯氏多毛菌 (Chen, 1997:249-250; Chen et Chen, 1986, 4(1,2):23-26; 1986:115; Chen, et al., 1987:13-16; 1988:187-192; Chiu et Lo, 1985:5; Huang, 1990[ed.]:233-235; Huang et Gao, 1996:143; Li, 1999, 15(1):35-40; Zhang et al., 1996, 22(1):43-46; Zhejing, 1974:225-226)
別 名：*湯普森被毛孢*。
寄 主：*Panonychus citri* (McGregor) 柑橘葉蟎
Phyllocoptes oleivora (Ashmead) 柑橘癭蟎(柑橘銹壁虱)。
分 佈：台灣、福建、浙江、江蘇、上海；美國、蘇里南、哥倫比亞、英國等。

Hirsutella versicolor Petch (Tzean et al., 1997:144-145)
Hirsutella versicolor Petch, 1932, 16:227.
寄 主：葉蟬。
分 佈：臺灣。

Hirsutella sp. 多毛菌 (Cheng, 1977:155-162; Chin, 1979:253)
寄 主：*Myzus persicae* (Sulzer) 桃蚜
Rhopalsiphnum pseudobrassicae (Davis) 菜縊管蚜
Metaceronema japonica Maskell 油茶刺綿蚧。
分 佈：江西、湖南、南方油茶產區。

Hormodendrum sp. 單胞枝孢霉 (Li, 1987:195)
寄 主：*Myzus persicae* (Sulzer) 桃蚜
菜縊管蚜
黃守瓜
小菜蛾
菜青蟲。
分 佈：湖南。

Humicola fuscoatra (Wang et al., 1997, 13(2):93)
寄 主：*Heterodera glycines* 大豆胞囊線蟲。
分 佈：河南、山東、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江。

Hymenostilbe dipterigena Petch (Tzean et al., 1997:146-147)
Hymenostilbe dipterigena Petch, 1932, 16:212.
寄 主：蠅。
分 佈：臺灣。

Insecticolus sp. (Liu et al., 1995, 17(4):187)
寄 主：*Cordyceps sinensis* (Berjekt) Saccards 冬蟲夏草菌(1-3 齡)。

分 佈：廣東。

Isaria sinclairii (Berk.) Sloyd 草蟬寄生菌 (Hou, 1986:59-70; Wang et Lu, 1972:191)
寄 主：*Mogannia hebes* Walker　甘蔗草蟬(若蟲)
Mogannia kashocoensis Kato　草蟬(若蟲)
Melanotus tamsuyensis Bates　甘蔗櫛叩頭蟲(幼蟲、蛹、成蟲)
Lacon musculus Candize　銹叩頭蟲
Platynchus formosanus Matsumura　花叩頭蟲
Leucophlebia lineata Walker　黃條天蛾(幼蟲)
Dorysthenes hydropicus Pascoe　甘蔗鋸天牛(幼蟲)
Episomoides albinus Matsumura　白粉象鼻蟲(幼蟲)
Phytoscaphus formosanus Matsumura 臺灣尖象
Patanga succincta Linnaeus　背條土蝗(若蟲)。
分 佈：臺灣。

Isaria sp. 棒束孢霉 (Chu et al., 1997:82-86)
寄 主：冬蟲夏草(分離出)。
分 佈：山西。

Isaria sp. 棒束孢霉 (Chu et al., 1997:82-86; Chu et al., 1997:87-90)
寄 主：蟬花(分離出)。
分 佈：山西。

Mariannaea elegans (Wang et al., 1997, 13(2):93)
寄 主：*Heterodera glycines*　大豆胞囊線蟲。
分 佈：河南、山東、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江。

Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorokin 綠僵菌 (Cai, 1985(4):43; Chai, 1995, 11(2):68-69; Chang et al., 1987:412-413; Chen et al., 1995, 11(2):54-56; Cheng et al., 1995, 11(4):183; Chu et Pang, 1956(2):3; Fan et Li, 1997:224-229; Fan, et al., 1991:166; Gao et Fan, 1993, 3:14-20; He, et al., 1991:154; Hou, 1986:59-70; Huang, 1992, (5):62; Huang et al., 1994:156-158; Huang et al., 1994, 10(4):175-177; Kao et al., 1988:426-427; Li, 1987:195; Li, 1993, 9(4)::188; Liang et Liu, 1980:12-14; Lin et Fu, 1987, 9(3):168-172; 1988:179, 180; Lin et al., 1987, 9(3):168-172; Liu, 1994, 10(1):28-31; Liu et Lu, 1990,:270-281; Liu et McRae, 1994, 21(4):356, 362; Liu et Pu, 1982 4(2):41-46; Liu et al., 1987:23-26; Liu et al., 1987:413; Lu et al., 1993, 9(4):187; Nong et al., 1990, 17(2):76-80; 1999, 15(3):111-114; Tsai et al., 1994:65-73; Wang et Lu, 1972:191; Xu, 1985:27; Zhang et Yang, 1995, (6):33-34; Zhang et al., 1996, 12(3):100-102; Zhang et al., 1996, 22(1):43-46)
別 名：*黑僵菌*。
寄 主：*Coptotermes formsanus* Shiraki　家白蟻
Periplaneta americana　美洲蜚蠊
Blattella germinica Linnaeus　德國蜚蠊
螻蛄
Locusta migratoria manilensis　東亞飛蝗
稻黑蝽
稻蛛緣蝽

甘蔗草蟬
Phragmataecia castanea 蘆葦豹蠹蛾
桃小食心蟲
Chilo hyrax 棘禾草螟
小地老虎
Mythimna separata (Walker) 粘蟲
Parnara guttata guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲
Pieris rapae Linnaeus 菜粉蝶(菜青蟲)
柑橘吉丁蟲
Alissonotum impressicolle Arrow 突背蔗金龜
Aphodius rectus 直蜉金龜
Exolontha serrulata (Gyllenhal) 大等鰓金龜
Holotrichia parallela Motschulsky 暗褐鰓角金龜
Mimela testaco viridis 黃閃麗金龜
蔗龜類
青楊天牛(幼蟲)
Rhynchiles foveipennis 梨虎(成蟲)
Xyleborus interjectus 蠹蟲(成蟲)
Aedes aegypti 埃及伊蚊(孑孓)
Culex pipiens pipiens 尖音庫蚊(孑孓)
家蠅。

分 佈：福建、湖南、廣東、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、湖北、陝西、河北、吉林；南太平洋、澳洲、美國、巴西。

Metarhizium anisopliae 綠僵菌 (8550) (Gao et al., 1996, 12(2):62)

寄 主：

分 佈：貴州。

Metarhizium anisopliae 綠僵菌 (8777) (Gao et al., 1996, 12(2):62)

寄 主：

分 佈：貴州。

Metarhizium anisopliae 綠僵菌 (30104) (Gao et al., 1996, 12(2):62)

寄 主：

分 佈：貴州。

Metarhizium anisopliae 綠僵菌 (RAW8) (Chen et al., 1997:246-248)

寄 主：花生蠐螬。

分 佈：江蘇。

Metarhizium anisopliae anisopliae Tulloch (Ma 83) 金龜子綠僵菌(短孢型變種)(Chang, 1987:171;

Chang et Fan, 1990:359; Gao, 1996, 12(40:182; Gao et al., 1996, 12(2):62; Fan et al., 1988:29-32; Hsiao, 1996:334-335; 1998:203-206; Hsiao et Lin, 1996:335; Hsiao et al., 1996:385-386; Hsieh et al., 1995:369; 1996:385; Hung et al., 1994:128; 565; 1995:376; Kao, 1993:202; Kao et al., 1996:385; 422; Lee et Chen, 1992:356; Lee et Hou, 1989:1-9; 10-20; 13-19; Lee et al., 1994:565-566; Leu et al., 1986:421; Li, 1999, 15(1):35-40; Liu, 1990:352; Liu, 1994, 10(1):22-31;1997:82-85; Nong et al., 1999, 15(3):111-114; Tsai et al., 1991:440; Tsai et al., 1992:216-226; Tsai et al., 1992:353; 1994:65-73; 1994:239-246; Tzean et al., 1997:148-149)

Metarhizium anisopliae var. *anisopliae* Tulloch, 1976:

寄 主：蜚蠊
白蟻
黑蚱蟬
甘蔗沫蟬
Purohita sp. 葉蟬(Delphacidae)
粉蝨
蚧
Agrilus auriventris 柑橘吉丁
Potosia (*Liocola*) *brevitarsis* 白星花金龜
蠐螬
Allomyrina dichotomus 犀金龜(Dynastidae)
Anoplophora nobilis 黃斑星天牛
Batocera horsfildi 雲斑天牛
Saperda populnea 青楊天牛(幼蟲)
Apriona germari (Hope) 枇杷天牛(桑天牛)
梨眼天牛
Neocerambyx mandarinus 黑腫角天牛
Brontispa longissima 椰子紅胸葉蟲
Odoiporus longicollis 香蕉假莖象甲
Laodelphax striatellus 斑飛蝨
Icerya purchasi 吹綿蚧
Holcocerus sp. 沙柳木蠹蛾
小菜蛾
Ostrinia furnacalis (Guenée) 亞洲玉米螟
蘋小捲葉蛾
楊黃捲葉蛾
豆天蛾
楊小舟蛾
美國白蛾
Euproctis conspersa Butler 茶毛蟲
棗粘蟲
Rivula biatomea Moore 竹涓夜蛾
Spodoptera litura (Fabricius) 斜紋夜蛾
Spodoptera exigua 甜菜夜蛾
香蕉弄蝶

Pieris canidia sordida 紋白蝶
Stauronematus compressicorsis 楊直角葉蜂
楊黑點葉蜂
Leptogenys sp. 蟻(Ponerinae)
蚊。
分 佈：臺灣、貴州、陝西。

Metarhizium anisopliae Metsch Sorokin var. **major** (Johnston) Tulloch 綠僵菌大孢變種 (Gao, 1996, 12(4):182; Gao et al., 1996, 12(2):62;Tzean et al., 1997:150-151)
寄 主：甲蟲(?蠐螬)。
分 佈：臺灣、貴州。

Metarhizium biformispore Liang et Liu 雙型孢綠僵菌 (Gao, 1996, 12(4):182; Gao et al., 1996, 12(2):62)
寄 主：
分 佈：貴州。

Metarhizium flavoviride Game et Rozsypal var. flavoviride Rombach, Humber et Roberts 黃綠綠僵菌 (Li, 1999, 15(1):35-40; Lu et al., 1996, 18(4):147-150; Nong et al., 1999, 15(3):111-114)
寄 主：*Locusta migratoria manilensis* 東亞飛蝗
蚱蜢。
分 佈：天津；非洲。

Metarhizium flavoviride 黃綠綠僵菌(30114) (Gao et al., 1996, 12(2):62)
寄 主：
分 佈：貴州。

Metarhizium flavoviride Game et Rozsypel var. **minus** Rombach, Humber et Roberts 黃綠綠僵菌小孢變種 (Gao et al., 1996, 12(4):182;Gao et al., 1996, 12(2):62)
寄 主：
分 佈：貴州。

Metarhizium iadini Chen, Guo et Zhou 翠綠綠僵菌 (Zhou, et al., 1991:167)
寄 主：*Rhynchifes foveipennis* Fairmaire 梨虎。
分 佈：貴州(貴陽)。

Metarhizium taii Liang et Liu 戴氏綠僵菌 (Gao et al., 1996, 12(2):62)
寄 主：
分 佈：貴州。

Metarhizium sp. 綠僵菌 (Tian et al., 1993, 15(4):156)
Metarhizium sp. Tian et al., 1993:156.
寄 主：*Clostera anastomosis* (Linnaeus) 分月扁舟蛾(幼蟲)

分 佈：黑龍江(海林)。

Metarhizium (Arsef 324) 綠僵菌 (Lu et al., 1993:187; Zhang et al., 1996, 22(1):43-46)
寄 主：*Locusta migratoria manilensis* 東亞飛蝗。
分 佈：北京；英國(1992 年 12 月由英聯邦國際生防所(IIBC)引進北京生防所)。

Metarhizium (324673) 綠僵菌 (Lu et al., 1993:187)
寄 主：*Locusta migratoria manilensis* 東亞飛蝗
分 佈：英國(1992 年 12 月由英聯邦國際生防所(IIBC)引進北京生防所)。

Metarhizium (I91-614) 綠僵菌 (Lu et al., 1993:187)
寄 主：*Locusta migratoria manilensis* 東亞飛蝗
分 佈：英國(1992 年 12 月由英聯邦國際生防所(IIBC)引進北京生防所)。

Metarhizium (330189) 綠僵菌 (Lu et al., 1993:187)
寄 主：*Locusta migratoria manilensis* 東亞飛蝗。
分 佈：英國(1992 年 12 月由英聯邦國際生防所(IIBC)引進北京生防所)。

Metarhizium spp. 綠僵菌 (Gao et al., 1995, 11(3):142)
寄 主：以大蠟螟幼蟲誘集。
分 佈：貴州、河北、內蒙古、遼寧、吉林。

Mucor petrinsularis (Wang et al., 1997, 13(2):93)
寄 主：*Heterodera glycines* 大豆胞囊線蟲。
分 佈：河南、山東、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江。

Nematophithora sp. (Wang et al., 1997, 13(2):93)
寄 主：*Heterodera glycines* 大豆胞囊線蟲。
分 佈：河南、山東、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江。

Nomuraea atypicola (Yasuda) Samson (Tzean et al., 1997:152-153)
Nomuraea aatyppicola (Yasuda) Samson, 1915, 19:117.
寄 主：蜘蛛 Arachnida。
分 佈：臺灣。

Nomuraea cylindrospora Tzean et al. (Tzean et al., 1997:154-155)
Nomuraea cylindrospora Tzean et al., 1993, 85:514-519. (new combination)
寄 主：*Pomponia linearis* 蟬。
分 佈：臺灣。

Nomuraea rileyi (Farlow) Maublanc 萊氏蛾霉 (He, et al., 1991:154; Kao et al., 1986:422; Tang et Hou, 1994:565; 1995:379; 1996:337; Tsai et al., 1988:426; Tzean et al., 1997:1156-157Zhang et al., 1996, 22(1):43-46)
別 名：*綠僵菌，萊氏野村菌*。

寄 主：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟
Helicoverpa armigera (Hübner) 棉鈴蟲
Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟
Spodoptera exugua 甜菜夜蛾
Spodoptera litura (Fabricius) 斜紋夜蛾
Trichoplusia ni Hübner 擬尺蠖
Pieris rapae crucivora Boisduval 菜粉蝶。
分 佈：臺灣、福建、貴州。

Nomuraea viridulus Tzean et al. (Tzean et al., 1997:158-159)
Nomuraea viridulus Tzean et al., 1992, 84:781.
寄 主：*Cryptotympana facialis* 蟬(?*C. atrata* (Fabricius))。
分 佈：臺灣。

Paecilomyces breviramosus Bissett (Tzean et al., 1997:160-161)
Paecilomyces breviramosus Bissett, 1979, 159:
寄 主：鱗翅目幼蟲。
分 佈：臺灣。

Paecilomyces carneus 肉色擬青霉 (Zhang et al., 1996, 22(1):43-46)
寄 主：粉蝨
Nilaparvata lugens 褐飛蝨。
分 佈：湖南。

Paecilomyces caterniannulatus 環鏈擬青霉 (Chai, 1995, 11(2):68-69; Chen et al., 1990:257-258; Yao, 1996, 18(1):42-43;Yao, 1996, 12(3):99; Yuan et al., 1999, 15(2):88)
寄 主：*Plutella xylostella* Linnaeus 小菜蛾
Pieris rapae (Linnaeus) 菜青蟲
Coptotermes formosanus Shiraki 家白蟻。
分 佈：浙江。

Paecilomyces cicadae (Miquel) Samson 蟬擬青霉 (Chai, 1995, 11(2):68-69; Chai, 1995, 11(4):168-170; Chen, 1991, 10(4):280-289; Chen et al., 1990, 6(3):131-133; Yao, 1996, 12(3):99; 1996, 18(1):42-43; Yuan et al., 1999, 15(2):88; Zhang et al., 1996, 22(1):43-46)
寄 主：*Platylomia pieli* Kato 竹蟬(若蟲)
Plutella xylostella Linnaeus 小菜蛾
Pieris rapae (Linnaeus) 菜粉蝶
Coptotermes formosanus Shiraki 家白蟻。
分 佈：浙江。

Paecilomyces farinosus (Hollm ex S. F. Gray) Brown et Smith 粉質擬青霉 (Chai, 1995, 11(2):68-68; Chen et al., 1990:257, 258-273; ; Li, 1987:10; Li, 1987:195; Li, 1999, 15(1):35-40; Li et al., 1999, 21(4):152-155; Liu et al., 1995, 17(4):187; Nong, et al., 1991:248-249; He, et al., 1991:154; Li, 1999, 15(1):35-40; Li et Ye, 1991:51-53; Yao, 1996, 12(3):99, 1996,

18(1):42-43; Zhang et al., 1996, 22(1):43-46)

Paecilomyces farinosus (Hollm ex S. F. Gray) Brown et Smith, 1957, 40:50.

寄 主：*Coptotermes formosanus* Shiraki 家白蟻
稻褐蝽
Nilaparvata lugens (Stål) 褐飛蝨
Sogatella furcifera (Horvàth) 白背飛蝨
Rhopalsiphnum pseudobrassicae (Davis) 菜縊管蚜
柑橘粉蚧
蟲草蝠蛾
Plutella xylostella (Linnaeus) 小菜蛾
Chilo suppressalis (Walker) 二化螟
Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟
Laelia candida 素毒蛾(荻、蘆葦)
Dendrolimus punctatus (Walker) 馬尾松毛蟲
Sesamia inferens (Walker) 大螟
Mythimna separata (Walker) 粘蟲
Pieris rapae Linnaeus 菜粉蝶(菜青蟲)
鱗翅目(幼蟲、蛹)。

分 佈：臺灣、福建、湖南、貴州、浙江。

Paecilomyces fumosaroseus (Wize) Brown et Smith 玫煙色擬青霉 (Chai, 1995, 11(2):68-69; Chen et al., 1990:258; Chen et Feng, 1999, 21(3):140-144; Fang et al., 1985(2):15-18; He, et al., 1991:154; Huang, 1990[ed.]:233-235; Li, 1999, 15(1):35-40; Tzean et al., 1997:164-165; Xu, 1985:27; Yao, 1996, 18(1):42-43; Yuan et al., 1999, 15(2):88; Zeng et al., 1965:59-68; Zhang et al., 1996, 22(1):43-46)

Paecilomyces fumosaroseus (Wize) Brown et Smith, 1957, 40:67..

寄 主：*Coptotermes formosanus* Shiraki 家白蟻
Nilaparvata lugens (Stål) 褐飛蝨
Sogatella furcifera (Horvàth) 白背飛蝨
溫室粉蝨
蚜蟲
天牛(成蟲)
Plutella xylostella Linnaeus 小菜蛾
蘋果小食心蟲(蛹)
松毛蟲
粘蟲
翅翅目(幼蟲、蛹)
家蠅
柞蠶飾腹寄蠅。

分 佈：臺灣、雲南、貴州、四川、浙江、遼寧、吉林。

Paecilomyces fumosroseus var. **beijingensis** Pang et Chen 玫煙色擬青霉(北京變種) (Gang,

1980:12-14; Fang et al., 1983:168-172; Fang et al., 1985(2):15-18; Fang et al., 1986:129-131; Fang, et al., 1988:182; Zhang et al., 1996, 22(1):43-46)

寄 主：茶小綠葉蟬

Trialeurodes vaporariorum 溫室白粉虱

茶橙癭蟎。

分 佈：湖南、北京。

Paecilomyces griseoviride 灰綠擬青黴(U-2) (Dai et al., 1997, 19(2):49-54; 1997, 13(4):173-175; Dai, 1998, 14(1):11-13)

寄 主：*Brevicoryne brassicae* 甘藍蚜

Lipaphis erysimi 蘿蔔蚜

Macrosiphum granarium 麥長管蚜

Myzus persicae 桃蚜

Rhopalosiphum prunifoliae 禾縊管蚜

Toxoptera graminum 麥二叉蚜

Plutella xylostella (Linnaeus) 小菜蛾

Hellula undalis 菜螟

Spodoptera exigua 甜菜夜蛾

Pieris rapae (Linnaeus) 菜粉蝶。

分 佈：山東。

附 註：加白蔓羅(*Datura metel* L.)及花椒(*Zanthoxylum bungeanum* Maxim)爲 G-P 複合生物殺蟲劑防治以上害蟲。

Paecilomyces javanicus (Friederichs et Bally) Brown et Smith 灰色擬青黴 (Chang et Fan, 1990:359; Liu et al., 1990:49; Tzean et al., 1997:166-167)

寄 主：*Heteropsylla cubana* Crawford 銀合歡木蝨

Rivula biatomea Moore 竹涓夜蛾

鱗翅目(幼蟲、蛹)

蠅。

分 佈：臺灣。

Paecilomyces lilacinus (Thom) Samson 淡紫擬青黴 (Chen et Peng, 1989, (3):45-48; Gao et al., 1998, 14(4):163-166; Hua et al., 1989, (1):29-30; Li, 1999, 15(1):35-40; Lin et al., 1993, 9(3):116-118; Liu et al., 1991,17(2):48, 68; Liu et al., 1991, 17(3):87-91; Liu et al., 1995, 11(2):70-74; Qi et al., 1995, 21((1):53; Wang, 1992, 11(1):52-56; Wang et al., 1990, 9(3):225-229; Wang et al., 1992, 11(1):52-56; Wang et al., 1996, 12(1):20-23; Wang et al., 1997, 13(1):26-28; Wang et al., 1997, 13(2):93; Xiao et al., 1997, 13(1):29-31; Ye et al., 1994(4):16; Zhang et al., 1991, 3:55-60; Zhang et al., 1993, 9(2):89-90; Zhang et al., 1993, 12(3):240-245; Zhang et al., 1996, 22(1):43-46)

寄 主：康氏粉蚧

吹綿蚧

Heterodera glycines 大豆孢囊線蟲

Meoidogyne incognita 南方根結線蟲。

分 佈：廣東、浙江、湖北、河南、黑龍江；日本。

附 註：有高效的 MCWA 18 菌株。

Paecilomyces sinensis 中國擬青霉 (Fang, et al., 1988:183)

寄 主：

分 佈：

Paecilomyces tenuipes (Peck) Samsom 細腳擬青霉 (Qiao, 1989:144; Su et al., 1988:5(3):6; Su et al., 1997:251-254; Tzean et al., 1997:168-169)

Paecilomyces tenuipes (Peck) Samsom, 1974, 6:49.

寄 主：*Aelia sibirica* Reuter 麥蝽(小麥)

Pieris ropus Linnaeus 菜粉蝶

鱗翅目(蛹)。

分 佈：臺灣、浙江、山西。

Paecilomyces varioti 宛氏擬青霉 (Chai, 1995, 11(2):68-69; Li, 1987:195; Wang et al., 1997, 13(2):93; Yao, 1996, 18(1):42-43)

寄 主：*Myzus persicae* (Sulzer) 桃蚜

Rhopalsiphnum pseudobrassicae (Davis) 菜縊管蚜

黑守瓜

Plutella xylostell Linnaeus 小菜蛾

Pieris rapae (Linnaeus) 菜粉蝶(菜青蟲)

Coptotermes formosanus Shiraki 家白蟻

Heterodera glycines 大豆胞囊線蟲。

分 佈：湖南、浙江、河南、山東、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江。

Paecilomyces sp. 擬青霉 (Fang, et al., 1988:183-184)

寄 主：*Phragmatoecia castaneae* Hübner 蔗褐蠹蛾。

分 佈：廣東。

Paecilomyces sp 擬青霉 (Luo et al., 1992:22-25)

寄 主：*Aphis gossypii* Glover 棉蚜

Pieris rapae (Linnaeus) 菜青蟲

Tetranychus viennensis Zacher 山楂葉蟎。

分 佈：北京。

Paecilomyces sp. 擬青霉 (Zhang, et Jin, 1988:185-186)

寄 主：*Ophiomyia shibatsuji* 大豆根潛蠅。

分 佈：東北(黑河地區)。

Paecilomyces sp. 擬青霉 (Liu et al., 1995, 17(4):187)

寄 主：*Cordyceps sinensis* (Berjekt) Saccards 冬蟲夏草菌(4-6 齡)。

分 佈：廣東。

Penicillium lilacinum 荔枝蝽青霉 (Huang, 1990[ed.]:233-235)

寄 主：荔枝蝽(若蟲、成蟲)。

分 佈：臺灣、福建、廣東、海南、廣西。

Penicillium sp. 青霉 (Li, 1987:194)

寄 主：*Myzus persicae* (Sulzer) 桃蚜

菜縊管蚜

黑守瓜

潛葉蠅

菜青蟲

葉蟎。

分 佈：湖南。

Paraphoma radicina (Wang et al., 1997, 13(2):93)

寄 主：*Heterodera glycines* 大豆胞囊線蟲。

分 佈：河南、山東、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江。

Phoma spp. (Liu, et al., 1991: 217-218)

寄 主：*Heterodera glycines* 大豆孢囊線蟲。

分 佈：河南、山西、吉林、黑龍江。

Phomaopsis archeri 附球孢 (Chai, 1995, 11(2):68-69)

寄 主：*Coptotermes formosanus* Shiraki 家白蟻。

分 佈：浙江。

Scopulariopsis breoicaulis (Ye et al., 1994(4):17)

寄 主：矢尖蚧

木瓜刺盾蚧。

分 佈：浙江。

Scytalidium indonesiacum (Wang et al., 1997, 13(2):93)

寄 主：*Heterodera glycines* 大豆胞囊線蟲。

分 佈：河南、山東、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江。

Sorosporella unvella 葡萄狀小團孢霉 (Li, 1993, 9(4):188; Yen, 1960:51-53)

寄 主：*Proceras venosata* 高梁條螟

Trichoplusia ni (Hübner) 擬尺蠖

Bombyx mori Linnaeus 家蠶。

分 佈：臺灣、湖南。

Sphaerostible aurantiicola (B. et Br.) Petch 紅頭菌 (Hsiao, 1985:389; Kao, 1993:202)

寄 主：*Pseudaonidia duplex* Cockerell 茶圓蚧。

分 佈：臺灣。

Spicaria prasina (Maulblane) Saw 綠穗霉 (He, et al., 1991:154; Li, 1987:195)

寄 主：*Plutella xylostella* (Linnaeus) 小菜蛾
Chilo suppressalis (Walker) 二化螟
Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟
Mythimna separata (Walker) 粘蟲。

分 佈：湖南、浙江、湖北。

Spicaria sp. (Chu, 1961:111-112; Yen, 1960:51-53)

寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲(幼蟲)
Trichoplusia ni (Hübner) 甘藍擬尺蠖(幼蟲)
毒蛾(蛹)(ex 大花紫薇 *Lagerstroemia speciosa*)。

分 佈：臺灣(臺北)。

Sporothrix isarioides (Petch) de Hoog (Tzean et al., 1997:170-171)

Sporothrix isarioides (Petch) de Hoog, 1974, 7:23.

寄 主：*Idioscopus clypealis* Lethierry 檬果葉蟬。

分 佈：臺灣。

Tilachlidium sp. (Tzean et al., 1997:174-175)

Tilachlidium sp. Tzean et al., 1997:174-175.

寄 主：粉蝨
Diaspididae 盾蚧。

分 佈：臺灣。

Tolypocladium sinense Li 中國彎頸霉 (Fan, 1997:272)

寄 主：*Phragmatoecia castaneae* Hübner 蔗褐蠹蛾
Proceras venosatus Walker 條螟
Scirpophaga excerpalis Walker 白螟。

分 佈：廣東。

Trichothecium roseum 粉紅單端孢霉 (Chai, 1995, 11(2):68-69; Yao, 1996, 18(1):42-43)

寄 主：*Coptotermes formosanus* Shiraki 家白蟻
Plutella xylostella (Linnaeus) 小菜蛾。

分 佈：浙江。

Trichothecium sp. 單端孢霉 (Li, 1987:195)

寄 主：*Myzus persicae* (Sulzer) 桃蚜
Rhopalsiphnum pseudobrassicae (Davis) 禾縊管蚜
Helicoverpa armigera (Hübner) 棉鈴蟲

Pieris rapae Linnaeus 菜粉蝶
馬鈴薯 28 星瓢蟲
蠐螬
一種蝽。
分 佈：湖南。

Verticillium chlamydosporium 厚孢輪枝菌 (Chen et al., 1996, 12(1):45-46; He et Ge, 1987, 17(1):14-21; Lin, 1990, 6(1):38-41; 1990, 3:63-65; Lin et Shen, 1994, 10(1):7-10; Liu et al., 1991, 17(3):87-91; Liu et al, 1991:217; Wang et al., 1997, 13(2):93; Zhang et al., 1996, 22(1):43-46)
寄 主：*Heterodera glycines* 大豆孢囊線蟲
Meloidogyne arenaria 花生根結線蟲
Meloidogyne incognita 南方根結線蟲。
分 佈：雲南、貴州、江蘇、上海、河南、山東、山西、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江。

Verticillium chlamydosporium var. **catenalatum** (Wang et al., 1997, 13(2):93)
寄 主：*Heterodera glycines* 大豆胞囊線蟲。
分 佈：河南、山東、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江。

Verticillium heterocladum Penz. 蚧輪枝菌 (Yen et Tsai, 1969:7)
寄 主：*Chrysomphalus aonidum* Linnaeus 褐圓蚧。
分 佈：臺灣。

Verticillium insectorum Petch 蟲生輪枝孢 (He et Ge, 1985, (1):41-43; He et Ge, 1987, 14(1):29-32)
寄 主：*Meloidogyne incognita* 南方根結線蟲。
分 佈：浙江。

Verticillium lamelicola 褶生輪枝孢 (Ma, et al., 1991:218; Qian et al., 1993, 9(2):91-92)
寄 主：*Meloidogyne hapla* 北方根結線蟲
Meloidogyne incognita 棉花南方根結線蟲。
分 佈：浙江、江蘇。

Verticillium lecanii (Zimm.) Viégas 蠟蚧輪枝菌 (Cen, 1994, 16(1):14-16; Chen, 1985(1):32-37; Deng et al., 1991, 7(3):120-123; Deng, et al., 1991:249-250; He, et al., 1991:154; Hsiao, 1994:129; 1996:334-335; 1997:227-236; 1998:203-206; Hsiao et Lin, 1996:334-335; Hsiao et al., 1997:413; Kao, 1993:202; Li, 1999, 15(1):35-40; Li et al., 1991:115-119; Lin et al., 1998:432; Pu, 1985:27-31; Shi et al., 1990:36; Tzean et al., 1997:176-177; Wang et Yan, 1988, 15(4):283; Xie et al., 1988:92; Yao, 1996, 18(1):42-43; Yin et al., 1997:240-245; Zhang et al., 1996, 22(1):43-46)
寄 主：*Nilaparvata lugens* (Stål) 褐飛蝨
Diaphorina citri Kuwayama 柑橘木蝨
Trialerodes vaporariorum (Westwood) 溫室粉蝨
Aphis citricola 繡線菊蚜
Aphis gossypii Glover 棉蚜
Brachycaudus helichrysi 杏圓尾蚜

Lipaphis erysimi 偽菜蚜
Macrospyhoniella sanbornii 菊小長管蚜
Myzus persicae (Sulzer) 桃蚜
Ropalosiphum padi 麥蚜
高梁蚜
Aspidiotus ficus 榕圓蚧
Ceroplastes cerifures 茶角蠟蚧
Ceroplastes rubens 紅蠟蚧
Coccus hesperidum 柑橘軟蠟蚧
Coccus sp. 軟蠟蚧(米蘭 Agalaia odorata)
Parlatoria zizyphus 黑點蚧
薊馬
Carabidae 步甲科
Plutella xylostella (Linnaeus) 小菜蛾
Adoxophyes privatana 小捲葉蛾
Iragoides fasciata 茶刺蛾
蜾蠃
Eriphyidae, gall mites 癭蟎。

分 佈：臺灣、福建、廣東、貴州、湖南、浙江、北京。
附 註：英國商品名 Vertalec.

Verticillium nigresecens (Wang et al., 1997, 13(2):93)
寄 主：*Heterodera glycines* 大豆胞囊線蟲。
分 佈：河南、山東、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江。

Verticillium sp. 輪枝孢霉 (He, et al., 1991:155; Li, 1987:195)
寄 主：稻葉蟬
稻飛蝨
Myzus persicae (Sulzer) 桃蚜
Rhopalsiphnum pseudobrassicae (Davis) 菜縊管蚜
Chilo suppressalis (Walker) 二化螟
Mythimna separata (Walker) 粘蟲。
分 佈：湖南、浙江。

Volutella ciliata (Wang et al., 1997, 13(2):93)
寄 主：*Heterodera glycines* 大豆胞囊線蟲。
分 佈：河南、山東、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江。

Dematiaceae 暗梗孢科

Cladosporium cladosporioides (Fres) 芽枝霉 (Huang, 1990[ed.]:233-235; Huang et Gao, 1996:143)

寄 主：*Panonychus citri* McGregor　柑橘全爪蟎。
分 佈：福建。

Cladosporium spp.　芽枝霉 (He, et al., 1991:155; Li, 1987:195)
寄 主：*Nilaparvata lugens* (Stål)　褐飛蝨
Sogatella furcifera (Horvàth)　白背飛蝨
Myzus persicae (Sulzer)　桃蚜
Rhopalsiphnum pseudobrassicae (Davis)　菜縊管蚜
甘薯麥蛾
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée)　稻縱捲葉螟
Mythimna separata (Walker)　粘蟲
葉蟎。
分 佈：湖南。

Stilbellaceae 櫛束孢科(束狀菌科、蛛絲菌科)

Gibellula clavulifera var. **major** Tzean et al. (Tzean et al., 1997:130-131)
Gibellula clavulifera var. *major* Tzean et al., 1997:130-131.
寄 主：蜘蛛。
分 佈：臺灣。

Gibellula leiopus (Vuill.) Mains (Tzean et al., 1997:132-133)
Gibellula leiopus (Vuill.) Mains, 1950, 42:318.
寄 主：蜘蛛
分 佈：臺灣。

Gibellula pulchra (Sacc.) Cavara (Tzean et al., 1997:134-135)
Gibellula pulchra (Sacc.) Cavara, 1894, II, 3:347.
寄 主：蜘蛛 Archnida。
分 佈：臺灣。

Gibellula unica Tzan et al. (Tzean et al., 1997:136-137)
Gibellula unica Tzan et al., 1997, 89:312.
寄 主：蜘蛛 Archnida。
分 佈：臺灣。

Gibellula suffulta Speare 撐銹球孢 (He, et al., 1991:155)
寄 主：稻田斜紋貓蛛等蜘蛛。
分 佈：福建。

Isaria farinosa (Dicks) Fresenius 蟲花棒束孢 (Chen, 1995, 21(4):25; He, et al., 1991:155; Li, 1992:93; 1993, 9(4)::188)
別 名：*黃僵菌*。

寄 主：*Chilo hyrax* 棘禾草螟
Chilo luteelus 蘆螟
Chilo suppressalis (Walker) 二化螟
Locastra muscosalis Walker 綴葉叢螟(前蛹、蛹)
Proceras venosata 高梁條螟
Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟
Sesamia inferens (Walker) 大螟。
分 佈：湖南、浙江。

Isaria sp. 棒束孢 (He, et al., 1991:155)
寄 主：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲(蛹)(稻田)。
分 佈：福建。

Isaria sp. 棒束梗霉菌 (Xiao, 1985(2):30)
寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Wakler) 馬尾松毛蟲。
分 佈：臺灣。

Stilbella buquetii var. **buquetii** (Mont. et C. Robin) Samson et Evans (Tzean et al., 1997:172-173.
Stilbella buquetii var. *buquetii* (Mont. et C. Robin) Samson et Evans, 1981, C, 84:290.
寄 主：*Dolichoderus* sp. 蟻
Polyrhachis sp. 蟻。
分 佈：臺灣。

Tuberculariaceae 瘤座孢科

Fusarium acuminatum 銳頂鐮孢 (Ye et Zhu, 1997:44)
寄 主：
分 佈：

Fusarium aquaeductum (Wang et al., 1997, 13(2):93)
寄 主：*Heterodera glycines* 大豆胞囊線蟲。
分 佈：河南、山東、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江。

Fusarium acridiorum 蝗蟲鐮孢 (Ye et Zhu, 1997:45)
寄 主：
分 佈：

Fusarium anthophilum 花腐鐮孢 (Li, 1988:211; Ye et Zhu, 1997:45, 49)
=*Fusarium moniliforme* var. *anthophilum*; (Nelson et al., 1983)
寄 主：桃赤蚜
菜白蝶(蛹)。
分 佈：湖南。

Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc. 燕麥鐮刀菌 (Chai, 1995, 11(2):68-69; Fan, et al.,1988:217; He, et al., 1991:155; Li, 1987:195; 1988: 212; Wang et Ye, 1990:81; Yao, 1996, 18(1):42-43; Ye, 1989:5; Ye et Zhu, 1997:45)

寄 主：*Coptotermes formsanus* Shiraki 家白蟻
Nilaparvata lugens (Stål) 褐飛蝨
Nisia atravenosa 花飛蝨
Sogatella furceifera 白背飛蝨
Nephotettix cincticeps 僞黑尾葉蟬
Nephotettix virescens (Distant) 黑尾葉蟬
Inazuma dorsalis (Motschulsky) 電光葉蟬
Tetticoniella viridis 大青葉蟬
Lipaphis erysimi 芥菜脂蚜
Myzus persicae (Sulzer) 桃蚜
Rhopalosiphnum pseudobrassicae (Davis) 菜縊管蚜
二星蝽
Plutella xylostella (Linnaeus) 小菜蛾
Chilo hyrax 棘禾草螟
Chilo infuscatellus (Snellen) 甘蔗二點螟
Chilo suppressalis (Walker) 二化螟
Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟
Cnaphalocrocis medinalis (Gneuée) 稻縱捲葉螟
楊扇舟蛾
Helicoverpa assulta 煙夜蛾
Helicoverpa armigera (Hübner) 棉鈴蟲
Sesamia inferens (Walker) 大螟
Mythimna separata (Walker) 粘蟲
Parnara guttata guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲
Pieris rapae Linnaeus 菜粉蝶
Epilachna niponica 馬鈴薯 28 星瓢蟲(卵、幼蟲)
Aulacophora nigripennis 黑足黑守瓜
Chlorops oryzae 稻稈潛蠅
Hydrellia sp. 稻小潛蠅
麥葉毛眼水蠅。

分 佈：湖南、浙江、甘肅。

Fusarium avenaceum var. **herbarum** 燕麥鐮孢(草本變種) (Ye et Zhu, 1997:45)

寄 主：

分 佈：

Fusarium chamydosporum 厚垣孢鐮孢 (Ye et Zhu, 1997:45, 49)

=*Fusarium fusarioides*; (Nelson et al., 1983)

寄 主：
分 佈：

Fusarium coccidicola 蚧生鐮孢 (Ye et Zhu, 1997:45, 49)

=*Fusarium juranum* (Gerlach, 1981; Nirenberg, 1982)
寄 主：
分 佈：

Fusarium coccophilum 嗜蚧鐮刀菌 (Chiu et Lo, 1985:4; Li, 1988:212; Lo et Wu, 1989:182; Yao, 1996, 12(3):99; 1996, 18(1):42-43; Ye, 1989:5, 7; Ye et al., 1994(4):16; Ye et Zhu, 1997:45)

寄 主：*Parlatoria pergandei* 糠片盾蚧
Parlatoria zizyphi (Lucas) 黑點蚧
Unaspis yanonensis (Kuwana) 矢尖蚧
Plutella xylostella Linnaeus 小菜蛾
Pieris rapae Linnaeus 菜青蟲。
分 佈：台灣、福建、湖南、浙江。

Fusarium concolor Reinking-Zentralbl 同色鐮孢 (Fan, et al.,1988:217; He, et al., 1991:155; Li, 1988:212; Li, 1993, 9(4):188; Wang et Ye, 1990:81; Ye, 1989:5; Ye et Zhu, 1997:45)

寄 主：*Nilaparvata lugens* (Stål) 褐飛蝨
Sogatella furciferea (Horvàth) 白背飛蝨
Nisia atrovenosa 花飛蝨
Nephotettix virescens (Distant) 黑尾葉蟬
Inazuma dorsalis (Motschulsky) 電光葉蟬
Tetticoniella viridis 大青葉蟬
桃赤蚜
槐花球蚧
Chilo suppressalis (Walker) 二化螟
Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟
Chilo hyrax 棘禾草螟
Chilo infuscatellus (Snellen) 甘蔗二點螟
Sesamia inferens (Walker) 大螟
Mythimna separata (Walker) 粘蟲(蛹)
Parnara guttata guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲。
分 佈：湖南、寧夏。

Fusarium culmorum 黃色鐮孢 (Li, 1988:212; Li, 1993, 9(4):188; Wang et Ye, 1990:81;Ye, 1989:6; Ye et Zhu, 1997:45)

寄 主：高果長蝽
Sitobion avenae (Fabricius) 麥長管蚜
蘿蔔蚜
Myzus persicae (Sulzer) 桃蚜

桃赤蚜
Diaphorina citri Kuwayama 柑橘木虱
Proceras venosata 高粱條螟
Scirpophaga nivella 黃尾白螟
Pieris rapae (Linnaeus) 菜粉蝶(菜青蟲)。
分 佈：湖南。

Fusarium decemcellulare 多隔鐮孢 (Ye et Zhu, 1997:45)
寄 主：
分 佈：

Fusarium dimerum 單隔鐮孢 (Ye, 1989:6; Ye et Zhu, 1997:45)
寄 主：多種蚧蟲。
分 佈：

Fusarium eaveiaceum var. **herbarum** 燕麥鐮刀菌(變種) (Li, 1988:212)
寄 主：*Panonychus citri* 柑橘葉蟎
Eotetranychus sexmaculatus 柑橘六點葉蟎。
分 佈：湖南。

Fusarium equiseti 木賊鐮孢 (Li, 1988:212; Wang et Ye, 1990:81; Wang et al., 1997, 13(2):93; Ye, 1989:6, 7; Ye et Zhu, 1997:45, 49)
= *Fusarium sciripi*; (Booth, 1971)
=*Fusarium aleyrodis*; (Booth, 1971)
寄 主：*Chilo suppressalis* (Walker) 二化螟
Leucoma salicis 柳毒蛾
Pieris rapae (Linnaeus) 菜粉蝶
Oulema oryzae (Kuwayama) 負泥蟲
Rhynchites heros 梨虎
森林害蟲(鱗翅目、膜翅目)
Heterodera glycines 大豆胞囊線蟲。
分 佈：湖南、河南、山東、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江。

Fusarium gibbosum 膨孢鐮孢 (Ye et Zhu, 1997:45)
寄 主：
分 佈：

Fusarium graminearum 禾穀鐮孢 (Ye et Zhu, 1997:45)
寄 主：
分 佈：

Fusarium heterosproum 異孢鐮孢 (Ye, 1989:6; Ye et Zhu, 1997:45)

寄 主：天牛科昆蟲。
分 佈：

Fusarium juruanum 佐魯亞鐮孢 (Ye, 1989:6, 7; Ye et Zhu, 1997:49)
寄 主：多種蚧蟲。
分 佈：

Fusarium larvarum 蠕孢鐮孢 (Ye, 1989:6, 7; Ye et Zhu, 1997:45' 49)
=*Fusarium nivale* var. *larvarum*; (Booth, 1971)
=*Fusarium aspidioti*
寄 主：*Adelges piceae* 鳳仙花根瘤蚜
Diaspidiotus perniciosus 梨圓蚧
Diatraea sp. 蔗螟。
分 佈：

Fusarium lateritium 磚紅鐮孢 (Li, 1987:195; 1988:212; 1993, 9(4):188; Wang et Ye, 1990:81; Yao, 1996, 12(3):99; Yao, 1996, 18(1):42-43; Ye, 1989:6; Ye et Zhu, 1997:45; Zeng et al., 1990:93)
寄 主：稻薊馬
Nilaparvata lugens (Stål) 褐飛蝨
Phylloxera vitifolii 葡萄根瘤蚜
Myzus persicae (Sulzer) 桃蚜
Rhopalosiphnum pseudobrassicae (Davis) 菜縊管蚜
Ceroplastes japonicus Green 日本龜蠟蚧
Ceroplastes rubens Maskell 紅蠟蚧
多種蚧蟲
Plutella xylostella (Linnaeus) 小菜蛾
Chilo hyrax 棘禾草螟
Sesamia sp. 荻蛀莖夜蛾
Laelia coenosacandida 蘆毒蛾
Helicoverpa assulta 煙青蟲
Helicoverpa armegera (Hübner) 棉鈴蟲
Pieris rapae (Linnaeus) 菜粉蝶(菜青蟲)
Oulema oryzae (Kuwayama) 負泥蟲
Rhynchites heros 梨虎。
分 佈：湖南、浙江。

Fusarium lateritium var. **longum** 磚紅鐮孢(長孢變種) (Ye et Zhu, 1997:45)
寄 主：
分 佈：

Fusarium merismoides 節狀鐮孢 (Ye, 1989:6; Ye et Zhu, 1997:45)
寄 主：*Helicoverpa* spp. 棉鈴蟲屬。

分 佈：

Fusarium merismoides var. **acetilerum** 節狀鐮孢(紅色變種) (Ye et Zhu, 1997:45)
寄 主：
分 佈：

Fusarium moniliforme Sdomlhe 串珠鐮孢 (Chou et Shing, 1979:217-218; He, et al., 1991:155; Huang et al., 1994, (4):183; Huang et al., 1997:267-269; Li, 1987:195; 1988:211; Li, 1993, 9(4):188; Wang et Ye, 1990:81; Yao, 1996, 18(1):42-43; Ye, 1989:6, 7; Ye et Zhu, 1997:45, 49; Ye et al., 1991:40)
=*Fusarium verticillioides*; (Nelson et al., 1983)
寄 主：二星蝽
Nilaparvata lugens (Stål) 褐飛蝨
Sogatella furcifera (Horvàth) 白背飛蝨
Nisia atrovenosa 花飛蝨
Nephotettix virescens (Distant) 黑尾葉蟬
Inazuma dorsalis (Motschulsky) 電光葉蟬
Telligoniella spectra 大青葉蟬
Aphis gossypii (Glover) 棉蚜
Aphis sacchari 高粱蚜
Ceratovacuna lanigera 甘蔗蚜
桃赤蚜
Myzus persicae (Sulzer) 桃蚜
Lipaphis erysimi (Kaltenback) 蘿蔔蚜
甘藍蚜
Rhopalosiphnum pseudobrassicae (Davis) 菜縊管蚜
Aphis pomi 蘋蚜
Macrosiphum granarium 麥蚜
Ceroplastes japonicus Green 日本龜蠟蚧
Ceroplastes rubens 紅蠟蚧
黃守瓜
黑守瓜
Epilachna niponica 馬鈴薯 28 星瓢蟲
Saperda populnea 青楊天牛
Plutella xylostella (Linnaeus) 小菜蛾
Chilo suppressalis (Walker) 二化螟
Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟
Chilo aauricilius Dudgeon 臺灣稻螟
Chilo hyrax 棘禾草螟
Chilo luteelus 蘆螟
Chilo infuscatellus (Snellen) 甘蔗二點螟
Pyrausta nubilalis 玉米螟

Ectropis obliqua hypulina Wehrli 茶尺蠖
Helicoverpa assulta 煙青蟲
Helicoverpa armegera (Hübner) 棉鈴蟲
Sesamia inferens (Walker) 大螟
Mythimna separata (Walker) 粘蟲(蛹)
Parnara guttata guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲
Pieris rapae (Linnaeus) 菜粉蝶(菜青蟲)
Chlorops oryzae 稻稈潛蠅
Hydrellia sp. 稻小潛蠅
麥葉毛眼水蠅。
分 佈：福建、湖南、廣西、浙江。

Fusarium moniliforme var. **intermedium** 串珠鐮孢(中間變種) (Ye, 1989:6; Ye et Zhu, 1997:45; Zeng et al., 1990:93)
寄 主：*Ceroplastes japonicus* 日本龜蠟蚧
Ceroplastes rubens 紅蠟蚧。
分 佈：浙江。

Fusarium nivale (Fr.) Ces 雪腐鐮孢 (Yao, 1996, 18(1):42-43; Ye, 1989:6; Ye et Zhu, 1997:45)
寄 主：*Tenebrio molitor* 大黃粉蟲
Plutella xylostella Linnaeus 小菜蛾
分 佈：浙江。

Fusarium nivale (Fr.) Ces var. larvarum 雪腐鐮孢(孺孢變種) (Yao, 1996, 12(30:99)
寄 主：*Pieris rapae* (Linnaeus) 菜白蝶。
分 佈：浙江。

Fusarium njuceo Ces. ex Saoc. 雪腐鐮孢 (Fan, et al.,1988:218)
寄 主：美國白蛾。
分 佈：陝西。

Fusarium orobanches Jacz 瓜列當鐮孢 (Wang et al., 1985(1):24-26)
寄 主：*Orobanche aegyptica* Pers. 瓜列當(埃及列當)(哈密瓜根部的一種惡性雜草)。
分 佈：新疆；埃及、希臘、蘇聯。

Fusarium oxysporum Schlecht 尖孢鐮孢 (Fan, et al.,1988:217; Li, 1993, 9(4):188; Ma, et al., 1991:216; Wang et Ye, 1990:81; Wang et al., 1997, 13(2):93; Yao, 1996, 18(1):42-43; Ye, 1989:6; Ye et Zhu, 1997:45; Zeng et al., 1990:93)
=*Fusarium vasinfectum* var. *zonatum*
寄 主：*Ceroplastes japonicus* Green 日本龜蠟蚧
Ceroplastes rubens Maskell 紅蠟蚧
Plutella xylostella (Linnaeus) 小菜蛾

Ostrinia nubilalis 歐洲玉米螟
Chilo hyrax 棘禾草螟
Chilo suppressalis (Walker) 二化螟
Phragmataecia castanea 蘆葦豹蠹蛾
Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟
Helicoverpa armigera (Hübner) 棉鈴蟲
Sesamia inferens (Walker) 大螟
青楊天牛
Aedes detritus
Heterodera glycines 大豆胞囊線蟲
Meloidogyne hapla 北方花生根結線蟲。

分 佈：湖南、浙江、河南、陝西、山東、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江。

Fusarium poae 梨孢鐮孢 (Ye, 1989:6; Ye et Zhu, 1997:45)

寄 主：*Oulema gallaeciana* 禾谷葉蟲。

分 佈：

Fusarium proliferutum var. **minus** 小串珠鐮孢菌 (Lu et Wu, 1991:105)

寄 主：*Parasaissetia nigra* (Nietner) 烏副盔蚧。

分 佈：廣東。

Fusarium rasinfectum var. **zonatus** (Sherb.) Wr. 輪紋蝕脈鐮孢 (He, et al., 1991:155)

寄 主：*Chilo suppressalis* (Walker) 二化螟
Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟。

分 佈：湖南。

Fusaarium redolens 芬芳鐮孢 (Ye et Zhu, 1997:45)

寄 主：

分 佈：

Fusarium sambucinum 接骨木鐮孢 (Ye, 1989:6; Ye et Zhu, 1997:45, 49)

=*Fusarium ssambucinum* var. *minus*; (Booth, 1971)

寄 主：多種蚧蟲
Oulema gallaeciana 禾谷葉蟲。

分 佈：

Fusarium semitectum Berk. et Rav. 半裸鐮孢 (Guo et al., 1998, 14(4):159-162; Wang et Ye, 1990:81; Ye, 1989:6; Ye et Zhu, 1997:45; Zeng et al., 1990:93)

寄 主：*Ceroplastes japonicus* Green 日本龜蠟蚧
Ceroplastes rubens Maskell 紅蠟蚧
Ectropis obliqua hypulina Wehrli 茶尺蠖
森林鱗翅目和膜翅目害蟲

Cuscuta japonica Choisy 日本菟絲
Cuscuta reflexa Roxb. 大花菟絲
分 佈：雲南、浙江。

Fusarium solani (Mark.) Sacc. 茄腐鐮孢 (Fan, et al.,1988:218; Guo et al., 1998, 14(4):159-162; Li, 1993, 9(4):118; Lin, 1990:39; Wang et Liu, 1995, 11(4):187; Wang et Ye, 1990:81; Wang et al., 1997, 13(2):93; Ye, 1989:7; Ye et Zhu, 1997:45)
別 名：*腐皮鐮孢*。
寄 主： 美國白蛾
Dendroctonus frontalis 南方松小蠹
Scolytus scolytus 大榆棘脛小蠹
Scirpophaga nivella 黃尾白螟
Calliphora erythrocephala 紅頭麗蠅(有致病性)
Heterodera glycines 大豆孢囊線蟲(卵)
Tylenchulus semipenetrans 柑橘根線蟲
Cuscuta japonica Choisy 日本菟絲
Cuscuta reflexa Roxb. 大花菟絲。
分 佈：雲南、湖南、江蘇、河南、陝西、山東、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江。

Fusaarium solani var. **eumartii** 茄腐鐮孢(真馬特變種) (Ye et Zhu, 1997:45, 49)
= *Fusarium eumartii*; (Wollenweber, 1931)
寄 主：
分 佈：

Fusarium sporotrichioides 擬枝孢鐮孢 (Li, 1988:212; 1993, 9(4):188; Ye et Zhu, 1997:45)
寄 主：甘藍蚜
橘蚜
Chilo hyrax 棘禾草螟
Proceras venosata 高粱條螟
菜青蟲。
分 佈：湖南。

Fusarium subglutinans Wollenw. et Reink 膠孢鐮孢 (Li, 1988:212; Ye et Zhu, 1997:45, 49; Ye et al., 1991:40; Zeng et al., 1990:93)
寄 主：桃赤蚜
Lipophis erysimi (Kaltenback) 蘿蔔蚜
Ceroplastes japonicus 日本龜蠟蚧
Ceroplastes rubens 紅蠟蚧
Proceras venosatus 高粱條螟
Ectropis obliqua hypulina Wehrli 茶尺蠖。
分 佈：湖南、浙江。

Fusarium tabacinum 煙草鐮孢 (Li, 1988:212; Ye, 1989:7; Ye et Zhu, 1997:45)
寄 主：*Pulvinaria citricola* 柑橘綿蚧
螟蟲
Pieris rapae Linnaeus 菜粉蝶(蛹)
Rhynchites heros 梨虎。
分 佈：湖南。

Fusarium tumidum 脹鐮孢 (Wang et Liu, 1995, 11(4):187)
寄 主：*Tylenchulus semipenetrans* 柑橘根線蟲。
分 佈：

Fusarium vasinfectum var. **zonatum** 輪紋蝕脈鐮孢 (Li, 1988:212)
寄 主：*Chilo suppressalis* (Walker) 二化螟(越冬幼蟲)
Sesamia inferens (Walker) 大螟(越冬幼蟲)。
分 佈：湖南。

Fusarium ventercosum Appel et Wollenw. 腹狀鐮孢 (Fan, et al.,1988:218; Ye et Zhu, 1997:45)
寄 主：美國白蛾。
分 佈：陝西。

Fusarium vertigillioides (Sacc.) Nirenberg-Mitt. 輪狀鐮刀菌 (Fan, et al.,1988:217; Wang et Ye, 1990:81)
寄 主：楊大透翅蛾
美國白蛾
楊十斑吉丁
青楊天牛
黃斑星天牛
寬肩象
栗雪片象。
分 佈：陝西、甘肅、寧夏、青海、新疆。

Fusarium sp. 黃色鐮刀菌 (Li, 1987:195)
寄 主：*Myzus persicae* (Sulzer) 桃蚜
Rhopalsiphnum pseudobrassicae (Davis) 菜縊管蚜
馬鈴薯 28 星瓢蟲
Pieris rapae Linnaeus 菜青蟲。
分 佈：湖南。

Fusarium sp. 鐮刀菌 (Ren et al., 1991:158)
寄 主：*Unaspis yanonensis* (Kuwana) 矢尖蚧。
分 佈：貴州。

Nectrioidaceae (Zythiaceae) 鮮殼孢科(竹桿癌腫菌科)

Aegerita webbneri Fawc. 韋伯蟲座孢菌 (Chen et Jin, 1997:235-239; Chien et Chiu, 1986:227; He et al., 2000(1):21)

寄 主：*Aleurocanthus spiniferus* (Quaint.) 黑刺粉蝨。

分 佈：臺灣、四川、浙江。

Aschersonia aleyrodis Webber 粉蝨座殼孢 (Lo et chiu 1986:20; Gao, 1988:198-199; Gao et al., 1985(4):45; He et al., 1996(4):34; Huang, 1990[ed.]:233-235; Huang et Gao, 1996:173; Li, 1999, 15(1):35-40; Liu et al.,1988:193-197; Tzean et al., 1997:102-1103; Yen et Tsai, 1969:3; Zhang et al., 1996, 22(1):43-46)

寄 主：*Dialeurodes citri* Ashmead 柑橘白粉蝨
Aleurocanthus spiniferus (Quaint.) 黑刺粉蝨
Bemisia giffardi Young 寡刺長粉蝨
大豆白粉蝨
Parlatoria zizyphus 黑點蚧。

分 佈：臺灣、福建、廣東、廣西、貴州、四川、浙江；美國。

Aschersonia baida Patouillard (Tzean et al., 1997:104-105)

Aschersonia baida Patouillard, 1897, 11:370.

寄 主：粉蝨
Diaspididae 盾蚧。

分 佈：臺灣。

Aschersonia basicystis Berk. Et Curtis (Tzean et al., 1997:106-107)

Aschersonia basicystis Berk. Et Curtis, 1869, 10:352.

寄 主：粉蝨
Diaspididae 盾蚧。

分 佈：臺灣。

Aschersonia brunnea Petch (Tzean et al., 1997:108-109)

Aschersonia brunnea Petch, 1921, 7:251.

寄 主：粉蝨
Diaspididae 盾蚧。

分 佈：臺灣。

Aschersonia cubensis Berk. et Curtis (Tzean et al., 1997:110-111)

Aschersonia cubensis Berk. et Curtis, 1869, 110:351.

寄 主：粉蝨
Diaspididae 盾蚧。

分 佈：臺灣。

Aschersonia goldiana Sacc. et Ellis (Lo et Chiu, 1986:20; Tzean et al., 1997:112-113)

Aschersonia goldiana Sacc. et Ellis, 1899, 114:990.

寄 主：粉蝨
Diaspididae 盾蚧。

分 佈：臺灣。

Aschersonia suzukii Miyabe et Sawada (Tzean et al., 1997:114-115)

Aschersonia suzukii Miyabe et Sawada, 1913, 5:80.

寄 主：粉蝨。

分 佈：臺灣。

Aschersonia andropogonis P. 座殼孢 (Yen et Tsai, 1969:6, 7)

寄 主：*Bemisia giffardi* K. 粉虱。

分 佈：臺灣。

Aschersonia duplex Berk 雙生座殼孢 (Chen, 1988:200-205; Chen, 1988, 15(4):235-239; Liu, et al.,1988:193-197; Ye et al., 1994(4):17; Zhang et al., 1996, 22(1):43-46)

寄 主：Alerodidae 粉虱科(油茶)

Metaceronema japonica Mask. 刺綿蚧(蘋果、柑橘、茶葉、油茶)

Diaspididae 盾蚧科(油茶)。

分 佈：福建、江西、湖南、廣西、貴州、浙江。

Aschersonia formosensis Sawada (Yen et Tsai, 1969:6)

寄 主：*Fagura nitida*

Coccus longulus Dougl. 軟蚧。

分 佈：臺灣。

Aschersonia goldiana Sac. (Yen et Tsai, 1969:6, 7)

寄 主：*Bemisia giffardi* K. 粉蝨。

分 佈：臺灣。

Aschersonia kawakmii Sawada (Yen et Tsai, 1969:6)

寄 主：*Calophyllum* sp. 蚧

Aspidiotus sp. 蚧。

分 佈：臺灣。

Aschersonia marginata Ell. et Ev. (Ye et al., 1994(4):17; Yen et Tsai, 1969:6)

寄 主：*Coccus longulus* Dougl. 軟蚧

Parlatoria zizyphus Lucas 黑點蚧。

分 佈：臺灣。

Aschersonia papillaia Petch 乳突座殼孢 (Fang et al., 1983:278-286; Liu, et al.,1988:193-197)

寄 主：*Trialeurodes vaporariorum* (Westwood) 溫室粉蝨

柑橘粉蝨。

分 佈：南方、北方。

Aschersonia placenta Ber. et Br. 扁座殼孢 (Liu, et al.,1988:193-197; Ye et al., 1990:92; Ye et al., 1994(4):17)

寄 主：柑橘粉蝨
黑膠粉蝨(油茶)。
分 佈：浙江。

Aschersonia suzukii Miy. Et Sawada (Yen et Tsai, 1969:6)
寄 主：Coccids 軟蠟蚧。
分 佈：臺灣。

Aschersonia turbinata 座殼孢菌 (Ye et al., 1994(4):17)
寄 主：蚧。
分 佈：

Aschersonia sp. 座殼孢菌 (Sun, 1986:102)
寄 主：*Metaceronema japonica* Mask. 油茶刺綿蚧
Unaspis yanonensis (Kuwana) 矢尖蚧。
分 佈：貴州、浙江。

Aschersonia sp. (Yen et Tsai, 1969:6,7)
寄 主：*Bemisia giffardi* K. 粉蝨。
分 佈：臺灣。

Hypocrella aleyrodis (Webber) Sawada (Chiu et Lo, 1985:4; Yen et Tsai, 1969:7)
寄 主：*Aleyrodis* sp. 粉蝨 ex *Ficus vasculosa*
Lecanium longulum Dougl. 盾蚧
Parlatoria zizyphus Lucas 黑點蚧
Pulvinaria longulum Dougl. 盾蚧。
分 佈：臺灣。

Hypocrella raciborskii Zimm. (Tzean et al., 1997:70-71)
Hypocrella raciborskii Zimm., 1901, 2:875.
寄 主：Coccoidea 蚧總科
Aleyrodidae 粉蝨科。
分 佈：臺灣。

Microcera fujikuroi Miy. et Sawada (Yen et Tsai, 1969:7)
寄 主：*Aspidiotus ficus* Comstck 盾蚧
Lepidosaphes gloverii Pack 牡蠣蚧
Parlatoria zizyphus Lucas 黑點蚧。
分 佈：臺灣。

Ophionectria coccicola (Ell. et Ev.) (Yen et Tsai, 1969:7)
寄 主：*Aspidiotus ficus* Comstock 盾蚧

Lepidosaphes citricola Pack　牡蠣蚧
Lepidosaphes gloverii Pack　牡蠣蚧
Parlatoria zizyphus Lucas　黑點蚧
分 佈：臺灣。

Ophionectria tetraspora Miy. et Sawada (Yen et Tsai, 1969:7)
寄 主：*Lepidosaphes gloverii* Pack　牡蠣蚧
Parlatoria zizyphus Lucas　黑點蚧。
分 佈：臺灣。

Pestalotiopsis guepinii (Desm.) Stey 茶褐斑擬盤多毛孢 (Guo et al., 1998, 14(4):159-162)
寄 主：*Cuscuta japonica* Choisy　日本菟絲
Cuscuta reflexa Roxb.　大花菟絲。
分 佈：雲南。

Podonectria aurantii (Höhn.) Petch (Tzean et al., 1997:72-73)
Podonectria aurantii (Höhn.) Petch, 1921,7:149.
寄 主：Diaspididae　盾蚧科。
分 佈：臺灣

Podonectria coccicola E. et E. (Yen et Tsai, 1969:6, 7)
寄 主：*Aspidiotus ficus*　盾蚧
Lepidosaphes gloverii　牡蠣蚧
Parlatoria zizyphus　黑點蚧。
分 佈：臺灣。

Podonectria coccorum (Petch) Rossman (Tzean et al., 1997:74-75)
Podonectria coccorum (Petch) Rossman, 1977, 69:379.
寄 主：Coccoidea　蚧總科
Aleyrodidae　粉蝨科。
分 佈：臺灣。

Podonectria duratii (Ye et al., 1994(4):16)
寄 主：*Parlatoria zizyphus*　黑點蚧。
分 佈：臺灣；南美。

Pseudomicrocera henningsii Koord (Hsiao, 1981:69-76; Yen et Tsai, 1969:6, 7)
寄 主：*Aspidiotus ficus* Comstock　盾蚧
Hemiberlesia cyanophylli Signoret　棕櫚圓蚧
Lepidosaphes gloverii　牡蠣蚧
褐圓蚧
Parlatoria zizyphus Lucas　黑點蚧
粉蝨

橘癭蟎。
分 佈：臺灣(柑橘產區)。

Sphaerostibe auranticola (Berk et Br.) Petch 紅頭蚧菌 (Chiu et Lo, 1985:4; Hsiao et Hsu, 1985:389-400; Hsu et Shiao, 1983:293; Yen et Tsai, 1969:6)
寄 主：*Parlatoria zizyphes* (Lucas) 黑點蚧
Pseudaonidia duplex (Cockerell) 茶圓蚧。
分 佈：臺灣(柑橘園均有發現)。

Sphaerostilbe coccopila Tul. (Chiu et Lo, 1985:4; Yen et Tsai, 1969:7)
寄 主：*Aspidiotus ficus* Comstock 盾蚧
Lecanium hemisphaericum 盾蚧
Lepidosaphes gloverii Pack 牡蠣蚧
Parlatoria zizyphus (Lucas) 黑點蚧。
分 佈：臺灣。

Sphaerostilbe fujikuroi (Miy. et Sawada)
Microcera fuljikurois Miy. et Sawada
寄 主：*Parlatoria zizyphus* Lucas 黑點蚧。
分 佈：臺灣(柑橘園均有發現)。

Sphaerostilbe fukuroi (Chiu et Lo, 1985:4)
寄 主：*Parlatoria zizyphus* Lucas 黑點蚧。
分 佈：臺灣。

Sporithrix sp. 絲孢菌 (Fan, et al.,1988:207-210)
寄 主：*Erannig dira* Butler 櫟尺蠖。
分 佈：陝西。

Torrubiella dimorppha Tzean et al. (Tzean et al., 1997:76-79)
Torrubiella dimorppha Tzean et al., 1997:76-79.
寄 主：*Arachnida* Spider 蜘蛛。
分 佈：臺灣。

Torrubiella flava Petch (Tzean et al., 1997:80-81)
Torrubiella flava Petch, 1997, 9:127.
寄 主：*Arachnida* Spider 蜘蛛。
分 佈：臺灣。

Torrubiella gonylepticida (Möller) Petch (Tzean et al., 1997:82-83)
Torrubiella gonylepticida (Möller) Petch, 1901, 2, 7:872.
寄 主：蚧蟲
Dialeuropora sp. 粉蝨。

分 佈：臺灣。

Torrubiella minutissima Kobayasi et Shimizu (Tzean et al., 1997:86-87)

Torrubiella minutissima Kobayasi et Shimizu, 1982, B, 8:57.

寄 主：Arachnida 蜘蛛。

分 佈：臺灣。

Torrubiella tenuis Petch (Tzean et al., 1997:88-89)

Torrubiella tenuis Petch, 1922, 7:323.

寄 主：蚧蟲。

分 佈：臺灣。

Verticillis parlatoriae Sawada (Yen et Tsai, 1969:7)

寄 主：*Parlatoria zizyphus* Lucas 黑點蚧。

分 佈：臺灣。

捕捉線蟲真菌

(Li et al., 1997:54-59; Liu, 1991: ; Liu et al., 1997:230-234; Pan et al., 1993, 33(4):313-316; Wang et al., 1997, 13(2):93Zhang et al., 1989, 3:59)

Acremonium charticola (Lindau) Gams (Tzean et al., 1997:90-91)

Acremonium charticola (Lindau) Gams, 1971:46.

寄 主：食葉性同翅目昆蟲。

分 佈：臺灣。

Acremonium crassum Petch (Tzean et al., 1997:92-93)

Acremonium crassum Petch, 1931, 16:72.

寄 主：*Lipaphis erysimi* Kaltenbach 蘿蔔蚜。

分 佈：臺灣。

Acremonium kiliense **(Wang et al., 1997, 13(2):93)**

寄 主：*Heterodera glycines* 大豆胞囊線蟲。

分 佈：河南、山東、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江。

Akanthomyces ampullifer (Petch) Mains (Tzean et al., 1997:94-95)

Akanthomyces ampullifer (Petch) Mains, 1950, 42:573.

寄 主：蜘蛛 Arachnida.

分 佈：臺灣。

Akanthomyces aranearum (Petch) Mains (Tzean et al., 1997:97-98)

寄 主：蜘蛛 Arachnida.

分 佈：臺灣。

Akanthomyces novoguinensis Samson et Brady (Tzean et al., 1997:98-99)

Akanthomyces novoguinensis Samson et Brady, 1982, 79:571.
寄 主：蜘蛛 Arachnida.
分 佈：臺灣。

Akanthomyces ovalongatus Hsieh et al. (Tzean et al., 1997:100-101)
Akanthomyces ovalongatus Hsieh et al. *In* Tzean et al., 1997:100-101.
寄 主：蜘蛛 Arachnida.
分 佈：臺灣。

Arthrobotrys cladodes var. **cladodes** Drechesler (Tsai et Huang, 1975:400)
Arthrobotrys cladodes var. *cladodes* Drechesler, 1937:459-464.
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Arthrobotrys conoides Drecgsker 圓錐節叢孢 (Kao et al., 1973:188; Zhang, 1988:225)
捕 食：*Aphelenchoides* sp. 線蟲
Rhoabditis sp. 線蟲。
分 佈：貴州(菇床、植物殘渣、菜地土壤中)。

Arthrobotrys dactyloides Drechsler (Kao et al., 1973:188; Tsai, 1975:274)
Arthrobotrys dactyloides Drechsler, 1937:482-487.
捕 食：線蟲。
分 佈：臺灣。

Arthrobotrys musiformis Drechsler (Kao et al., 1973:188; Tsai et al., 1975:274; Wu et Tseng, 1986:442)
Arthrobotrys musiformis Drechsler, 1937:477-482.
捕 食：線蟲。
分 佈：臺灣。

Arthrobotrys oligospora Fresenius 少孢節叢孢 (Ma, et al., 1991:218; Tsai et al., 1975:273; Zhang, 1988:225)
Arthrobotrys oligospora Fresenius, 1937:464-472.
=*Arthrobotrys superba* Corda var. *oligospore* (Fresenius) Coemans
=*Didymozocpkag aoligospora* (Fresenius)
捕 食：*Meloidogyne incognita* 棉花南方根結線蟲
線蟲。
分 佈：臺灣、廣西、貴州、浙江、江蘇。

Arthrobotrys robusta (Wu et Tseng, 1986:442)
捕 食：線蟲。
分 佈：臺灣。

Arthrobotrys superba Corda 多孢節叢孢 (Tsai et al., 1975:273; Zhang, 1988:225)
Arthrobotrys superba Corda, 1937:450-459.
=*Didymozcophaga superba* (Cad.) Soprunov Galiulina

=*Arthrobotrys drechsleri* Soprunov

捕 食：*Aphelenchoides* sp. 線蟲

Rhoabditis sp. 線蟲。

分 佈：臺灣、廣西、貴州(食菇床上)。

Botryotrichum piluliferum (Wang et al., 1997, 13(2):93)

寄 主：*Heterodera glycines* 大豆胞囊線蟲。

分 佈：河南、山東、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江。

Catenaria auxiliaris (Wang et al., 1997, 13(2):93)

寄 主：*Heterodera glycines* 大豆胞囊線蟲。

分 佈：河南、山東、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江。

Chaetomium elatum (Wang et al., 1997, 13(2):93)

寄 主：*Heterodera glycines* 大豆胞囊線蟲。

分 佈：河南、山東、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江。

Chaetomium perlucidum (Wang et al., 1997, 13(2):93)

寄 主：*Heterodera glycines* 大豆胞囊線蟲。

分 佈：河南、山東、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江。

Circinella sp. (Wang et al., 1997, 13(2):93)

寄 主：*Heterodera glycines* 大豆胞囊線蟲。

分 佈：河南、山東、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江。

Cladosporium cladosporiodes 芽枝狀枝孢霉 (Wang et al., 1997, 13(2):93; Zhang et al., 1996, 22(1):43-46)

寄 主：*Heterodera glycines* 大豆胞囊線蟲

松突圓蚧。

分 佈：廣東、浙江、河南、山東、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江。

Cunninghamella echinulata (Thraxt.) 銀漢霉 (Liu et al., 1996, 12(1):47)

寄 主：*Heterodera glycines* 大豆孢囊線蟲。

分 佈：遼寧。

Cunninghamella elegans Lender 銀漢霉 (Liu et al., 1996, 12(1):47; Wang et al., 1997, 13(2):93)

寄 主：*Heterodera glycines* 大豆孢囊線蟲。

分 佈：河南、山東、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江。

Cunninghamella echinulata (Wang et al., 1997, 13(2):93)

寄 主：*Heterodera glycines* 大豆胞囊線蟲。

分 佈：河南、山東、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江。

Cylindrocarpon destructans (Wang et al., 1997, 13(2):93)

寄 主：*Heterodera glycines* 大豆胞囊線蟲。
分 佈：河南、山東、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江。

Dactylaria brochopaga Drechsler (Tsai et al., 1975:275)
Dactylaria brochopaga Drechsler, 1937:514-518.
捕 食：*Tylenchulus semifpenetrance* 線蟲。
Rotylenchulus sp. 線蟲。
分 佈：臺灣。

Dactylaria candida (Nees) Saccardo (Tsai et Huang, 1975:401)
Dactylaria candida (Nees) Saccardo
Dactylaria candida (Nees) Saccardo, Drechsler, 1937:523-527.
捕 食：*Aphelenchoides besseyi* 線蟲。
分 佈：臺灣。

Dactylaria cionopaga Drechsler (Tsai et Huang, 1975:402)
Dactylaria cionopaga Drechsler, 1950:22-31.
捕 食：*Meloidogyne incognita* 線蟲。
分 佈：臺灣。

Dactylaria ellipsospora Grove. (Tsai et Hunag, 1975:403)
Dactylaria ellipsospora Grove., Drechsler, 1937:492-496.
捕 食：*Aphelenchoides besseyi* 線蟲
Aphelenchus avenae 線蟲。
分 佈：臺灣。

Dactylaria eudermata (Drechsler) (Tsai et al., 1975:275; Wu et Tseng, 1986:442)
Monacrosporium eudermata Drechsler, 1950:31-41.
捕 食：線蟲。
分 佈：臺灣。

Dactylaria haptotyla Drechsler (Tsai et Huang, 1975:401)
Dactylaria haptotyla Drechsler, 1950:41-49.
捕 食：*Aphelenchoides besseyi* 線蟲
Aphelenchus avenae 線蟲。
分 佈：臺灣。

Dactylaria lysipaga (Drechsler) (Tsai et al., 1975:276)
Monacrosporium lysipaga Drechsler, 1937:499-504.
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Harposporium sp. (Wu et Tseng, 1986:442)
捕 食：線蟲內寄生菌。

分 佈：臺灣。

Pasteuria penetans (Thorne) Sayre et Starr 穿刺巴氏桿菌 (Chen,1996: ; Dong et al., 1999, 15(2):89-93; Sun et Liu, 1994(4):178-182; Wu et Tseng, 1986:442)

Pasteuria penetans (Thorne) Sayre et Starr, 1989:

捕 食：*Meloidogyne arenaria* 線蟲

Meloidogyne hapla 線蟲

Meloidogyne incognita 線蟲

Meloidogyne javanica 線蟲

Meloidogyne spp. 線蟲內寄生菌。

分 佈：臺灣。

大豆保根菌 (Wang et al., 1997, 13(2):94-95)

寄 主：*Heterodera glycines* 大豆胞囊線蟲。

分 佈：黑龍江。

MELANCONIALES 黑盤孢目(黑分子孢子菌目)

Melanconiaceae 黑分子孢子菌科

Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc. f. sp. cisscutae 魯保一號(膠孢炭疽菌菟絲子專化型) (Gao, 1988:5; Gao et Gan, 1992, 8(4):173-175; Gao et al., 1984:18; Gao et al., 1985,:125-130; Gao et Yu, 1992, 8(4):173-175; Huang et al., 1987, (2):4-7; Li, et al., 1994, 10(1):35-39; 19(3):18; Liao et al., 1991, 11(1):82-86; Lin, 1985:30-31; Lin, 1985(2):52; Lin et al., 1979, 6(2):1-4; Liu et Zhu, 1980:1-179; 1987:1-179; Shi, 1980[ed.]:125-126; Wang, 1986:173; Yu et al., 1988:51-54; Zhang, 1985, 4(4):234-239)

Glocosporium sp. Lin, 1985(2):52.

Colletotrichum gloeosporioides, Zhang, 1985:234-239.

寄 主：*Cuscula* sp. 菟絲子(大豆)

Cuscula australis 菟絲子

Cuscula chinensis 菟絲子

Cuscula maritima 菟絲子。

分 佈：山東。

Microcera fujikuroi Miyabe et Sawada (Cheng et Tao, 1963:318)

寄 主：*Chrysomphalus aonidum* (Linnaeus) 褐圓蚧。

分 佈：臺灣。

Ophionectria coccicola (E. et E.) Berl. Et Vogl (Cheng et Tao, 1963:318)

寄 主：*Chrysomphalus aonidum* (Linnaeus) 褐圓蚧。

分 佈：臺灣。

Shaerostibe coccophila Tul. (Cheng et Tao, 1963:318)

寄 主：*Chrysomphalus aonidum* (Linnaeus) 褐圓蚧。

分 佈：臺灣。

未定位真菌

Lambornella sp. 體腔真菌 (Ho, 1985:63-67)
寄 主：*Orthopodomyia anopheloides* 巨形叢蚊。
分 佈：臺灣。

Alternaria tenuis Nees 細交鏈孢 (Guo et al., 1998, 14(4):159-162)
寄 主：*Cuscuta japonica* Choisy 日本菟絲
Cuscuta reflexa Roxb. 大花菟絲。
分 佈：雲南。

Alternaria zinniae 百日草鏈格孢菌 (Qiang et al., 1997, 13(4):169-172)
寄 主：*Xanthium ocidentale* 蒼耳。
分 佈：南京。
附 註：真菌殺草劑。

Gloeosporium sp. 圓盤孢 (Wang, 1987[ed.]:360)
寄 主：*Ericerus pela* Chavannes 白蠟蟲(褐腐病)。
分 佈：四川、湖南，廣西、雲南、貴州、江西、湖北。

Capnodium sp. 煤炱 (Wang, 1987[ed.]:360)
寄 主：*Ericerus pela* Chavannes 白蠟蟲(煙霉病)。
分 佈：四川、湖南，廣西、雲南、貴州、江西、湖北。

Meliola sp. 小媒炱 (Wang, 1987[ed.]:360)
寄 主：*Ericerus pela* Chavannes 白蠟蟲(煙霉病)。
分 佈：四川、湖南，廣西、雲南、貴州、江西、湖北。

PROTOZOA 原生動物

(Wu, 1989:332-349; Yue, 1989:324-331)

KINETOPLASTIDA 動基體目

Trypanosomatina 錐蟲亞目

Trypanosomatidae 錐蟲科

Phytomonas spp. 錐蟲(鞭毛蟲) (Huang et Chao, 1996:257-266)
寄 主：半翅目：Pentatomidae, *Eusarcoris* sp. 蝽
Nezara sp.

Plautia sp.
Scutelleridae, *Cantao ocellatus*
Alydidae, *Leptocorisa* sp.
Riptortus sp.
Coreidae , *Clavigralla* sp.
Cletus sp.
Largidae, *Physopelta* sp.
Lygaeidae, *Graptostethus servus*
Pyrrhocoridae, *Antilochus* sp. 。
分 佈：臺灣。

Trypanosoma evansi 錐蟲 (Hung et Chao, 1996:258)
寄 主：昆蟲。
分 佈：臺灣。

Herpetomonas muscarum 家蠅蛇滴蟲 (Xue, 1986:32)
寄 主：家蠅
市蠅
廄腐蠅
絲光綠蠅
夏廁蠅。
分 佈：山西。

MICROSPORA 微孢子綱

Nosomatidae 微孢子科
(Li, 1996, 18(1):45-46; Wang et Yan, 1988:33-38)

Amblyospora sp. 微孢子原蟲 (Ho, 1985:63-67)
寄 主：白點斑蚊
海氏家蚊
竹生翠蚊。
分 佈：臺灣。

Blantidium sp. 小袋纖毛蟲 (Jeu, 1977:57-67)
寄 主：*Culicoides riethi* Kieffer 李拭庫蠓(卵巢內外)。
分 佈：四川(重慶)。

Microsporidium argyrogrammi Wen et al. 銀紋夜蛾八孢蟲 (Wen et al., 1990:259)
Microsporidium argyrogrammi Wen et al., 1990:259.
寄 主：*Argyrogramma agnata* (S.) 銀紋夜蛾。
分 佈：北京(馬連洼)。

Nosema agnatae Wen et al. 銀紋夜蛾微粒子蟲 (Wen et al., 1990:258)

Nosema agnatae Wen et al., 1990:258-259.

寄 主：*Argyrogramma agnata* (S.) 銀紋夜蛾。

分 佈：河南(中牟)。

Nosema anteraeae 柞蠶微孢子蟲 (Long et al., 1995:27-32)

寄 主：柞蠶。

分 佈：

Nosema apis Zander 蜜蜂微粒子 (An et Ho, 1981:113; 1982:113; An et al., 1980:443; Yen et Kao, 1971:182-183; 1972:53-57)

寄 主：*Apis mellifera* Linnaeus 蜜蜂(成蜂)。

分 佈：臺灣；世界各地。

Nosema bombycis Naegli 家蠶微孢子蟲 (Chen et al., 1987, 5(1,2):53; Long et al., 1995:27-32; Lu, et al., 1986:324-326; Xie, 1989:57-60)

寄 主：*Bombyx* 家蠶

Dendrolimus punctatus (Walker) 馬尾松毛蟲。

分 佈：廣東、浙江；日本。

Nosema brassicae 紋白蝶微孢子蟲 (Tsai et Wang, 1995:375)

寄 主：*Pieris brassicae* 紋白蝶。

分 佈：

Nosema furnacalis Wen et Sun 亞洲玉米螟微粒子蟲 (Guo et al., 1989:30-33; Long et al., 1995"27-32; Wang et Wen, 1992:104-106; Wen, 1975:46; 1984:468-470; 1985(2):54; 1986:87-88; Wen et Sun, 1988:106)

Nosema pyaustae (Paillot, 1928) Weiser; Wen, 1965:64-68.

Nosema furnacalis Wen et Sun, 1990:106-109.

寄 主：*Ostrinia furnacalis* (Guenée) 亞洲玉米螟

Lydella grisescens Robineau-Desvoidy 玉米螟厲寄蠅

Macrocentrus linearis (Nees) 螟蟲長距繭蜂。

分 佈：山東、河北、北京、甘肅、內蒙古、吉林、黑龍江。

Nosema liturae 斜紋夜蛾微孢子蟲 (Hsu et Hsu, 1985:448; Hsu et al., 1990:115; 1991:242-251; 95-409; 1992:33-40; Liang et al., 1983:79-81; Tsai et al., 1994:139; Wu et al., 1995:375; Xie, 1989:57-60; Xie et al., 1999, 21(2):87)

寄 主：*Spodoptera litura* (Fabricius) 斜紋夜蛾。

分 佈：臺灣、廣東、貴州。

Nosema locustae 蝗蟲微孢子蟲 (Cao, 1992, : Liu, 1995:45-47; Liu et al., 1999, 21(3):99; Long et al., 1995:27-32; Ma et al., 1991, 1:64-67; Wang et al., 1987, 13(4):459-462; Wang, et al., 1991:160-161; Wang et al., 1994, 10(3):123-125; 1994, 11(Suppl.):109-113; Xinjiang, LMCS, BC. 1989, 6(2):18-23; Yan, 1991:21-23; Zhang, 1994: ; Zhang et Zhou, 1995, 11(2):93-94; Zhang et al., 1999, 15(2):57-59; Zhu, 1996:973-977)

寄 主：*Locusta migratoria manilensis* 東亞飛蝗

13 種新疆、內蒙古草原主要優勢蝗蟲

意大利蝗
西伯利亞蝗
新疆 4 種蝗蟲、戟斑蝗、小車蝗感病率軟高(80-90%)。
分 佈：新疆、內蒙古等地大草原；美國(西北部草原)。

Nosema medinalis Wen et Sun 稻縱捲葉螟微孢子蟲 (He, et al., 1991: 157; Sun et Wen, 1988:176-181; Wen, 1991:159-160; Wen et Sun, 1988:106)
寄 主：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟
Macrocentrus sp. 長距繭蜂。
分 佈：廣西、貴州、安徽。

Nosema pyrausta 歐洲玉米螟微孢蟲 (Hu et al., 1988:70-75; Long et al., 1995:27-32; Wang et Wen, 1992:104-106; Wen et al., 1986:87-88)
寄 主：歐洲玉米螟。
分 佈：江蘇(南)、甘肅(西)、黑江(北)；西德、美國。

Nosema semiothisae Wen et al. 槐尺蠖微粒子蟲 (Wen et al., 1990:257)
Nosema semiothisae Wen et al., 1990:257-258.
寄 主：槐尺蠖(*Semiothisa cinerearia* (B. et G.)) 。
分 佈：北京(東北苗圃)。

Nosema spodoptera 斜紋夜蛾微粒子蟲 (Tsai et Wang, 2001:183-195; Wang et al., 1989:307-308)
寄 主：*Spodoptera frugiperda* 秋行軍夜蛾。
分 佈：臺灣。

Nosema trilophidiae Wen et Li 疣蝗微粒子蟲 (Wen et Li, 1993:389)
Nosema trilophidiae Wen et Li, 1993:389-390.
寄 主：*Trilophidia annulata* (Thunberg) 疣蝗
Oedaleus decorus (Germ.) 黑條小車蝗。
實驗寄主：*Locusta migratoria manilensis* (Meyen) 東亞飛蝗
Helicoverpa armigera (Hbner) 棉鈴蟲
Ostrinia furnacalis (Guene) 亞洲玉米螟。
分 佈：北京、新疆(烏魯木齊)。

Nosema xylostella 小菜蛾微粒子蟲 (Tsai et Wang, 1995:375)
寄 主：*Plutella xylostella* (Linnaeus) 小菜蛾。
分 佈：臺灣。

Nosema sp. 微孢子蟲 (He, et al., 1991: 157)
寄 主：*Chilo suppressalis* (Walker) 二化螟
Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟
Sesamia inferens (Walker) 大螟。

分 佈：湖南、江蘇、河南、山東、河北、北京、內蒙古、遼寧。

Vairimorpha locustae Canning 蝗蟲微孢子蟲 (Xie, 1990:13-20)

Vairimorpha locustae Canning, 1953:

寄 主：*Locusta migratoria* 飛蝗。

分 佈：廣東。

Vairimorpha sp. 微孢子蟲 (Yuan et al., 1999, 15(2):88)

寄 主：*Plutella xylostella* 小菜蛾。

分 佈：

NEMATODA 線蟲

(Hsiao et Hou, 1997:86-99; Li et al., 1987,9(4):224-227; Li et al., 1992, :145; Liu, 1993, 15(2):96-100; Nickle, 1981(1-2):99-106, Translated by Wang; Qin et al., 1988, 1(2):179-185; Xu, 1985, 7(1):54-62; Xu, 1994, 7(1):8-10; Yang, 1995, 17(3):140-143; Yang et Yang, 1998, 14(4):181-185; Yue, 1989:119-126; Zhang et al., 1991,:152)

Mermithidae 索科

Agamermis sp. 葉蟬多索線蟲 (He, et al., 1991: 157; Xu, 1987:119)

寄 主：*Nephotettis virescens* (Distant) 黑尾葉蟬
Nephotettis cincticeps (Uhler) 僞黑尾葉蟬。

分 佈：廣東、湖南。

Agamermis sp. 飛蝨多索線蟲 (Chen et Wu, 1985(4):27; He, et al., 1991: 158; Li, 1981(1-2):46-50; Li, 1989:91; Xia, 1989:148-149; Xu, 1987:119)

寄 主：*Nilaparvata lugens* (Stål) 褐飛蝨(成蟲、若蟲)
Sogatella furcifera (Horvàth) 白背飛蝨(成蟲、若蟲)
Laedelphax striatella (Fallen) 斑飛蝨(成蟲、若蟲)
沙草飛蝨(成蟲、若蟲)
Nephotettix virescens (Distant) 黑尾葉蟬(成蟲、若蟲)
Inazuma dorsalis (Motschulsky) 電光葉蟬(成蟲、若蟲)。

分 佈：福建、湖南、廣東、浙江、江蘇、湖北。

Amphimermis chinensis Chen et Wu 黑玉蟻二索線蟲 (Chen et Wu, 1985(4):28)

Amphimermis chinensis Chen et Wu, 1985(4):28.

寄 主：*Formica gagates* 黑玉蟻(牛羊吸蟲-中華雙腔吸蟲-寄主)。

分 佈：內蒙古(興安盟)。

Amphimermis elegans (Hagmeier) 秀麗複索線蟲 (Chen et Wu, 1985(4):26; Wei, 1982:233; Wei et al., 1984:43; Wu et al., 1983:332; Xu, 1987:120)

Complexomermis elegans Hagmeier, 1912:

Amphimermis elegans, Welch, 1963:

寄 主：*Antheraea pernyi* (Guérin-Méneville) 柞蠶。

分 佈：貴州、河南、山東、遼寧、吉林。

Amphimermis sp. 複索線蟲 (Wei et al., 1984:43; Xu, 1987:120)

寄 主：*Antheraea pernyi* (Guérin-Méneville) 柞蠶。

分 佈：貴州、河南、山東、遼寧、吉林。

Amphimermis sp. 稻螟兩索線蟲 (He, et al., 1991: 158)

寄 主：*Chilo suppressalis* (Walker) 二化螟

Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟

Sesamia inferens (Walker) 大螟(幼蟲)。

分 佈：廣東、雲南、浙江、江蘇、安徽。

Amphimermis sp. 稻蝨兩索線蟲 (Chen et Wu, 1985, 1(4):25-31; Chen et al., 1982, (6):45-46;Fang et al., 1994, 21(2); 147-154; He, et al., 1991: 158; Wang et Chen, 1991, 12(1):63-64; Wang, et al., 1991:152; Xia, 1989:148-149; Xu, 1987:119; Zhao et al., 1987:73-77)

寄 主：*Nilaparvata lugens* (Stål) 褐飛蝨

Sogatella furcifera (Horvàth) 白背飛蝨

Laedelphax striatella (Fallen) 斑飛蝨

Nisia atrovenosa (Lethierry) 沙草飛蝨

Unkanodes sapporna Matsumura 白脊飛蝨

Nephotettix cincticeps (Uhler) 僞黑尾葉蟬

Inazuma dorsalis (Motschulsky) 電光葉蟬

食根葉甲。

分 佈：福建、湖南、廣東、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北。

Amphimermis sp. 電光葉蟬兩索線蟲 (Chen et Wu, 1985(4):26; He, et al., 1991: 158; Xu, 1987:119)

寄 主：*Inazuma dorsalis* (Motschulsky) 電光葉蟬。

分 佈：湖南、浙江。

Amphimermis sp. 複索線蟲 (Chen et Wu, 1985(4):26; Wei, 1982:234; Wu et al., 1983:332)

Complexomermis sp. Wei, 1982:234-235.

Amphimermis sp., Wu et al., 1983:332.

寄 主：*Antheraea pernyi* (Guérin-Méneville) 柞蠶。

分 佈：遼寧。

Amphimermis sp. 索線蟲 (Chen et Wu, 1985(4):28)

Amphimermis sp.

寄 主：*Culicoides riethi* 李拭庫蚊。

分 佈：四川(重慶)。

Hexamermis agrotis Wang et al. 地老虎六索線蟲 (Chen et Wu, 1985(4):27; Chen et al., 1989:125-126; He, et al., 1991: 158; Li et al., 1993:40-42; Su, 1997, 19(4):184; Wang et Wang, 1987, 5(1,2):20-21; Xie et al., 1999, 21(2):87; Xu. 1987:119; Zhong et Wang, 1993, 15(3):124-128)

Hexamermis agrotis Wang et al., 1962:
寄 主：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲
Agrotis ypsilon (Rottemberg) 小地老虎(棉)
Spodoptera exigua 甜菜夜蛾
Spodoptera litura (Fabricius) 斜紋夜蛾
Preris rapae Linnaeus 菜青蟲。
分 佈：四川、湖南、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南。

Hexamermis albicans sinensis 白色六索線蟲(中華亞種) (Su, 1997, 19(4):184; Wang et Wang, 1988:71-74; Xie et al., 1999, 21(2):87; Zhong et Wang, 1993, 15(3):124-125)
寄 主：*Spodoptera exigua* 甜菜夜蛾
Spodoptera litura (Fabricius) 斜紋夜蛾。
分 佈：湖北。

Hexamermis arsenoidea Hagmeier 粗狀六索線蟲 (Chen et Wu, 1985(4):26; Wei, 1982:236-237; Wei et Wu, 1984:43; Xu, 1987:120)
Hexamermis arsenoidea Hagmeier, 1912:
寄 主：*Antheraea pernyi* (Guérin-Méneville) 柞蠶。
分 佈：遼寧。

Hexamermis brevis Hagmeier 短六索線蟲 (Chen et Wu, 1985(4):26; Wei, 1982:237; Xu, 1987:120)
Hexamermis brevis Hagmeier, 1912:
寄 主：*Antheraea pernyi* (Guérin-Méneville) 柞蠶。
分 佈：遼寧。

Hexamermis cinensis 中華六索線蟲 (Xia et Lin, 1991:16-21)
Hexamermis cinensis
寄 主：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲。
分 佈：國內分布較廣。

Hexamermis kirjanovae Pologentsev et Artyuhovsky 基氏六索線蟲 (Chen et Wu, 1985(4):26; Wei, 1982:237-238; Xu, 1987:120)
Hexamermis kirjanovae Pologentsev et Artyuhovsky, 1958:
寄 主：*Antheraea pernyi* (Guérin-Méneville) 柞蠶。
分 佈：遼寧。

Hexamermis micromphidis Steiner 細小六索線蟲 (Chen et Wu, 1985(4):26; Wei, 1982:235-236; Wei et al., 1984:43; Xu, 1987:120)
Hexamermis micromphidis Steiner, 1925:
寄 主：*Antheraea pernyi* (Guérin-Méneville) 柞蠶。
分 佈：山東、遼寧、吉林。

Hexamermis preris 菜粉蝶六索線蟲 (Su, 1997, 19(4):184; Xie et al., 1999, 21(2):87; Xu, 1987:120; Zhong et Wang, 1993:124-125; Zhong et Wang, 1993, 15(3):124-128)

寄 主：*Spodoptera exigua* 甜菜夜蛾
Preris rapae Linnaeus 菜粉蝶。
分 佈：湖北。

Hexamermis taihuensis 太湖六索線蟲 (Su, 1997, 19(4):184; Xie et al., 1999, 21(2):87; Zhong et Wang, 1993, 15(3):124-125
寄 主：*Spodoptera exigua* 甜菜夜蛾
Spodoptera litura (Fabricius) 斜紋夜蛾。
分 佈：湖北。

Hexamermis sp. 六索線蟲 (Xu, 1987:120)
寄 主：*Agrotis segetum* Schiffermüller 黃地老虎。
分 佈：河南。

Hexamermis sp. 六索線蟲 (Xu, 1987:118)
寄 主：*Blissus pallipes* Distant 高粱長蝽。
分 佈：湖北。

Hexamermis sp. 六索線蟲 (Xu, 1987:120)
寄 主：*Chilo hyrax* Bleszynki 棘禾草螟。
分 佈：湖北。

Hexamermis sp. 六索線蟲 (Xu, 1987:120)
寄 主：*Chilo luteellus* Motschulsky 蘆螟。
分 佈：湖北。

Hexamermis sp. 六索線蟲 (Xu, 1987:120)
寄 主：*Helicoverpa armigera* (Hübner) 棉鈴蟲。
分 佈：湖北。

Hexamermis sp. 六索線蟲 (Xu, 1987:120)
寄 主：*Helicoverpa assulta* Geunée 煙夜蛾。
分 佈：河南。

Hexamermis sp. 六索線蟲 (Xu, 1987:120)
寄 主：*Spodoptera exigua* (Hübner) 甜菜夜蛾。
分 佈：湖北。

Hexamermis sp. 甘藍夜蛾六索線蟲 (Zhao, 1988:90)
寄 主：*Mamestra brassicae* (Linnaeus) 甘藍夜蛾。
分 佈：吉林。

Hexamermis sp. 六索線蟲 (Xu, 1987:120)

寄 主：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲。

分 佈：湖北、河南。

Hexamermis sp. 六索線蟲 (Xu, 1987:121)

寄 主：*Phragmataecia castanea* Hübner 蘆葦豹蠹蛾。

分 佈：湖北。

Hexamermis sp. 六索線蟲 (Xu, 1987:120)

寄 主：*Sesamia* sp. 荻蛀莖夜蛾。

分 佈：湖北。

Hexamermis sp. 蟲草蝠蛾六索線蟲 (Liu et al., 1995, 17(4):187)

寄 主：*Cordyceps sinensis* (Berjekt) Saccards 冬蟲夏草菌(蝠蛾)。

分 佈：廣東。

Isomermis sp. 等索線蟲 (Chen et Wu, 1985(4):28)

Isomermis sp.

寄 主：*Culex tritaeniorhynchus* 三帶喙庫蚊(孑孓)。

分 佈：湖北(武漢)。

Mermis subnigrescens Cobb 蝗蟲索線蟲 (He, et al., 1991: 158)

寄 主：中華稻蝗。

分 佈：福建。

Mermis sp. 葉蟬線蟲 (He, et al., 1991: 158)

寄 主：稻葉蟬(成蟲、若蟲)

稻飛蝨(成蟲、若蟲)。

分 佈：安徽。

Mermis sp. 粉蝶線蟲 (Zhao et al., 1986:42)

寄 主：*Pieris rapae* Linnaeus 菜粉蝶。

分 佈：吉林。

Mexamermis sp. 斜紋夜蛾線蟲 (Xie et al., 1999, 21(2):87)

寄 主：*Spodoptera litura* (Fabricius) 斜紋夜蛾。

分 佈：

Ovomermis sinensis Chen et al. 中華卵索線蟲 (Chen et al., 1991:151; 1992:15; 1992:249-260; Chen, 1994, 10(1):48; Chen et Pan, 1991:270-277; Chen, et al., 1991, 7(4):149-150; Ren et al., 1989, 5(1):24-26; Zhang, et al., 1991:151; 1992, 8(4):148-150)

Ovomermis sinensis Chen et al., 1991:270-277.

寄 主：*Agrotis ypsilon* Rottemberg 小地老虎

Euxoa segetum Schiffermüller 黃地老虎
Mythimna sparata (Walker) 粘蟲。
分 佈：河南、山東、北京。

Rhabditis terricola 鋸天牛線蟲 (Wang, 1991:439; 1995:448-449; Wang et al., 1992:353-354)
寄 主：*Dorythenes hydropicus* 甘蔗鋸天牛。
分 佈：臺灣。

Rhabditis sp. 小桿線蟲 (He, et al., 1991: 158)
寄 主：*Nilaparvata lugens* (Stål) 褐飛蝨
Sogatella furcifera (Horvàth) 白背飛蝨
Nisia atrovenosa 花稻蝨。
分 佈：湖南。

Rhabditis sp. 白蟻線蟲 (Wang, 1995:448; Wang et al., 1992:353)
寄 主：白蟻。
分 佈：臺灣。

Romanomermis cazanica 蚊線蟲 (Li, 1996, 18(1):45; Fu et Lin, 1987:123)
Romanomermis cazanica
寄 主：蚊。
分 佈：中國。

Romanomermis chenzhouensis Fu et Lin 郴州羅索線蟲 (Fu et Lin, 1987:100, 121)
Romanomermis chenzhouensis Fu et Lin, 1987:121-124.
寄 主：三帶喙庫蚊(*Culex tritaeniorhynchus* 幼蟲胸內，自然感染率較高(稻田)。
分 佈：湖南(郴州市郊)。

Romanomermis communensis (Fu et Lin, 1987:123)
Romanomermis communensis
寄 主：蚊。
分 佈：中國。

Romanomermis culicivorax 食蚊羅索線蟲 (Fu et Lin, 1985:123)
寄 主：蚊類。
分 佈：中國。

Romanomermis hermaphrodita **(Fu et Lin, 1985:123)**
Romanomermis hermaphrodita
寄 主：蚊。
分 佈：中國。

Romanomermis iyengari 艾氏羅索線蟲 (Fu et Lin, 1987:123)

Romanomermis iyengari
寄 主：蚊。
分 佈：中國。

Romanomermis jianensis Su et Zhang 集安羅索線蟲 (Chen et Wu, 1985(4):28; Su et Zhang, 1986:370; Xu, 1987:121)
Romanomermis jianensis Su et Zhang,, 1986:370-372.
寄 主：*Anopheles sinensis* Weideman 中華按蚊。
分 佈：吉林(集安縣)。

Romanomermis jingdeensis Yang et Chen 旌德羅索蟲 (Fu et Lin, 1987:123; Lu, 1985(1):36; Xu et Wu, 1986:139; Xu, 1987:121; Yang et Chen, 1983:116; Yang et al., 1983:16-17; Yang et al., 1983:139-146; 1984:609-612)
Romanomermis jingdeensis Yang et Chen, 1983:116-117.
寄 主：*Anopheles sinensis* Wiedemann 中華按蚊(幼蟲)
發現有 3 屬 11 種蚊孑孓對它有敏感性。
分 佈：安徽(旌德)。

Romanomermis kiktoreak (Fu et Lin, 1987:123)
Romanomermis kiktoreak
寄 主：蚊。
分 佈：中國。

Romanomermis nielseni (Fu et Lin, 1987:123)
Romanomermis nielseni
寄 主：蚊。
分 佈：中國。

Romanomermis sichuanensis Peng et al. 四川羅索線蟲 (Chen et Wu, 1985(4):28; Fu et Lin, 1987:123; Peng et al., 1984:112-116; Peng et al., 1985:234-237; Song et al., 1987:163-165; Xu, 1987:121)
Romanomermis sichuanensis Peng et al., 1984:112-116.
寄 主：*Anopheles sinensis* Weidman 中華按蚊。
分 佈：四川、安徽、吉林。

Romanomermis wuchangensis Bao et al. 武昌羅索線蟲 (Fu et Lin, 1987:123; Xu, 1987:121)
Romanomermis wuchangensis Bao et al., 1985:73-77.
寄 主：*Culex tritaeniorhynchus* Giles 三帶喙庫蚊
Culex fatigans 致乏庫蚊
Culex vaganx 迷走庫蚊
Culex pipiens pallens 尖音庫蚊(淡色亞種)
Culex vorax 貪食庫蚊
Culex fuscocephatus 棕頭庫蚊。
分 佈：湖北。

Romanomermis yunanenssis Song et Peng 豫南羅索線蟲 (Peng et al., 1987, :9-11; 18(4);318-320; 1989,

7(2):156; Song et Peng, 1987:3-6; Song et al., 1988, 4(2):65-67; Song et al., 1993:23)
Romanomermis yunanenssis Song et Peng, 1993:23.
寄 主：*Aedes albopictus* 白紋伊蚊
Aedes elsiae 艾氏伊蚊(刺棘伊蚊)
Aedes hatorii 羽鳥伊蚊
Aedes shortii 單棘伊蚊
Amigeres subalbatus 騷擾阿蚊
Anopheles anthropophagus 嗜人按蚊
Anopheles minimus 微小按蚊
Anopheles stephensi 斯氏按蚊
Cules huangae 黃氏庫蚊
Cules jacksoni 棕盾庫蚊
Cules mimulus 小斑翅庫蚊
Cules tritaesiorhynchus 三帶喙庫蚊
Cules pipiens quinquefasciatus 致倦庫蚊。
分 佈：四川、河南。

Romanomermis sp. 羅索線蟲 (Chen et Wu, 1985(4):28; Xu, 1987:121)
寄 主：*Anopheles gigas baileyi* 巨型按蚊(暗纓亞種)。
分 佈：西藏(波密)。

Romanomermis sp. 羅索線蟲 (Song et al., 1992, 11(4):1-2; Song et al., 1993, 9(1):23-25; Song et al., 1997, 13(1):14-16)
寄 主：*Aedes albopictus* 白紋伊蚊
Aedes elsiae 艾氏伊蚊(刺棘伊蚊)
Anopheles sinensis 中華按蚊
Anopheles lingshanensis 陵山按蚊
Anopheles minimus 微小按蚊
Anopheles stephensi 斯氏按蚊
Anopheles anthropophagus 嗜人按蚊
Cules tritaesiorhynchus 三帶喙庫蚊
Cules pipiens quinquefasciatus 致倦庫蚊。
分 佈：四川、河南。

Heterorhabditidae 異小桿線蟲科

(Akhurst, 1981(4):52-58, 田偉金譯; Han, 1993, 15(4):183-193;
Liu, 1989, 11(2):104-109; Xu, 1998, 20(3):124-128; Yang, 1995, 17(3):140-143; Yang et Li, 1988, 25(5):300-302)

Heterorhabditis bracteriophora Poinar 小桿線蟲 (Cao et Han, 1990:177; Liu, 1989:104-109; Yang et Zhang, 1990:111)
Heterorhabditis bracteriophora Poinar, 1975:466.
寄 主：*Bradysia odoriphaga* Yang et Zhang 遲眼蕈蚊(韭菜重要害蟲，俗稱韭蛆)。
分 佈：山東；美國。